

## 第三章循环系统疾病病人的护理

### 一、选择题：

#### (一) 型题

1. 不会惹起心力弱竭的疾病是

- . 主动脉瓣狭小
- . 急性心肌梗死
- . 稳固型心绞痛
- . 病毒性心肌炎
- . 原发性高血压
- . 直接惹起心脏后负荷加重的瓣膜病为

- . 主动脉瓣狭小
- . 主动脉瓣封闭不全
- . 二尖瓣狭小
- . 二尖瓣封闭不全
- . 三尖瓣封闭不全

3. 以下哪项惹起右室压力负荷过重

- . 三尖瓣封闭不全
- . 肺动脉瓣封闭不全
- . 严重贫血
- . 肺动脉高压
- . 静脉回流量增高

- . 慢性心力弱竭最常有的诱因是
  - . 静脉输液过多过快
  - . 情绪激动
  - . 不妥使用降压药
  - . 呼吸道感染
  - . 心律失态
  - . 左心衰竭最早出现的症状是
  - . 夜间阵发性呼吸困难
  - . 端坐呼吸
  - . 劳力性呼吸困难
  - . 咳嗽、咳痰、咯血
  - . 少尿及肾功能伤害
  - . 惹起左心衰竭最重要和最常有的症状是
  - . 呼吸困难
  - . 咯血
  - . 咳嗽、咳痰
  - . 少尿
  - . 头晕、心悸
7. 右心衰的典型体征是
- . 心脏增大
  - . 水肿

- . 头痛
- . 偏瘫
- . 可闻及右心室舒张期奔马
- . 右心衰竭较早出现的体征是
- . 眼睑水肿
- . 腹水、胸水
- . 肝颈静脉回流征阳性
- . 肝大
- . 踝部水肿
- . 以下各项与心源性哮喘的发生关系不大
- . 肺淤血
- . 睡眠
- . 回心血量减少
- . 并发肺部感染
- . 迷走神经喜悦性增高
- . 以下不是左心衰竭症状体征的是
- . 夜间阵发性呼吸困难
- . 咯血
- . 劳力性呼吸困难
- . 心源性哮喘
- . 肝颈静脉回流征阳性

- . 左心竭临床表现的出现是因为
  - . 肺静脉淤血、肺水肿所致
  - . 扩大所致
  - . 体循环静脉压增高所致
  - . 肺动脉压增高所致
  - . 心室重构所致
  - . 心力弱竭最常用的药物是
  - . 利尿剂
  - . 洋地黄类药物
  - . 醛固酮受体拮抗剂
  - . 血管紧张素变换酶克制剂
  - .  $\beta$  受体阻滞剂
3. 长久卧床的心力弱竭患者在床上作下肢运动，其目的主假如
- . 减少回心血量
  - . 预防褥疮
  - . 防备肌肉萎缩
  - . 防备下肢静脉血栓形成
  - . 实时恢复体力
4. 心力弱竭时下述减少心脏负荷的护理举措中，不正确的选项是
- . 依据病情适合安排歇息、活动
  - . 绝对卧床歇息

- . 控制钠盐摄取
  - . 合理应用利尿剂
  - . 合理应用血管扩充剂
- 5 . 以下哪项是洋地黄中毒最常有的临床表现
- . 恶心、呕吐
  - . 室性期前缩短
  - . 间期缩短
  - . 出现奔马
  - . 黄视、绿视
  - . 服用洋地黄后，应要点察看
  - . 能否中毒
  - . 过敏反响
  - . 能否成瘾
  - . 药物副作用
  - . 体温的变化
- 7 . 洋地黄中毒的严重表现是
- . 视
  - . 视力模糊
  - . 食欲不振
  - . 心律失常
  - . 恶心、呕吐

- . 心功能不全患者长久服用噻嗪类利尿剂，最易发生的副作用是
- . 低血糖
- . 低钙血症
- . 高镁血症
- . 低钾血症
- . 高尿酸血症
- . 对急性肺水肿诊疗最特异的是
- . 咳粉红色泡沫痰
- . 舒张初期奔马
- . 颈静脉怒
- . 肺动脉瓣第二心音亢进
- . 下肢浮肿
- . 急性肺水肿病人吸氧用酒精湿化的目的是
- . 稀释痰液
- . 缓解支气管痉挛
- . 喜悦呼吸中枢
- . 降低肺泡内泡沫的表面张力去泡沫
- . 克制肺泡内细菌生长
- . 当前我国惹起心房抖动最常有的病因是
- . 风湿性心脏病二尖瓣狭小
- . 急性心肌梗死

- . 甲状腺功能亢进症
  - . 高血压心脏病
  - . 缩窄性心包炎
  - . 室性心动过速最常有的病因是
  - . 冠芥蒂
  - . 急性心肌炎
  - . 原发性高血压
  - . 风湿性心瓣膜病
  - . 糖尿病性心脏病
- 3 . 心房抖动最常见于
- . 冠芥蒂
  - . 缩窄性心包炎
  - . 高血压性心脏病
  - . 风湿性心脏病二尖瓣狭小
  - . 甲亢性心脏病
  - . 使心室丧失排血功能的心律失态是
  - . 快室率房颤
  - . 心室抖动
  - . II型房室传导阻滞
  - . 心律不齐
  - . 房性期前缩短

- . 以下哪项要素一般不引发期前缩短
  - . 抽烟
  - . 喝酒
  - . 咖啡
  - . 高脂饮食
  - . 情绪激动
  - . 以下不属于心房抖动临床特色的是
  - . 房颤病人症状不受心室率快慢的影响
  - . 房颤可忽然发生忽然停止
  - . 第一心音强弱不等
  - . 心律绝对不规则
  - . 有短绌脉
7. 心动过速的心率范围往常是
- . 次 /
  - . 次 /
  - . 次 /
  - . 次 /
  - . 次 /
8. 对于房性期前缩短，以下哪项描绘不正确
- . 房性期前缩短的 波与窦性 波形态相异
  - . 发生于心房下部的房性期前缩短的 波可倒置



- . 房性期前缩短的代偿间歇多不完整
  - . 房性期前缩短的      波后的      波群多宽大畸形
  - . 房性期前缩短的      波后可无
- 9 . 室性期前缩短      是指
- . 每个      搏动后发生一次室性前缩短
  - . 每个      搏动后发生二次室性期前缩短
  - . 每个      搏动后发生三次室性期前缩短
  - . 每两个窦性搏动后发生一次室性期前缩短
  - . 每三个窦性搏动后发生一次室性期前缩短
- 3 . 以下哪项不属于心房扑动的心电图表现
- .      消逝，代以规则的锯齿状扑动
  - . 心房率为      次 /      次 /
  - . 心室      规则
  - . 心房      不规则
  - .      宽大畸形
- 3 . 诊疗心律失常最主要的检查方法是
- . 心电图
  - . 心音图
  - . 超声心动图
  - . 心电图运动试验
  - . 心电图信号均匀技术

3 . 室性期前缩短的口服药物治疗，应首选

- . 普鲁卡因胺
- . 普罗帕酮
- . 腺苷
- . 胺碘酮

33. 阵发性室性心动过速治疗首选

- . 苯妥英钠
- . 氯化钾
- . 利多卡因
- . 普鲁卡因酰胺
- . 溴苄胺

3 . 与高血压发病相关的饮食要素是

- . 素食过多
- . 高钠摄取
- . 钙盐许多
- . 优良蛋白饮食
- . 鱼类饮食增加

3 . 正常成人血压标准为

- . /
- . /

. /

. /

. /

### 3 . 高血压 级是指

. 收缩压为 ~ ，舒张压为 ~

. 收缩压为 ~ ，舒张压为 ~

. 收缩压为 ~ ，舒张压为 ~

. 收缩压为 ~ ，舒张压为 ~

. 收缩压  $\geq$  ，舒张压  $\geq$

### 37. 成人高血压的诊疗标准是

.  $\geq$  /

.  $\geq$  /

.  $\geq$  /

.  $\geq$  /

.  $\geq$  /

### 3 . 成人高血压诊疗标准 为

. 血压高于

. 血压等于或高于

. 血压高于

. 舒张压高于

. 收缩压高于

3 . 长久连续高血压惹起的肾脏病变最后可致使

- . 慢性肾盂肾炎
- . 肾功能衰竭
- . 慢性肾炎
- . 肾病综合征
- . 急性肾炎
- . 高血压时最常有的心脏改变是
- . 双房肥大
- . 左心房肥大
- . 肥厚与扩充
- . 右心室肥大
- . 右心房肥大

1 . 在高血压的心脏并发症中第一出现的是

- . 心绞痛
- . 心律不齐
- . 肥厚
- . 扩大
- . 心力弱竭

2 . 对于原发性高血压的降压治疗，下述哪些是不对的

- . 除危大病例外，降压药物从小剂量开始
- . 大部分病人需要长久用药

- 血压降至正常时即可停药
  - 首选第一线降压药物
  - 依据个性化原则采纳降压药物
3. 心绞痛最基本的病因是
- 原发性高血压
  - 病毒性心肌炎
  - 心律失常
  - 冠状动脉粥样硬化惹起血管狭小和 或 痉挛
  - 心力弱竭
- 心绞痛发生的典型部位是
- 胸骨上中段以后及心尖部
  - 心底部
  - 心前区向颈咽部放射
  - 胸骨下段后
  - 剑突下
- 以下哪项最切合典型心绞痛的特色
- 胸痛多在夜间发生
  - 胸痛位于胸骨后
  - 含硝酸甘油痛苦 1 分钟内缓解
  - 痛苦时心电图 抬高
  - 连续性 憋闷感达 分种以上

4 . 当前诊疗心绞痛最常用的无创性检查是

- . 胸片
- . 冠状动脉造影
- . 磁共振
- . 彩色多普勒超声
- . 心电图

47. 心绞痛发生时首要的护理举措是

- . 心电监护
- . 指导病人放松技术
- . 快速成立静脉通路
- . 监测生命征变化
- . 让病人立刻停止活动、歇息

4 . 急性心肌梗死的基本病因是

- . 二尖瓣狭小
- . 原发性心肌病
- . 严重贫血
- . 冠状动脉粥样硬化
- . 主动脉瓣封闭不全

4 . 急性心肌梗死一般最初出现以下哪一症状

- . 痛苦
- . 低血压和休克

· 心律失常

· 发热

· 呼吸困难

5 . 急性心肌梗死最常有的心律失常是

· 心房抖动

· 心动过速

· 室性期前缩短

· 房室传导阻滞

· 房性期前缩短

51. 急性心肌梗死行心电图检查，提示下壁心梗的导联有

·

1、

、

·

、

5、

· II、III、

· ~

·

7、

5 . 急性心肌梗死行心电图检查，提示前间壁心梗的导联有

·

1、

、

·

1、

、

· II、III、

·

·

7、

3. 急性心肌梗死患者应防止排便使劲，其目的主假如防备

- 使劲过分惹起虚脱
- 腹压加剧致使呕吐
- 血压陡升致脑溢血
- 心脏骤停
- 血流加快惹起脑栓塞
- 风湿性心脏病最常入侵的瓣膜是
- 二尖瓣及三尖瓣
- 三尖瓣及肺动脉瓣
- 主动脉瓣及肺动脉瓣
- 二尖瓣及主动脉瓣



- . 二尖瓣及肺动脉瓣
  - . 风湿性二尖瓣狭窄第一累及的心腔是
  - . 左心房
  - . 左心室
  - . 右心房
  - . 右心室
  - . 左心同时受累
  - . 二尖瓣狭窄最常见的并发症是
  - . 急性肺水肿
  - . 心房抖动
  - . 血栓栓塞
  - . 感染性心内膜炎
  - . 右心衰竭
7. 二尖瓣狭窄最常见的初期症状是
- . 呼吸困难
  - . 咯血
  - . 咳嗽、咳痰
  - . 心悸
  - . 晕厥
  - . 二尖瓣面容是以下哪一种瓣膜病变的体征
  - . 肺动脉狭窄

- . 严重二尖瓣封闭不全
  - . 主动脉瓣封闭不全
  - . 主动脉瓣狭小
  - . 重度二尖瓣狭小
  - . 二尖瓣狭小最重要的体征是
  - . 心尖区第一心音亢进
  - . 肺动脉瓣区第一心音亢进
  - . 二尖瓣开放拍击音
  - . 心尖区舒张中后期隆隆样杂音
  - .                      杂音
  - . 风湿性二尖瓣封闭不全最主要的特色是
  - . 心脏向左下扩大
  - . 胸骨左缘第
- 3、 肋间有舒张期杂音
- . 四周血管征
  - . 心尖部缩短期吹风样杂音
  - . 胸骨右缘第 肋间缩短期发射性杂音

(二) 题型（病历纲要型最正确选择题）

1. 岁男性患者，无不适症状，体格检查发现心率 次 / 分，心电图诊疗为窦性心动过缓，此时应怎样办理

- . 口服阿托品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/676114141031010045>