

胃肠外科专科知识考试试题

一、单选题

1、肠梗阻非手术治疗期间梗阻解除的标志是 () [单选题] *

- A、胃肠减压后腹痛减轻
- B、呕吐后腹胀减轻
- C、轻度压痛无肌紧张
- D、肛门排便、排气✓
- E、肠鸣音亢进转为消失

2、胃肠减压期间的护理措施错误的是 () [单选题] *

- A、病人应禁食及停口服药物
- B、随时观察吸引是否有效
- C、加强口腔护理
- D、及时更换收集瓶
- E、若发现胃管有鲜红血液吸出，继续持续吸引✓

3、肠梗阻的典型临床表现不包括 () [单选题] *

- A、阵发性腹痛
- B、均匀性腹胀
- C、腹泻✓
- D、呕吐
- E、肛门停止排气排便

4、引起肠梗阻最常见的原因是 () [单选题] *

- A. 肠扭
- B. 肠蛔
- C. 肠粘连✓
- D. 嵌顿疝
- E. 肠系膜血管栓塞症

5、对肠梗阻病人的术前护理正确的是 () [单选题] *

- A. 予流质饮食，促进肠蠕动
- B. 予止痛剂，缓解腹痛症状
- C. 给予缓泻剂，以解除梗阻
- D. 禁食、胃肠减压✓
- E. 予腹部热敷缓解腹痛

6、溃疡病合并瘢痕性幽门梗阻，频繁呕吐，最易出现 () [单选题] *

- A 代谢性酸中毒
- B 代谢性碱中毒✓
- C 低镁血症
- D 低钙血症
- E 高渗性脱水

7、上消化道大出血最常见的原因是 () [单选题] *

- A 胃十二指肠溃疡✓
- B 门脉高压症
- C 肝内感染，肝脓肿

D 出血性胃炎

E 胃癌

8 脐疝发生嵌顿最重要的原因是 () [单选题] *

A 疝内容物大，疝囊小

B 疝环小，腹压剧增✓

C 疝内容物与疝囊粘连

D 疝囊颈部水肿

E 疝内容物弹性差

9、胃十二指肠急性穿孔最易形成 () [单选题] *

A 右侧膈下脓肿✓

B 左侧膈下脓肿

C 盆腔脓肿

D 肠腔脓肿

E 肝脓肿

10 嵌顿疝与绞窄性疝鉴别要点是 () [单选题] *

A 疝块不能回纳

B 疝块是否有压痛

C 绞窄疝出现呕吐

D 绞窄疝出现休克

E 绞窄疝内容物出现血运障碍✓

11 腹外疝最重要的发病原因是 () [单选题] *

A 慢性咳嗽

B 长期便秘

C 排尿困难

D 腹壁有薄弱点或腹壁缺损✓

E 经常从事导致腹内压增高的工作

12、诊断早期胃癌最可靠的方法是: () [单选题] *

A、X 线钡餐胃肠造影术

B、四环素荧光试验

C、纤维胃镜检查✓

D、脱落细胞检查

E、CT 检查

13、胃癌的主要转移方式为: () [单选题] *

A、直接蔓延

B、血行转移

C、淋巴转移✓

D、腹腔种植

E、直接至卵巢

14、对胃十二指肠溃疡急性穿孔并发休克者护理时,错误做法是? () [单选题] *

A、保持有效胃肠减压

B、维持水、电解质和酸碱平衡

C、使用抗生素

D、取半卧位✓

E、禁食、禁饮

15、胃癌早期症状是? () [单选题] *

- A、上腹痛
- B、贫血
- C、腹块
- D、进食梗死感
- E、消化不良, 暖气✓

16、胃、十二指肠溃疡急性穿孔腹壁的特点是? () [单选题] *

- A、腹软
- B、腹肌轻度紧张
- C、腹肌紧张,无压痛
- D、腹肌轻度紧张,无反跳痛
- E、板状腹、压痛、反跳痛✓

17、倾倒综合征的表现,下列错误的是? () [单选题] *

- A、发生于饮食后 2~4 小时
- B、上腹胀痛,心悸,出汗,恶心,呕吐
- C、重者可有肠鸣腹泻
- D、平卧几分钟可缓解
- E、严重者可引起休克✓

18、回肠造口一般位于 () [单选题] *

- A、左上腹
- B、左下腹
- C、右上腹

D、右下腹✓

19、嵌顿性疝手法复位后，应重点观察（ ）[单选题] *

A、生命体征

B、神志变化

C、腹痛、腹部体征✓

D、呕吐腹胀

E、肛门排气

20、斜疝修补术后早期，最适宜的卧位是：（ ）[单选题] *

A、半卧位

B、仰卧位、膝部垫枕✓

C、俯卧位

D、斜坡卧位

21、斜疝修补术后，预防阴囊血肿的措施是（ ）[单选题] *

A、平卧位，膝下垫软枕

B、切口沙袋压迫，托起阴囊✓

C、咳嗽时用手按住伤口

D、不宜过早下床活动

E 预防便秘、尿储留

22、护理胃肠减压的病人时，哪项是错误的？（ ）[单选题] *

A、及时更换引流瓶

B、口服药物后持续胃肠减压✓

C、观察并记录引流液的量及形状

D、注意口腔护理

E、维持水和电解质平衡

23、急性阑尾炎最常见的病因是 () [单选题] *

A、阑尾管腔阻塞✓

B、细菌入侵

C、急性肠炎

D、血吸虫病

E、经常进食高脂肪

24、直肠癌最主要的转移途径是 () [单选题] *

A、直接蔓延

B、腹腔种植转移

C、血运转移

D、淋巴转移✓

E、远处转移

25、粪臭样呕吐物提示 () [单选题] *

A、腹膜炎致肠麻痹

B、幽门梗阻

C、高位肠梗阻

D、低位肠梗阻✓

E、肠绞窄

26、肠内营养小于 6 周，有高度肺吸入风险应选择哪种管喂途径 () [单选题] *

A 鼻胃管

B 鼻肠管✓

C 胃造口术

D 空肠造口术

27、肠内营养无菌配置后在 4°C 冰箱内可存放 () [单选题] *

A、 4h

B、 8h

C、 12h

D、 24h✓

E、 48h

28、胃大部分切除术后第一日应注意观察的并发症是 () [单选题] *

A、 吻合口破裂

B、 吻合口出血✓

C、 吻合口梗阻

D、 十二指肠残端瘘

E、 倾倒综合征

29、最易出现肠壁坏死和穿孔的肠梗阻是 () [单选题] *

A、 黏连性肠梗阻

B、 肠扭转

C、 肠套叠✓

D、 蛔虫性肠梗阻

E、 麻痹性肠梗阻

30、最易出现肠壁坏死和穿孔的肠梗阻是 () [单选题] *

- A、黏连性肠梗阻
- B、肠扭转
- C、肠套叠✓
- D、蛔虫性肠梗阻
- E、麻痹性肠梗阻

二、多选题

1.消化道穿孔保守治疗重点观察内容及措施（ ） [多选题] *

- A.禁食✓
- B.有效胃肠减压✓
- C.腹部体征✓
- D.生命体征✓
- E.检验检查结果✓

2、肠系膜分类有（ ） [多选题] *

- A.小肠系膜✓
- B.横结肠系膜✓
- C.阑尾系膜✓
- D.乙状结肠系膜✓

3、急性肠系膜血管缺血性疾病，一旦发生广泛得肠缺血坏死预后凶险，术后可能发生的并发症有（ ）

[多选题] *

短肠综合征✓

肠外瘘✓

胃肠道出血✓

再栓塞✓

4、造口患者饮食注意事项（ ） [多选题] *

A、饮食均衡多样化，保证充足的水分✓

B、可吃油炸食物、高胆固醇易堵塞食物

C、可进食含膳食纤维的食物✓

D、当腹部不适时，及时调整饮食✓

5、肠内营养的重要作用有（ ） [多选题] *

A、维持和改善肠粘膜屏障功能✓

B、促进肠蠕动功能的恢复✓

C、加速门静脉系统的血液循环✓

D、促进胃肠道激素的分泌✓

6、肠内营养代谢并发症（ ） [多选题] *

A 高血糖✓

B 低血糖✓

C 高血脂✓

D 高氮血症✓

E 高碳酸血症✓

7.肠穿孔的早期症状是（ ） [多选题] *

A 腹痛✓

B 腹胀✓

C 肠鸣音消失（板状腹）✓

D 发热✓

8 关于贲门失弛缓症的临床表现有 () [多选题] *

A、 吞咽困难✓

B、 胸骨后闷痛✓

C、 食管返流✓

D、 体重减轻✓

9、 关于肛管周围的括约肌下列描述哪些是正确的? () [多选题] *

A、 内外括约肌围绕全周径✓

B、 内括约肌不是随意的✓

C、 外扩约肌是随意的✓

D、 外扩约肌可以分为皮下部， 浅部， 深部✓

E、 肛管括约肌组成 4 个肌环

10、 有关贲门失弛缓症的叙述正确的是 () [多选题] *

A.基本缺陷是神经肌肉异常✓

B.病变主要局限于贲门部

C.光镜下食管平滑肌正常✓

D.主要是内层环行肌不能松弛✓

三、 判断题

1.诊断直肠癌最重要的方法是有直肠乙状结肠镜检查。 [判断题] *

对

错✓

2.家族性腺瘤性息肉具有很高的癌变倾向。() [单选题]

对✓

错

3.毕Ⅱ式胃大部切除术后最严重的并发症是吻合口溃疡。 [判断题] *

对

错✓

4、最容易引起休克的急腹症是单纯性肠梗阻。 [判断题] *

对

错✓

5、降结肠癌最常见的临床表现是排便习惯改变。() [单选题]

对✓

错

6、.结肠癌好发部位是乙状结肠。() [单选题]

对✓

错

7、胃溃疡穿孔易发部位贲门部。 [判断题] *

对

错✓

8、十二指肠溃疡穿孔易发部位十二指肠球部。() [单选题]

对✓

错

9、最容易发生嵌顿的腹外疝是股疝。() [单选题]

对✓

错

10、斜疝修补术后早期,最适宜的卧位是侧卧位。 [判断题] *

对

错✓

四、案例分析题

1、患者女性,30岁,间断性吞咽困难3年,伴呕吐,呕吐物为潴留食物,食管钡餐造影见食管下段呈鸟嘴样狭窄,上段食管明显扩张。最可能诊断考虑为() [单选题] *

- A、食管憩室
- B、贲门失弛缓症✓
- C、食管平滑肌瘤
- D、食管癌
- E、食管裂孔疝

2、王先生,32岁,既往有胃病史,近1周来,常感上腹部不适,4h前突发上腹部剧烈疼痛,伴有恶心、呕吐,查体:腹部压痛,肌紧张,肝浊音界缩小,X线检查可见膈下游离气体,首先考虑() [单选题] *

- A、急性阑尾炎穿孔
- B、胆囊炎穿孔
- C、急性胰腺炎
- D、溃疡病穿孔✓
- E、急性肠梗阻

3.患者男性,61岁,2个月前出现肛门周围疼痛,肛门左侧皮肤出现发红、肿胀及触痛,偶有黄色分泌物排

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/68612223200010043>