

2023 年黑龙江省哈尔滨市成考专升本医学 综合自考真题(含答案带解析)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(100题)

1.关于水肿,下列说法不正确的是 ()

- A.心源性水肿常从身体的低位开始
- B.肾源性水肿常发展迅速
- C.肾源性水肿常伴高血压
- D.肝源性水肿常以腹水为主要表现
- E.甲状腺功能低下的患者常出现下肢可凹性水肿

2.同一骨骼肌细胞在接受其运动神经元的冲动刺激后产生的 2 次终板电位中,第 2 个终板电位的振幅发生了变化,幅度明显降低,这可能是因为 ()

- A.切断了运动神经元
- B.在浸泡液中加了肾上腺素
- C.在浸泡液中加了去甲肾上腺素
- D.在浸泡液中加了箭毒
- E.在浸泡液中加了钠离子

3.面部开放性损伤后 12 小时就诊,应采取的措施是 ()。

A.换药，小清创 B.清创后不缝合 C.清创后一期缝合 D.清创后延期缝合 E.清创后放引流条

4.支配眼轮匝肌的神经是 ()

A.A. 动眼神经 B. 滑车神经 C. 展神经 D. 面神经 E. 眼神经

5.代谢性酸中毒原发改变为()

A. $[\text{HCO}_3^-]$ 增多

B. $[\text{HCO}_3^-]$ 减少

C. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 增多

D. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 减少

E. $\text{P}(\text{CO}_2)$ 增高

6.心迷走神经末梢释放的递质是 ()

A.A. 去甲肾上腺素 B. 乙酰胆碱 C. 肾上腺素 D. 多巴胺 E. 5-羟色胺

7. 破伤风属于

A.菌血症 B.毒血症 C.败血症 D.脓血症 E.脓毒败血症

8. 下列哪项不是引起慢性腹痛的常见原因? ()

A.肝癌 B.克罗恩病(节段性回肠炎) C.肠蛔虫病 D.溃疡穿孔 E.肝淤血

9.二尖瓣关闭不全的超声心动图特点不包括（ ）

A.左房增大

B.左室增大

C.室壁运动减弱

D.多普勒超声检查于左房侧可探及二尖瓣口的反流信号

E.如有二尖瓣脱垂，可见收缩期瓣叶脱入左房，CD段呈“吊床样”改变

10. 下列检查中，对判定渗出液和漏出液意义最大的是（ ）

A.蛋白定量 B.比重 C.pH D.细胞数 E.细胞分类

11.检查腹肌紧张度，应采用的手法是（ ）

A.浅部触诊法 B.深部触诊法 C.冲击触诊法 D.深压触诊法 E.勾指触诊法

12.下列哪一项不是孕激素的生理作用（ ）。

A.大量分泌可抑制卵泡刺激素和黄体生成素释放

B.促进子宫内膜腺体分泌

C.使子宫平滑肌兴奋性降低

D.促进乳腺腺泡及导管发育

E.使子宫颈黏液增多、变稀

13. 代谢性酸中毒时

A.呼吸快而浅 B.呼吸慢而浅 C.尿液呈碱性 D.钾离子进入细胞内 E.呼吸深而快

14. 在 40% 的环境中，机体散热的方式是

A.辐射 B.传导 C.对流 D.蒸发 E.扩散

15. 下列选项中，不属于小脑中央核的是

A.齿状核 B.球状核 C.栓状核 D.顶核 E.基底核

16. 下列有关脉压减小的叙述正确的是

A.系指脉压 $\leq 30\text{mmHg}$ B.为上下肢血压异常所致 C.常伴有交替脉 D.主要见于主动脉瓣狭窄 E.也可见于动静脉瘘

17. 输血的禁忌症应除哪项外

A.心力衰竭 B.肺水肿 C.红细胞增多症 D.严重感染 E.恶性高血压

18. 胃与十二指肠相连处是

A.贲门 B.幽门 C.胃底 D.胃体 E.胃窦

19. 心包压塞可出现的异常血管征是 ()

A.奇脉 B.水冲脉 C.交替脉 D.短绌脉 E.重搏脉

20. 心内兴奋传导的顺序是

A.窦房结—房室交界—心房肌—心室肌

B.窦房结—房室交界—心室肌—浦肯野纤维

C.窦房结—心房肌—心室肌—浦肯野纤维

D.窦房结—心房肌—左右束支—浦肯野纤维

E.窦房结—心房肌—房室交界—房室束和左右束支—浦肯野纤维—心室肌

21. 肱二头肌 ()

A.起于肩胛骨的喙突和盂下结节 B.受桡神经支配 C.止于尺骨鹰嘴 D.能屈肩关节伸肘关节 E.以上都不是

22. 肺动脉起始部位是 ()

A.右心房 B.右心室 C.左心房 D.左心室 E.主动脉弓

23.臀大肌注射定位的十字法垂线的起点是 ()

A.髂前上棘 B.髂嵴 C.髂嵴最高点 D.脊柱

24.下列关于输卵管的叙述,正确的是 ()

A.位于子宫系膜内 B.其内侧端为子宫口,外侧端为卵巢口 C.峡部位于壶腹部的内侧 D.壶腹部边缘有输卵管伞 E.以上都不正确

25. 鼻泪管末端的开口部位是 ()

A.中鼻道 B.下鼻道 C.上鼻道 D.泪点 E.泪囊

26.诊断急性阑尾炎的重要依据是 ()

A.Murphy 征阳性 B.McBurney 点有显著而固定的压痛和反跳痛 C.上腹部压痛 D.脐周压痛 E.右下腹疼痛

27. 骨骼肌细胞静息电位水平接近于 ()

A.K⁺的平衡电位 B.Na⁺的平衡电位 C.Ca²⁺的平衡电位 D.Cl⁻的平衡电位 E.Mg²⁺的平衡电位

28.高渗性缺水患者，输液治疗首选

A.生理盐水 B.5%葡萄糖注射液 C.10%葡萄糖注射液 D.5%碳酸氢钠 E.复方氯化钠溶液

29. 在心室等容收缩期时 ()

A.房内压>室内压>主动脉压
B.房内压<室内压>主动脉压
C.房内压=室内压>主动脉压
D.房内压<室内压<主动脉压
E.房内压>室内压<主动脉压

30. 脓性指头炎，切开引流应选用 ()

A.侧面横切口 B.侧面纵切口 C.指腹横切口 D.指腹纵切口 E.指腹 S 切口

31.参与肋弓形成的是 【 】

A.第 6~10 对肋软骨 B.第 7~10 对肋软骨 C.第 8~10 对肋软骨 D.第 9~10 对肋软骨 E.第 11~12 对肋软骨

32.肺脓肿（ ）。

- A.反复少量咯血伴呛咳
- B.痰中带血伴发热盗汗
- C.脓血痰，量多
- D.咯血，皮肤黏膜出血点
- E.突然大咯血，骤然咯血停止

33.阻塞性或肝细胞性黄疸（ ）

- A.尿镜检红细胞满视野
- B.尿镜检白细胞满视野
- C.尿外观正常，镜检可见各种管型
- D.尿外观酱油色，隐血试验(十)
- E.尿外观深黄色，含大量胆红素

34. 纯净胃液的 pH 为（ ）

- A.0.9~1.5 B.1.6~2.0 C.2.5~3.0 D.3.5~4.0 E.4.5~5.0

35.葡萄糖进入红细胞是通过（ ）。

- A.单纯扩散 B.通道介导的易化扩散 C.主动转运 D.载体介导的易化扩散
- E.出、入胞作用

36.烧伤创面适宜包扎疗法的部位是（ ）

A.头部 B.面部 C.躯干 D.会阴 E.肢体

37.胃十二指肠穿孔的诱因是()

A.情绪激动 B.暴食、进食刺激性食物 C.过度疲劳 D.以上都对

38.受伤达 12h 的严重沾染伤口，应采取()

A.清创及一期缝合 B.清创及延期缝合 C.清创后不予缝合 D.清创及植皮 E.无须清创

39.月经的发生与下列哪种因素有关()。

- A.血液中前列腺素的浓度降低
- B.血液中孕酮和雌二醇水平下降
- C.血液中孕酮水平升高，雌二醇水平下降
- D.卵泡刺激素和黄体生成素水平升高
- E.血中人绒毛膜促性腺激素浓度升高

40. 临床最常见的头痛伴剧烈呕吐多提示为()

A.偏头痛 B.癫痫 C.椎—基底动脉供血不足 D.神经功能性头痛 E.颅内高压

41. 中性粒细胞增多最常见的原因是

A.急性感染或炎症 B.大面积烧伤 C.急性溶血 D.急性中毒 E.恶性肿瘤

42. 根据以下选项，回答下列各题：

- A. 近曲小管
- B. 髓袢降支细段
- C. 髓袢升支粗段
- D. 远曲小管
- E. 集合管

肾小球滤液中的氨基酸被重吸收的部位是（ ）

43.舌的神经支配（ ）

- A. 舌的味觉由舌神经和舌咽神经传导
- B. 舌神经管理舌前 2/3 的一般黏膜感觉
- C. 舌肌的运动由舌神经控制
- D. 舌咽神经管理舌前 2/3 的味觉
- E. 舌的一般感觉由面神经和舌咽神经共同管理

44.激活糜蛋白酶原的物质是（ ）

- A. 酸 B. 胰蛋白酶 C. 组织液 D. 肠致活酶 E. 糜蛋白酶

45.上腹部膨隆的原因中，下列错误的是（ ）

- A. 骨癌 B. 骨扩张 C. 肝左叶肿大 D. 脾大 E. 胰腺肿瘤

A.外耳、中耳和内耳 B.外耳道、中耳和内耳道 C.鼓室、乳突小房和咽鼓管 D.骨迷路和膜迷路 E.半规管、前庭和耳蜗

47. 维持躯体姿势的最基本的反射是

A.屈肌反射 B.对侧伸肌反射 C.腱反射 D.肌紧张反射 E.翻正反射

48. 触觉语颤增强见于()

A.肺气肿 B.肺不张 C.胸腔积液 D.大叶性肺炎 E.气胸

49.高钾血症的病人发生心律失常，应首先应用()

A.5%碳酸氢钠 100 mL 静脉滴注

B.输注葡萄糖溶液及胰岛素

C.11. 2%乳酸钠 50 mL 静脉滴注

D.10%葡萄糖酸钙 20 mL 静脉注射

E.阳离子交换树脂

50.最轻的意识障碍为 【 】

A.嗜睡 B.谵妄 C.浅昏迷 D.昏 E.意识模糊

51.阑尾动脉发自 【 】

A.空回肠动脉 B.中结肠动脉 C.右结肠动脉 D.回结肠动脉 E.左结肠动脉

52. 对肾小球有效滤过压不产生影响的因素是()

B.血浆胶体渗透压 C.肾小球毛细血管血压 D.肾小球囊内压 E.输尿管结石

53. 卵巢与子宫角相连的韧带是

A.卵巢系膜 B.子宫阔韧带 C.卵巢固有韧带 D.子宫圆韧带 E.卵巢悬韧带

54.

A.A.受教育程度

B.业余爱好

C.社会关系

D.经济状况

E.工作经历

55.下列哪项不属于浅反射（ ）。

A.角膜反射 B.腹壁反射 C.桡骨骨膜反射 D.提睾反射 E.跖反射

56.手术中输血过程发现手术性渗血不止和低血压时最可能的并发症是

()

A.过敏性休克 B.感染性休克 C.出血倾向 D.溶血反应 E.以上都不是

57.腮腺是最大的一对唾液腺，它的导管开口在()

- B. 下颌第二磨牙相对的颊黏膜处
- C. 下颌第一磨牙相对的颊黏膜处
- D. 上颌第三磨牙相对的颊黏膜处。
- E. 颧弓下方一横指处

58. 输卵管的位置与形态

- A. 位于子宫系膜内
- B. 其内端为输卵管子宫口，外端为输卵管腹腔门
- C. 输卵管峡细长而弯曲
- D. 输卵管壶腹的边缘有输卵管伞
- E. 壶腹部在漏斗部的外侧

59. 有机磷中毒“中间型综合征”的发病机制是()

- A. 中枢神经系统受损
- B. 神经-肌肉接头处受损
- C. 胆碱酯酶受到抑制
- D. 周围神经病变

60. 病人叙述的最主要的症状称为

- A. 现病史
- B. 个人史
- C. 既往史
- D. 系统回顾
- E. 主诉

61. 脊柱的生理弯曲是()

- A. 颈曲凸向前，胸曲凸向后
- B. 颈曲凸向后，胸曲凸向前
- C. 腰曲凸向后，骶曲凸向前
- D. 腰曲凸向前，胸曲凸向前
- E. 以上都不对

62. ()

肌力 4 级 B.喷射样呕吐 C.视乳头水肿 D.踝阵挛 E.脑膜刺激征

63.下面哪种血尿应首先考虑上尿路结石()

A.无痛性血尿 B.终末血尿 C.活动性血尿 D.初期血尿

64. 具有很强吞噬功能的是 ()

A.B 淋巴细胞 B.T 淋巴细胞 C.嗜酸性粒细胞 D.嗜碱性粒细胞 E.单核细胞

65. 尺神经支配的肌为

A.肱三头肌 B.肱桡肌 C.尺侧腕屈肌 D.指浅屈肌 E.肱二头肌

66.通过坐骨小孔的神经是 ()。

A.闭孔神经 B.臀上神经 C.臀下神经 D.阴部神经 E.坐骨神经

67.属于特殊躯体感觉核的是 【 】

A.蜗神经核 B.孤束核 C.三叉神经脑桥核 D.疑核 E.副神经核

68.外科患者最常见的脱水类型是 【 】

A.低渗性脱水 B.等渗性脱水 C.高渗性脱水 D.慢性脱水 E.继发性脱水

69. 正常成年人安静时，通气/血流比值的正常值是 ()

A.0.48 B.0.64 C.0.84 D.1.4 E.0.58

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697110131052006043>