

## 2021 年心血管内科 3 月份三基三严理论考试

一、填空题，每题 1 分共 10 分

您的姓名：[填空题] \*

\_\_\_\_\_

1.血型不合输血后出现溶血反映的患者可出现 ( ) [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：血红蛋白尿)

2 血液由( )和( )两部分组成。 [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：血浆和血细胞)

3.正常人 24 小时尿量约( )ml，少尿为 24 小时尿量( )ml，无尿指( )ml [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：1000-2000、≤400、< 100)

4.训练膀胱反射功能，可间歇性夹闭尿管，应( )小时开放一次。 [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：3-4)

5.用于做尿蛋白定量，尿糖定量检查，可在尿液中添加的防腐剂是( )。 [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：甲苯)

6.暗红色大便提示( )；柏油样便提示( )；白陶土色便提示( ) [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：下消化道出血、上消化道出血、胆道梗阻)

7.吸性性呼吸困难可出现三凹征即:( )、( )，( ) [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙)

8 对于 II 型呼吸衰竭患者血气分析提示 PaO<sub>2</sub>( )mmHg;PaCO<sub>2</sub>( )mmHg ;应给予低浓度( )，低流量( )/L 鼻导管 [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：< 60、> 50、1-225%-29%、)

9.洋地黄药物中毒患者心电图可出现的改变为()。 [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：鱼钩样改变)

10.洗胃法的目的是解毒，一般在服毒后()小时内洗胃最有效。 [填空题] \*

\_\_\_\_\_ (答案：4-6)

## 二、单项选择题 (每题 1 分，共 80 分)

1.发生溶血反应时患者排出浓茶样尿液，主要是因为尿液中含有 () [单选题] \*

A 大量陈旧血液

B.胆红素

C.淋巴液

D.血红蛋白(正确答案)

2.消化性溃疡活动期大便隐血试验阳性，提示每日出血量为 () [单选题] \*

A <1ml

B 1-2ml

C 2-3ml

D 3-4ml

E >5ml(正确答案)

3.在我国肝硬化的主要原因是 () [单选题] \*

A 酒精中毒

B 中毒性肝炎

C 病毒性肝炎(正确答案)

D 营养失调

E 慢性肠道感染

4.肝昏迷前驱期的主要表现是 () [单选题] \*

A 轻度性格和行为改变(正确答案)

B 扑翼样震颤

C 脑电图异常

D 意识错乱

E 昏睡但可唤醒

5.血清淀粉酶在发病后开始升高的时间是 ( ) [单选题] \*

A 3-4h

B 6-8h(正确答案)

C 10-12h

D 16-20h

E 24h 左右

6.对急性胃肠穿孔患者的护理, 下列哪项是错误的 ( ) [单选题] \*

A 流质饮食(正确答案)

B 静脉输液

C 禁用止痛剂

D 青霉素皮试

E 皮肤准备

7.确诊慢性胃炎的主要依据是 ( ) [单选题] \*

A 活组织检查

B 胃肠钡餐检查

C 纤维胃镜检查查(正确答案)

D 胃液分析

E 血清学检查

8.肝硬化大量腹水患者的护理, 下列哪项不妥 ( ) [单选题] \*

A 半卧位

B 低盐饮食

C 尽量补液(正确答案)

D 皮肤护理

E 定期测腹围

9.肝昏迷的饮食护理应为 ( ) [单选题] \*

A 低蛋白、低盐、高脂肪

B 禁蛋白、低脂肪、高糖(正确答案)

C 高蛋白、低脂肪、低糖、低盐

D 低蛋白、高脂肪、高糖、低盐

E 适量蛋白和脂肪、低糖、低盐

10.胃溃疡节律性疼痛的特点是 ( ) [单选题] \*

A 空腹痛

B 餐时痛

C 夜间痛

D 餐后 0.5-1h 痛(正确答案)

餐后 3-4h 痛

11.下列不会引起急性胰腺炎的是 ( ) [单选题] \*

A 乙醇

B 暴饮暴食

C 胆囊炎

D 胰管梗阻

E 粗纤维食物(正确答案)

12.构成门脉高压症的三大临床表现是 ( ) [单选题] \*

- A 黄疸、腹水、脾肿大
- B 腹水、脾肿大、肾功衰竭
- C 黄疸、腹水、侧支循环建立与开放
- D 腹水、脾肿大、侧支循环的建立与开放(正确答案)
- E 腹水、上消化道出血、侧支循环的建立与开放

13.胃溃疡最易发生的部位是 ( ) [单选题] \*

- A 贲门部
- B 胃体部
- C 胃小弯(正确答案)
- D 胃大弯
- E 幽门部

14 在肾脏疾病中出现血尿的最常见原因是 ( ) [单选题] \*

- A 多囊肾
- B 肾结核
- C 肾小球肾炎(正确答案)
- D 肾血管病变
- E 肾挫伤

15.慢性肾炎合并高血压尿毒症，同时又水肿，下列药物先应用 ( ) [单选题] \*

- A 双氢克尿噻与氨苯蝶啶
- B 甘露醇
- C 双氢克尿噻
- D 速尿(正确答案)
- E 利尿合剂

16 肾病综合征最常见的并发症是 ( ) [单选题] \*

- A 循环衰竭
- B 肾功能不全
- C 感染(正确答案)
- D 静脉血栓形成
- E 蛋白及脂肪代谢紊乱

17.慢性特发性血小板减少性紫癜出血症状的特点为 ( ) [单选题] \*

- A 分批出现大小不等,高出皮面的瘀点
- B 牙龈出血、鼻衄、皮肤瘀点、瘀斑为多见(正确答案)
- C 损伤后迟发出血
- D 常见有深部血肿
- E 常见有关节腔出血

18.抢救糖尿病酮症酸中毒首要的和关键的措施是 ( ) [单选题] \*

- A .防治诱因
- B 使用小剂量胰岛素
- C 补液(正确答案)
- D 纠正电解质及酸碱平衡失调
- E 纠正脑水肿

19.关于胰岛素使用, 下列错误的说法是 ( ) \*

- A 宜选择皮肤疏松部位
- B 注射部位要经常更换
- C 同一区域注射, 必须离上一次注射处 2cm 以上
- D 未开封的胰岛素放于冰箱冷冻保存(正确答案)
- E 正在使用的胰岛素在常温下 (不超过 25℃) 可使用 28 天(正确答案)

20.甲亢病人应给予 ( ) [单选题] \*

- A. 高碳水化合物、 高蛋白、 高维生素饮食(正确答案)
- B. 高碳水化合物、 高蛋白、 高碘饮食
- C. 高碳水化合物、 高蛋白、 高脂饮食
- D. 高蛋白、 高脂高热量饮食
- E. 高蛋白、 高维生素、 粗纤维饮食

21 属于糖尿病微血管病变的是 ( ) [单选题] \*

- A 脑血管意外
- B 冠心病
- C 肾动脉狭窄
- D 下肢坏疽(正确答案)
- E 糖尿病肾病

22. 严重创伤性休克后， 首先应预防的是 ( ) [单选题] \*

- A 感染(正确答案)
- B 输血并发症
- C 急性心力衰竭
- D 急性呼吸窘迫综合征

23 休克患者血压低， 中心静脉压低提示 ( ) [单选题] \*

- A 血容量严重不足(正确答案)
- B 严重酸中毒
- C 容量血管过度收缩
- D 心功能不全

24 中度甲亢基础代谢率是 ( ) [单选题] \*

- A. -10%

B.10%

C.20%~30%

D.30%~60%(正确答案)

E. >+60%

25 甲状腺危象原因为 ( ) [单选题] \*

A.胰岛素绝对不足

B.突然大量甲状腺素入血(正确答案)

C.呼吸带烂苹果味

D.甲状腺肿大, 震颤, 有杂音

E. 饥饿感, 心慌手颤

26 I型糖尿病时患者 ( ) [单选题] \*

A.胰岛素绝对不足(正确答案)

B.突然大量甲状腺素入血

C.呼吸带烂苹果味

D. 甲状腺肿大, 震颤, 有杂音

E. 饥饿感, 心慌手颤

27 糖尿病酮症酸中毒的患者 ( ) [单选题] \*

A.胰岛素绝对不足

B.突然大量甲状腺素入血

C.呼吸带烂苹果味(正确答案)

C.甲状腺肿大震颤, 有杂音

E. 饥饿感, 心慌手颤

28.甲状腺功能亢进容易引起 ( ) [单选题] \*



A 窦性心动过速(正确答案)

C.窦性心动过缓

C.心房颤动

D. 预激综合征

E. 病态窦房结综合征

29. 62 岁男性患者， 因患糖尿病 9 年而长期接受胰岛素治疗， 尿糖基本控制在 (+~++) 。 昨晚因多食后， 今上午尿糖定性试验为 (+++) ， 自行增加了胰岛素剂量， 1 小时后突然感到心悸、 饥饿、 出冷汗， 随即昏迷。 该患者送来医院后， 为明确诊断， 你认为应立即进行下列哪项检查 ( ) [单选题] \*

A 血糖(正确答案)

B 尿糖

C 血酮

D 尿酮

E 血气分析

30 缺铁性贫血属于 ( ) [单选题] \*

A 小细胞低色素性贫血(正确答案)

B.大细胞性贫血

C.正常细胞性贫血

D.小细胞高色素性贫血

E . 溶血性贫血

31.甲亢病人最主要的护理诊断是 ( ) [单选题] \*

A、 知识缺乏

B、 营养失调(正确答案)

C、 食欲亢进

- D、焦虑
- E、睡眠型态紊乱

32 I 31I 治疗甲亢最常见的并发症是 ( ) [单选题] \*

- A、突眼加重
- B、诱发甲状腺危象
- C、甲状腺癌变
- D 甲状腺功能减退(正确答案)
- E、血小板减少

33..对于弥漫性毒性甲状腺肿患者甲状腺肿大的描述, 错误的是 ( ) [单选题] \*

- A 柔软
- B 双侧对称
- C 压痛明显(正确答案)
- D 可有震颤
- E 能随吞咽运动

34 糖尿病患者运动治疗的最佳时间是 ( ) [单选题] \*

- A 晨起锻炼
- B 餐后 2 小时
- C 睡前
- D 餐后 1 小时(正确答案)
- E 餐前 1 小时

35.下列哪项是测量糖化血红蛋白的临床意义 ( ) [单选题] \*

- A.反映取血前 1-2 个月的血糖水平
- B.反映取血前 2-3 个月的血糖水平(正确答案)

- C.反映取血前 34 个月的血糖水平
- D.反映取血前 4~5 个月的血糖水平
- E.反映取血前 6 个月的血糖水平

36.下列哪项是注射铁剂的正确方法（） [单选题] \*

- A.可用于静脉注射
- B.尽量固定注射部位
- C.宜做肌肉深层注射(正确答案)
- D.注射完毕，多按摩肌注部位
- E.首次注射留观 12 小时

37 患者，男，48 岁，诊断为糖尿病，患者拟在家中自行监测血糖，护士应告知其餐后 2h 血糖的正常值是（） [单选题] \*

- A . <4.8mmol/L
- B . B.<5.8mmol/L
- C . C.<6.8mmol/L
- D <7.8mmol/L(正确答案)
- E <8.8mmol/L

38.诊断糖尿病的标准是空腹血糖值不低于（） [单选题] \*

- A.5.0mmol/L
- B.6.0mmol/L
- C.7.0mmol/L(正确答案)
- D.8.0mmol/L
- E.9.0mmol/L

39 不符合甲甲状腺危象病人临床表现的是（） [单选题] \*

- A.高热(体温 $>39^{\circ}\text{C}$ )
- B.心率减慢(心率 40~60 次/分)(正确答案)
- C.大汗淋漓
- D.恶心、呕吐
- E.昏迷

40 患者女，36 岁。因“消瘦、乏力、怕热、多汗 4 月”就诊。检查:体温  $37.6^{\circ}\text{C}$ ，心率 116 次/分，血压  $145/90\text{mmHg}$ ，甲状腺弥漫性、对称性肿大，质软，随吞咽上下活动，伴有震颤，并可闻及血管杂音，首先应考虑的诊断是 ( ) [单选题]

\*

- A 皮质醇增多症
- B 单纯性甲状腺肿
- C 甲亢危象
- D 甲状腺功能亢进(正确答案)
- E 甲状腺功能减退

41.诊断糖尿病的主要依据是 ( ) [单选题] \*

- A 尿糖测定
- B 血糖测定(正确答案)
- C 血脂测定
- D 糖化血红蛋白测定
- E 口服葡萄糖耐量试验

42.对可疑糖尿病宜选择的检查项目是 ( ) [单选题] \*

- A 尿糖测定
- B 血糖测定
- C 血脂测定

D 糖化血红蛋白测定

E 口服葡萄糖耐量试验(正确答案)

43..糖尿病患者出现强烈饥饿感、心悸、手颤，出汗可能原因是（） [单选题] \*

A 胃溃疡

B 糖尿病加重

C 高血压

D 低血糖(正确答案)

E 合并甲亢

44.Graves 病中最重要而特异的体征是（） [单选题] \*

A 突眼

B 甲状腺危象

C 粘液性水肿

D 怕热多汗

E 甲状腺肿大(正确答案)

45.患者女，36岁，诊断为 Graves 病，口服丙基硫氧嘧啶治疗 1 年半，目前症状控制，甲状腺缩小，考虑停药，需进行的监测项目为（） [单选题] \*

A.TSAb 测定

B.基础代谢测定

C.T3 抑制试验(正确答案)

D.甲状腺摄  $^{131}\text{I}$  率

E.放射性核素扫描

46..急性白血病患者化疗期间，由于大量白细胞被杀灭，血液尿酸浓度增高，一旦发生尿酸结石时，护理人员可嘱患者（） [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718135044016006032>