

2022 年-2023 年护师类之主管护师能力测试试卷 B 卷附答案

单选题（共 50 题）

1、女性，52 岁，患多发性子宫肌瘤，准备行经腹全子宫切除术，术前阴道准备正确的是

- A. 术前 5 天每日阴道冲洗 1 次
- B. 术前 4 天每日阴道冲洗 1 次
- C. 术前 3 天每日阴道冲洗 1 次
- D. 术前 2 天每日阴道冲洗 1 次
- E. 术前 1 天每日阴道冲洗 1 次

【答案】 C

2、受伤时注射破伤风抗毒素属于（ ）。

- A. 主动免疫
- B. 被动免疫
- C. 强化免疫
- D. 一般免疫
- E. 特殊免疫

【答案】 B

3、容量血管过度收缩时表现为（ ）。

- A. 中心静脉压高、血压正常
- B. 中心静脉压低、血压正常
- C. 中心静脉压正常、血压高

- D. 中心静脉压低、血压低
- E. 中心静脉压高、血压低

【答案】 A

4、糖尿病最严重的慢性并发症是（ ）。

- A. 心血管病变
- B. 视网膜病变
- C. 白内障、青光眼
- D. 酮症
- E. 糖尿病足

【答案】 A

5、甲亢患者所具有的特征性神经系统症状是

- A. 神经过敏
- B. 兴奋性增高
- C. 烦躁多虑
- D. 双手平伸时手指细颤
- E. 注意力分散

【答案】 D

6、妊娠期间关于补充维生素的作用，说法正确的是

- A. 维生素 A 能预防孕妇皮肤过分干燥和乳头皲裂
- B. 维生素 D 对胎儿机体抵抗力有促进作用
- C. 维生素 B 能预防孕妇阴道上皮细胞角化

- D. 维生素 C 对胎儿骨、牙齿的正常发育有促进作用
- E. 维生素 E 能促进造血系统的健全

【答案】 A

7、根据 2005 心肺复苏指南，每次吹气量、吹气时间应为

- A. 300~500ml1s 以上
- B. 500~600ml1s 以上
- C. 700~1100ml1s 以上
- D. 500~600ml2s 以上
- E. 300~500ml2s 以上

【答案】 B

8、前列腺增生尿潴留后，尿液从尿道口溢出，称为（ ）。

- A. 松弛性尿失禁
- B. 压力性尿失禁
- C. 充溢性尿失禁
- D. 神经性尿失禁
- E. 痉挛性尿失禁

【答案】 C

9、患者男，45 岁，8 年前有乙型肝炎病，本次因大量呕血，黑便伴头晕，出冷汗 6 小时入院，经治疗后出血于第二天停止，但出现低蛋白血症和腹水，肝功能异常，拟行择期手术，术前准备不包括（ ）。

- A. 应用保肝药物
- B. 补充血浆

- C. 合理使用利尿剂
- D. 保持肠道通畅，使用肥皂水灌肠
- E. 营养支持

【答案】 D

10、艾滋病患者服用齐多夫定时，应定期检查（ ）。

- A. 肝功能
- B. 肾功能
- C. 血清蛋白
- D. 血常规
- E. 血压

【答案】 D

11、急性胰腺炎发病因素中，哪项最常见

- A. 胰管梗阻
- B. 胆石症和胆道疾病
- C. 感染
- D. 暴饮暴食
- E. 腹部外伤

【答案】 B

12、患儿男，6岁。因晨起眼睑水肿、尿色变深来医院就诊，经检查以急性肾小球肾炎收入院。查体发现眼睑和双下肢水肿、血压 120/80mmHg。尿镜检红细胞满视野。次日突然出现剧烈头疼、恶心、视物模糊。可能的诊断是（ ）。

- A. 心力衰竭

- B. 脑血栓形成
- C. 急性肾衰竭
- D. 高血压脑病
- E. 严重循环充血

【答案】 D

13、患者女，49岁，近4个月月经推迟不规则。B超：子宫前位7.5cm×7.4cm×6.6cm，内膜厚度1.8cm，回声不均匀，高度怀疑子宫内膜病变，行诊断性刮宫处理。对患者采取的护理措施错误的是（ ）。

- A. 刮取物及时送病理科
- B. 保持外阴清洁
- C. 一周内禁止性生活及盆浴
- D. 遵照医嘱服用抗生素
- E. 指导患者按时复诊

【答案】 D

14、下列有关胸外心脏按压的叙述错误的是（ ）。

- A. 平卧、背部垫硬板
- B. 在胸骨下段按压
- C. 按压次数每分钟50~60次/分
- D. 按压时双肘伸直
- E. 按压时胸骨下陷至少5cm

【答案】 C

15、下列选项中哪项是治疗呼吸衰竭的主要目标

- A. 保持呼吸道通畅，改善通气
- B. 纠正酸碱失衡
- C. 纠正缺氧和 CO
- D. 纠正电解质紊乱
- E. 以上均不是

【答案】 C

16、化疗药中，属于抗代谢药的有

- A. 环磷酰胺
- B. 氟脲嘧啶
- C. 丝裂霉素
- D. 长春新碱
- E. 阿霉素

【答案】 B

17、患者，女性，30岁。近5个月来自觉乏力，怕热多汗，并出现食欲增强，体重减轻，大便次数增多，每日3~5次，不成形。查体：Bp145/68mmHg，皮肤潮湿，手颤，甲状腺Ⅱ度肿大。对诊断最有帮助的检查是

- A. 甲状腺
- B. 血 TSH、FT
- C. 基础代谢率测定
- D. 甲状腺 CT
- E. 甲状腺刺激免疫球蛋白

【答案】 B

18、“60%青少年说出吸烟成瘾的主要原因”是

- A. 知识目标
- B. 态度目标
- C. 技巧目标
- D. 行为目标
- E. 信念目标

【答案】 A

19、脑血栓早期溶栓的首选药物是（ ）。

- A. 肝素
- B. 尿激酶
- C. 华法林
- D. 阿司匹林
- E. 双嘧达莫

【答案】 B

20、产妇，25岁，G

- A. 产后3~4天
- B. 产后6~7天
- C. 产后10~15天
- D. 产后20~25天
- E. 产后42天

【答案】 A

21、子宫颈癌的典型临床表现是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 分段诊断性刮宫
- C. 接触性出血
- D. 月经量增多
- E. 绝经后阴道不规则出血

【答案】 C

22、下列哪种药物包括西咪替丁和雷尼替丁

- A. 抗胆碱能药物
- B. 胃泌素受体拮抗药
- C. 组胺 H
- D. 组胺 H
- E. 钙通道阻滞药

【答案】 D

23、肺结核可咳出（ ）。

- A. 白色泡沫状痰或黏液性痰
- B. 黏液脓痰
- C. 大量脓臭痰
- D. 粉红色浆液泡沫痰
- E. 血痰

【答案】 A

24、某孕妇，36岁。孕36周，行无应激试验，发现有1次胎动，同时胎心率增加小于15/次，此次胎心监护结果为（ ）。

- A. NST 无反应型
- B. NST 反应型
- C. 无法判断
- D. CST 阴性
- E. CST 阳性

【答案】 A

25、经产妇，32岁，阴道助娩一女婴，产后观察。

- A. 子宫复旧不良
- B. 宫腔积
- C. 尿潴留
- D. 卵巢肿瘤
- E. 腹胀

【答案】 C

26、体外冲击波碎石（ESWL）两次治疗的间隔时间至少要大于（ ）。

- A. 3天
- B. 5天
- C. 7天
- D. 9天
- E. 14天

【答案】 C

27、对于窒息新生儿的首要护理措施是

- A. 保暖
- B. 建立呼吸
- C. 清理呼吸道
- D. 吸氧
- E. 维持血循环

【答案】 C

28、患者，女，30岁。被确诊患有肾上腺皮质腺瘤，其临床表现有向心性肥胖，皮肤菲薄，面部及背部出现痤疮，病人自觉乏力感明显，易激动，对形象的改变很难接受，不愿意见人。

- A. 活动无耐力
- B. 自我形象紊乱
- C. 营养失调：高于机体需要
- D. 有感染的危险
- E. 有皮肤完整性受损的危险

【答案】 A

29、患者女，56岁。因宫颈癌行放射治疗，采用后装治疗机放置¹⁹²Ir进行治疗，出现腹痛、腹泻、黏液便、里急后重感。此时护理措施错误的是（ ）。

- A. 应暂停治疗
- B. 嘱患者多食蔬菜水果
- C. 遵医嘱给予次碳酸铋口服
- D. 注意观察大便的性状，及时送检

E. 遵医嘱给予 10%复方樟脑酊口服

【答案】 B

30、女性，40 岁，突然剧烈头痛、呕吐、眼睑下垂、见右眼球活动受限，呈外展位，瞳孔扩大，对光反应消失，视力正常。查体：颈项强直，克氏征(+)

A. 颅内动脉瘤

B. 脑血管畸形

C. 颈动脉海绵窦瘘

D. 高血压脑出血

E. 脑梗死后出血

【答案】 A

31、应用抗甲状腺药物治疗甲状腺功能亢进的主要目的是（ ）。

A. 促使抗甲状腺激素的合成

B. 破坏甲状腺腺体，降低甲状腺功能

C. 抑制甲状腺激素合成，降低甲状腺功能

D. 直接中和甲状腺激素，降低甲状腺激素的浓度

E. 促进代谢，抑制激素的分泌，抵抗甲状腺素的作用

【答案】 C

32、经腹输卵管结扎术的实施时间应选在

A. 月经干净前 3~4 天

B. 月经干净后 3~4 天

C. 排卵前

- D. 排卵后
- E. 月经周期中任何时间

【答案】 B

33、 G

- A. 拥抱反射
- B. 迈步反射
- C. 觅食反射
- D. 腹壁反射
- E. 握持反射

【答案】 D

34、胎头吸引时间约为（ ）。

- A. 10 分钟
- B. 15 分钟
- C. 20 分钟
- D. 25 分钟
- E. 30 分钟

【答案】 C

35、帮助残疾患者提高生活自理能力的主要康复护理措施是（ ）。

- A. 康复评定和心理治疗
- B. 药物治疗和物理治疗
- C. 与日常生活密切联系的运动和作业疗法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728047121140006033>