

N2 级护理人员理论知识考前练习题与答案

- 1、感染转为慢性结局是由于
- A、 机体抵抗力与细菌毒力处于相持状态
 - B、 治疗不当
 - C、 人体抵抗力下降
 - D、 细菌毒力增大
 - E、 细菌变异

答案：A

- 2、急性胰腺炎时,尿淀粉酶
- A、 增高最早
 - B、 增高稍晚
 - C、 增高最晚
 - D、 不增高
 - E、 持续增高

答案：B

- 3、脑梗死常见的原因是()
- A、 动脉粥样硬化
 - B、 高血压
 - C、 高血脂
 - D、 风湿性心脏病
 - E、 高盐饮食

答案：A

- 4、下列哪项不是流脑皮疹的护理措施()
- A、 大片淤斑破溃处,尽量剪掉局部皮肤
 - B、 内衣应宽松、柔软,勤换洗
 - C、 瘀斑、大疱部位可用气垫、海绵垫等保护
 - D、 保持皮肤清洁,防止大小便浸渍
 - E、 翻身时避免拖、拉、拽等动作

答案：A

5、患者男性,70岁。诊断为慢性阻塞性肺气肿。其最可能出现的酸碱失衡是

- A、 代谢性酸中毒
- B、 代谢性碱中毒
- C、 呼吸性酸中毒
- D、 呼吸性碱中毒

E、 代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

答案： C

6、 新生儿 ABO 溶血病可发生于第一胎, 因产妇血清中已存在

A、 抗 A, 抗 B 的 IgA

B、 抗 A, 抗 B 的 IgG

C、 抗 B 的 IgD

D、 抗 A, 抗 B 的 IgE

E、 抗 A 的 IgM

答案： B

7、 肛表测量的时间是

A、 1 分钟

B、 3~5 分钟

C、 6~7 分钟

D、 7~10 分钟

E、 10~15 分钟

答案： B

8、 苯乙双胍(降糖灵)引起的酮尿最常见的检查结果是

A、 尿糖++++, 酮体阴性

B、 尿糖++++, 酮体强阳性

C、 尿糖阴性, 酮体阳性

D、 尿糖+, 酮体阳性

E、 尿糖+, 酮体阴性

答案： D

9、 护理质量管理的 QUACRS 模式指出护 理质量管理的方向, 其中不包括()

A、 做好病人照顾的质量保证

B、 有效掌握医疗护理照顾的成本效益

C、 做好病人和工作人员的安全措施

D、 满足工作人员的需求

E、 做好重点环节的质量控制

答案： E

10、 用于不明原因急慢性腹痛及诊断不清的盆腔包块的是()

A、 阴道后穹窿穿刺术

B、 腹腔镜检查

C、 阴道镜检查

D、 宫腔镜检查

E、 子宫颈活体组织检查

答案： B

11、 某社区卫生服务中心定期组织社区健康讲座, 对社区居民进行健康教育, 这些健康教育的目的是()

- A、 完成社区工作任务
- B、 使居民了解社区卫生中心的工作内容
- C、 帮助人们向促进健康的方向改善行为
- D、 协调社区居民的人际关系
- E、 传递知识

答案： C

12、 患儿女, 6 个月。 间断发热 2 天, 抽搐 2 次, 诊断小儿惊厥入院, T 39.2° C。 鉴别患儿是否存在颅内感染的检查是()

- A、 血培养
- B、 脑脊液检查
- C、 血生化检查
- D、 头 CT
- E、 动态脑电图

答案： B

13、 领导者让全体成员充分理解组织的目标和任务是领导工作的重要组成部分。 该领导者运用的领导工作原理是 ()

- A、 指明目标原理
- B、 协调目标原理
- C、 命令一致原理
- D、 直接管理原理
- E、 沟通联络原理

答案： A

14、 关于护理人员排班的基本原则, 下列哪项是不正确的()

- A、 以病人需要为中心, 确保 24 小时连续护理
- B、 掌握工作规律, 保持白班人员充足
- C、 人员结构合理, 确保病人安全
- D、 保持公平原则, 适当照顾人员的特殊需求
- E、 有效运用人力资源, 充分发挥个人专长

答案： B

15、 有机磷农药中毒时, 毒蕈碱样症状的发生主要由于

- A、 胆碱能神经递质老化

- B、 M 型受体敏感性降低
- C、 乙酰胆碱过度兴奋运动神经
- D、 乙酰胆碱过度兴奋副交感神经末梢
- E、 乙酰胆碱过度兴奋副交感神经节前纤维

答案： D

16、 关于胎儿循环系统特点, 正确的是

- A、 有脐静脉 2 条, 脐动脉 1 条
- B、 卵圆孔位于左、右心室之间
- C、 进入胎儿右心房的下腔静脉血是混合血
- D、 卵圆孔开口处位于上腔静脉入口
- E、 胎儿体内存在纯动脉血

答案： C

17、 下列哪项不是艾滋病的传播途径 ()

- A、 性接触传播
- B、 注射途径传播
- C、 粪-口途径传播
- D、 母婴传播
- E、 经输血和血制品传播

答案： C

18、 下列哪项属于蛔虫幼虫移行引起的症状 ()

- A、 食欲不振、腹泻、便秘、腹痛
- B、 脐周不规则压痛
- C、 蛔虫性哮喘
- D、 板状腹、肌紧张
- E、 易惊、磨牙、异食癖

答案： C

19、 下列哪项不是细菌性痢疾的护理措施 ()

- A、 急性期食欲差可进食水果补充营养
- B、 高热时多饮水, 给物理降温
- C、 腹痛时, 给予腹部热敷
- D、 腹泻次数多时, 排便后清洗肛周
- E、 急性期给高热量、少渣、易消化的流食

答案： A

20、王女士, 27 岁。出现进行性背痛、下肢乏力、食欲减退。护理体检: 第 6 胸椎轻度后突, 叩痛。X 线片示第 6、7 胸椎间隙狭窄。血沉 70mm/h。最可能的诊断是 ()

- A、 胸椎间盘突出症
- B、 胸椎结核
- C、 胸椎转移癌
- D、 化脓性脊柱炎
- E、 胸椎血管瘤

答案: B

21、可以行输卵管通液术的情况是

- A、 滴虫阴道炎未治愈
- B、 慢性盆腔炎亚急性发作
- C、 输卵管再通术后
- D、 功能失调性子宫出血伴心衰
- E、 月经第 2 天

答案: C

22、刘先生, 45 岁。40 天前被其饲养的宠物狗咬伤手指, 有少许出血, 未对伤口进行处理, 未接种狂犬疫苗。近 2 天出现恐水、恐风、咽喉部紧缩、吞咽困难。下列哪项检查有助于确诊 ()

- A、 血常规
- B、 尿常规
- C、 肝功能
- D、 血氨
- E、 病毒抗原检测

答案: E

23、语言理解阶段为

- A、 初生~9 个月
- B、 9~10 个月
- C、 1~6 岁
- D、 5~7 岁
- E、 7~9 岁

答案: B

24、髋关节结核术后石膏固定的时间是 ()

- A、 无需固定
- B、 2 周~1 个月

- C、 1~3 个月
- D、 3~6 个月
- E、 6~12 个月

答案： D

25、关于骨盆组成的描述, 正确的是

- A、 由 2 块髌骨、 1 块坐骨和 1 块尾骨组成
- B、 由 2 块髌骨、 1 块骶骨和 1 块尾骨组成
- C、 由 2 块髌骨、 1 块骶骨和 1 块尾骨组成
- D、 由 2 块髌骨、 1 块坐骨和 1 块尾骨组成
- E、 由 1 块坐骨、 耻骨联合和 1 块尾骨组成

答案： B

26、下列哪项是诊断癫痫最有诊断价值的相关检查()

- A、 CT
- B、 MRI
- C、 脑电图
- D、 脑血管造影
- E、 脑彩超

答案： C

27、下列哪项是常用于普查宫颈癌的检查项目()

- A、 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
- B、 阴道镜
- C、 宫颈刮片细胞学检查
- D、 碘试验
- E、 宫颈和宫颈管活组织检查

答案： C

28、我国育龄妇女的主要避孕措施是

- A、 阴茎套
- B、 宫内节育器
- C、 口服避孕药
- D、 长效避孕针
- E、 自然避孕法

答案： B

29、预防乙型肝炎的最佳措施为 ()

- A、 管理传染源
- B、 接种疫苗

- C、 切断传播途径
- D、 药物预防
- E、 注射免疫球蛋白

答案： B

30、流脑患儿高热、反复抽搐给予()

- A、 3 %醋盐水清洁洗肠
- B、 生理盐水低压灌肠
- C、 肥皂液洗肠
- D、 10%水合氯醛灌肠
- E、 大蒜素液保留灌肠

答案： D

31、上消化道出血诱发肝性脑病的原因是()

- A、 增加对氨的吸收
- B、 引起代谢性碱中毒,促使氨通过血-脑屏障
- C、 蛋白质分解,肠内产氨增多
- D、 脑组织缺氧降低了对氨的耐受性
- E、 降低血氨的代谢

答案： C

32、引起肝硬化的病因不包括

- A、 甲型肝炎
- B、 酒精中毒
- C、 胆汁淤积
- D、 营养障碍
- E、 血吸虫病

答案： A

33、急性胰腺炎时,血清脂肪酶

- A、 增高最早
- B、 增高稍晚
- C、 增高最晚
- D、 不增高
- E、 持续增高

答案： C

34、与流脑病人密切接触者可用下列哪种药物进行预防()

- A、 喹诺酮类
- B、 青霉素

- C、 红霉素
- D、 复方新诺明
- E、 头孢菌素

答案： D

35、 赵先生, 40 岁。行腰椎结核手术, 术后为预防截瘫的发生, 最重要的护理措施是 ()

- A、 绝对卧床, 颈部牵引
- B、 密切观察四肢活动情况
- C、 搬动病人或翻身时, 保持身体动作一致
- D、 多饮水, 预防下肢血栓形成
- E、 适当应用药物预防

答案： C

36、 腹部损伤最常累及的脏器是

- A、 胰腺
- B、 胃
- C、 结肠
- D、 脾
- E、 肝

答案： D

37、 前列腺增生排尿困难的程度主要决定于

- A、 前列腺的大小
- B、 患者年龄
- C、 增生的部位
- D、 是否癌变
- E、 是否钙化

答案： C

38、 实施控制时控制方法应具有科学性和实用性, 其涵义是 ()

- A、 护理质量控制应建立以病人为中心的整体护理质量控制系统
- B、 对影响质量的多方面因素进行综合、系统的控制
- C、 控制方法符合护理工作规律, 且能见到实际效果
- D、 既重视终末质量, 也贯彻预防为主
- E、 质量控制应把质量要求及其检查评定制成量化或定性标准

答案： C

39、 蒋先生, 52 岁。因头晕、头痛、左侧肢体麻木一天为主诉入院, 拟行头部 MRI 检查以明确诊断, 护士进行检查前指导不正确的是 ()

- A、 检查前禁食
- B、 告知检查经过, 减少恐惧
- C、 摘除身上可移去的金属物品
- D、 检查时全身放松, 安静平卧
- E、 不携带手机等容易受磁化的物品

答案: A

40、患者女性, 15 岁。骑自行车时不慎跌倒, 自觉外阴部胀痛难忍, 最可能发生

- A、 处女膜破裂
- B、 小阴唇裂伤
- C、 大阴唇血肿
- D、 巴氏腺出血
- E、 会阴体损伤

答案: C

41、主动脉瓣关闭不全的特征性表现为

- A、 病理性 Q 波
- B、 心电图 ST 段普遍弓背向下型抬高
- C、 水冲脉
- D、 二尖瓣型 P 波
- E、 正弦波图形

答案: C

42、下列哪项是有助于创造良好沟通环境的方法()

- A、 认同对方的问题和处境
- B、 少讲多听, 不要打断对方的讲话
- C、 尽可能排除外界干扰
- D、 站在对方的立场上考虑问题
- E、 控制情绪, 保持冷静

答案: A

43、某急性心肌梗死患者心电监护时发现一提前出现的宽大畸形 QRS 波群, T 波与 QRS 波主波方向相反, 此提前出现的 QRS 波群最可能是

- A、 窦性心律不齐
- B、 房性期前收缩
- C、 交界区期前收缩
- D、 室性期前收缩
- E、 正常现象

答案：D

44、制订标准的原则中,预防为主原则的涵义是()

- A、应明确服务对象的需求和实践需求
- B、将存在的状况、程度尽量用数据来表达
- C、所属人员共同确定质量要素和标准
- D、重视基础质量防患于未然
- E、明确是否具备实行标准的条件

答案：D

45、脊髓损伤最严重的病理分型是()

- A、脊髓震荡
- B、脊髓断裂
- C、脊髓挫伤
- D、脊髓休克
- E、脊髓受压

答案：B

46、下列哪项不是帕金森病的病因及发病机制()

- A、随着年龄增长,黑质细胞和纹状体中多巴胺受体减少
- B、乙酰胆碱的兴奋性相对增强,出现震颤麻痹症状
- C、调查显示本病与工业和农业的毒素有关
- D、有家族聚集现象,提示本病与遗传因素有关
- E、主要见于青壮年人群,提示本病与免疫反应有关

答案：E

47、中心型椎体结核易发人群是()

- A、10岁以下儿童
- B、体弱多病的小儿
- C、婴幼儿
- D、成年人
- E、老年人

答案：A

48、下列哪项是子宫颈癌的好发部位()

- A、宫颈鳞状上皮
- B、宫颈柱状上皮
- C、原始鳞柱交接部
- D、生理性鳞柱交接部
- E、移行带区

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/757114102024006042>