

妇产科护理学复习题

一、单选题

1.确诊早期宫颈癌的依据是()

A.白带多，性交后偶有出血性白带 B.阴道镜检查

C.宫颈刮片细胞学检查 D.宫颈及宫颈管活组织检查

2、放置宫内节育器（IUD）合适的时间（ ）

A.月经前3—7天 B.月经干净后3—7天

C.排卵前 D.排卵后

3、子宫内膜异位症最主要的临床特点是（ ）

A.经期第1—2日出现腹痛 B.下腹两侧疼痛

C.经期腹痛伴肛门坠胀感 D.继发性痛经，进行性加重

4、无并发症的妊娠足月孕妇的体重约增加()

A.10.5Kg B.12.5Kg C.14.5Kg D.16.5Kg

5. 首选诊断早孕的辅助检查方法是()

A. 基础体温测定 B. 尿妊娠试验 C. 黄体酮试验 D. 宫颈粘液涂片干燥后镜检

6. 骨盆最小平面的范围，前面是耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后面为：() 47

A. 第 4-5 骶椎间 B. 第 3-4 骶椎间.

C. 骶岬 D. 骶骨下端

E. 第 2-3 骶椎间

7. 正常脐带内有:()

A. 一条脐动脉, 二条脐静脉 B. 二条脐动脉, 一条脐静脉

C. 一条脐动脉, 一条脐静脉 D. 二条脐动脉, 二条脐静脉

E. 以上均不正确

8. 绒癌病理诊断标准是 () 184

A. 瘤组织中有绒毛 B. 继发于葡萄胎

C. 葡萄胎刮宫术后一年以内

D.镜下只见大片散在的滋养细胞无绒毛

9、一 24 岁初孕妇，孕 24 周，在急诊室主诉夜间突然阴道流血一小时，量如月经，伴腹部轻微胀痛。检查：BP14 / 9kPa (105 / 68mmHg) ,胎心率 140 次/分，胎位 LOA，头浮.子宫有不规则收缩，无压痛。最可能诊断是:()

A.先兆流产 91 B.胎盘早剥 101

C.胎盘边缘血窦破裂 D.前置胎盘 97

E.子宫颈息肉出血

10、妇科检查中下列哪项不正确 ()

A.检查前先排空膀胱 B.阴道出血者暂不检查

C.未婚女子应做三合诊检查 D.使用窥阴器应涂润滑油

E.男医务人员为病人做妇科检查时，需有其他医护人员在场

11.49 岁妇女。人工流产后 3 个月，阴道中等量流血 2 周，尿妊娠试验(+)，子宫常大，稍软，胸部平片见双肺散在粟粒状阴影，诊断为：183

A.葡萄胎

B.侵蚀性葡萄胎

C.绒毛膜癌

D.吸宫不全

E.合体细胞性子宫内膜炎

12、子宫生理缩复环位于()

A.子宫上段 B.子宫上下段之间 C.子宫下段 D.子宫底部

13.正常枕先露分娩时什么情况下发生仰伸() 51

A.儿头拔露时 B.儿头着冠时 C.胎头在耻骨下露出时 D.后凶在耻骨下方

14.临产的标志()

A.见红、规律宫缩、宫口不开 B.规律宫缩、破膜、胎头下降

C.见红、破膜、规律宫缩 D.规律宫缩、伴胎头下降、宫口扩张

15.关于胎盘早剥，下列叙述正确的是()

A.阴道流血量与病情严重程度呈正比

B.以无诱因、无痛性反复阴道流血为特点

C. 是妊娠早期的一种严重并发症，起病急，进展快

D. 重型胎盘早剥孕妇的子宫硬如板状，有压痛

E. 平卧休息，可预防胎盘早剥发生

16、停经后阴道流血量多，腹痛加剧，子宫颈口已开，羊水流出，子宫大小与停经孕周略小，尿妊娠实验阳性或阴性，B超不见胎动及胎心搏动，应诊断为（ ）

A.先兆流产 B.难免流产

C.不全流产 D.完全流产

E.过期流产

17、用硫酸镁治疗妊高征时，其中毒度反应最早出现的是（ ） 106

A. 心率减慢 B. 呼吸次数减少 C. 尿量减少 D. 膝反射消失

18. 关于双胎妊娠，下列哪项错误（ ） 110

A. 容易并发妊高征 B. 容易发前置胎盘

C. 容易发生胎盘剥离 D. 容易发生过期妊娠

19.葡萄胎排出后，妊娠实验有阳转阴的时间不应超过（ ） 182

A、4周 B、6周 C、8周

D、10周 E、12周

20、孕足月，初产妇，24岁第二产程2小时半，胎盘娩出后，有间歇性阴道流血并有血块排出，量超500mL，查：子宫轮廓不清，首先应考虑为()138

A．阴道静脉破裂 B．凝血机制障碍

C.胎盘残留 D．宫颈裂伤

E.子宫收缩乏力

21、最常用于卵巢功能的检查方法是() 13.158

A.宫颈刮片 B.宫颈管涂片

C.阴道侧壁涂片 D.后穹隆涂片

E.以上都不是

22、30岁，初孕妊娠34周，产前检查BP24/15KPA(180/112mmHg)拒绝住院治疗，3小时前突然腹痛伴阴道流血，Bp10 / 4kPa (75/30mmHg) ，Pl20次/分，宫底剑突下2指，板状腹，胎位不清，胎心音消失，宫颈未消失，最正确处理应是

A．立即剖官产终止妊娠

B. 抢救休克，滴注催产素引产

C. 人工破膜，滴注催产素引产

D. 抢救休克，因胎死宫内不急于引产

E. 抢救休克，尽快剖宫产，终止妊娠

23、为念珠菌性阴道炎病人作阴道灌洗，宜选择的药液是 157

A、生理盐水

B、1：5000 高锰酸钾

C、0.5%醋酸

D、1%乳酸

E、2%~4%碳酸氢钠

24、关于化疗病人口腔护理，下列哪项是错误的（ ）185

A. 化疗开始即应指导病人清洁口腔

B. 每天检查口腔 3-4 次，观察是否出现病症

C.避免食用酸、辣、过冷、过热及粗糙的食物

D.必要时在进食前后用黏膜麻醉剂及消炎药喷撒创面

E.口腔有溃疡的病人应立即停止化疗

25、李女士，45岁，因患子宫肌瘤拟行腹部全子宫切除手术，术前三天应作的护理准备是 189

A、皮肤准备

B、阴道准备

C、进少量饮食

D、清洁灌肠

E、留置导尿管

26、下列哪项不是重度妊高征的表现()105

A . 血压高于 21.3 / 14.7kpa

B . 头痛、昏迷、视力障碍

C . 下肢水肿(+++)

D . 24 小时尿蛋白定量 > 5g

E . 眼底动脉痉挛伴视网膜水肿、渗出物及出血

27、子宫内膜癌最常见的转移途径是 ()

A.上行蔓延 B.血行转移 C.腹腔种植 D.直接蔓延

28、胎盘的组成包括()26

A . 羊膜、包蜕膜、底蜕膜

B . 羊膜、底蜕膜、真蜕膜

C . 包蜕膜、底蜕膜、真蜕膜

D . 羊膜、叶状绒毛膜、真蜕膜

E . 羊膜、叶状绒毛膜、底蜕膜

29、胎盘剥离的征象是()60

A . 子宫体变硬呈球形，胎盘剥离后降至子宫下段，下段被扩张，子宫体呈狭长形被推向上，子宫底升高达脐上

B . 剥离的胎盘降至于宫下段，阴道口外露的一段脐带自行延长

C . 阴道少量流血

D . 用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，子宫体上升而外露的脐带不再回缩

E . 以上都是

30、33 岁已婚妇女，停经 38 日阴道流血少量 3 日，下腹痛 4 小时。妇科检查后考虑为输卵管妊娠，下列哪项辅助检查不需要 () 95

A . 基础体温测定 B . 查尿 HCG 值

C . B 型超声检查 D . 诊刮或组织检查

31..先兆子宫破裂的临床表现应除外 () 143

A . 子宫强直性收缩 B . 病理性缩复环 C . 血尿 D . 血压下降

32.葡萄胎刮宫后 3 个月出现咯血，阴道不规则出血，妇检子宫如孕 2 个月，质软，双侧卵巢囊性增大，尿妊娠实验阳性，应首先考虑 () 183

A.葡萄胎清宫不全 B.侵蚀性葡萄胎

C.绒癌 D.妊娠

33.异位妊娠最常见的着床部位是()93

A.卵巢 B.输卵管 C.子宫颈 D.腹腔妊娠

34.硫酸镁过量或中毒时解毒药是() 106

A.安定镇静休息 B.冬眠类药物

C.10%葡萄糖钙或氯化钙 10ml D.输入大量液体

35.关于妊娠合并心脏病的叙述不正确的是() 118

A.是孕产妇死亡的主要原因之一 B.妊娠 32~34 周时血容量达到最高峰

C.第二产程心脏的负担最重 D.产后 2~3 天心脏负担减轻

36.妊娠合并糖尿病需使用药物治疗时应选用() 123

A.优降糖 B.消渴丸 C.胰岛素 D.降糖灵

37.28 岁初产妇，临产前静脉滴注催产素，破膜后不久突然出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、紫绀，数分钟后死亡。本病例最可能的诊断是() 145

A.重度妊高征—子痫 B.低纤维蛋白原血症

C.羊水栓塞 D.重型胎盘早剥

38.产褥感染的病因，错误的是()

- A . 产道本身存在细菌 B . 妊娠末期性交、盆浴
- C . 医务人员的手、呼吸道以及各种手术器械的接触 D . 催产素的使用

39 . 有关产褥感染的处理原则，错误的是（ ） 149

- A . 选用有效的抗生素 B . 改善全身一般情况
- C . 半卧位以利引流 D . 禁用宫缩剂，避免感染扩散

40.新生儿窒息时，首先要进行的处置是（ ） 87

- A . 清理呼吸道 B . 吸氧
- C . 口对口人工呼吸 D . 脐静脉推注碳酸氢钠

41.用孕激素治疗闭经出现撤药性阴道流血，表示（ ）

- A.子宫内膜萎缩 B.子宫内膜结核
- C.子宫内膜对雌激素不起反应 D.子宫内膜已受雌激素影响

42.诊断葡萄胎最有价值的是（ D ） 181

- A.停经及不规则阴道流血 B.子宫异常增大，大于妊娠周数

C.妇科检查于附件区触到囊性肿物 D.尿中 HCG 呈高值

42.子宫膜癌最典型的临床症状为 (A) 205

A. 绝经后阴道出血 B.接触性出血 C.不规则阴道流血 D.月经量过多

43.子宫脱垂患者手术后应采取的体位是 (C) 178.194

A.头高脚低位 B.半卧位 C.平卧位 D.侧卧位

44.吸宫术适应的孕周? () 218

A.妊娠的任何时期 B.早孕时 C.妊娠 10 周以内 D.妊娠 >12 周

45.在下列避孕方法中,失败率高的是 ()

A.使用避孕套 B.使用阴道隔膜

C.利用安全期避孕 D.放置宫内节育器 E.按期口服避孕药 46. 子宫脱垂 II 度重型是指 () 178

A.子宫颈外口下降至处女膜缘内不足 4cm

B.子宫颈外口脱出阴道口外

C.子宫颈及部分子宫体脱出阴道口外

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/766130142030010050>