

## 护理三基模拟题+答案

1、小儿体格发育最快的时期在（ ）（ ）

- A、新生儿期
- B、婴儿期
- C、幼儿期
- D、学龄前期
- E、学龄期

答案：B

2、关于胸膜腔闭式引流装置，下列哪项是正确的（ ）

- A、水封瓶长玻管在水下3~4cm,水封瓶低引流口60cm
- B、水封瓶长玻管在水下3~4cm,水封瓶低引流口40cm
- C、水封瓶长玻管在水下4~6cm,水封瓶低引流口30cm
- D、水封瓶长玻管在水下4~6cm,水封瓶低引流口60cm
- E、水封瓶长玻管在水下2~3cm,水封瓶低引流口50cm

答案：A

3、下列哪项是首次急性发作腰椎间盘突出症首选治疗（ ）

- A、避免负重
- B、绝对卧床休息
- C、口服镇静止痛药物
- D、醋酸泼尼松龙局部封闭
- E、手术治疗

答案：B

4、《医学科研诚信和相关行为规范》适用于（ ）（ ）

- A、从事医学研究的所有人员
- B、医学研究的全过程
- C、基础医学、临床医学
- D、中医学与中药学
- E、以上均是

答案：E

5、医疗卫生机构有下列行为（ ），由卫生行政主管部门责令改正、通报批评、给予警告；情节严重的，吊销《医疗机构执业许可证》（ ）

- A、未依照本条例的规定履行报告职责，隐瞒、缓报或者谎报的
- B、未依照本条例的规定及时采取控制措施的
- C、拒绝接诊病人的
- D、拒不服从突发事件应急处理指挥部调度的

E、以上都是

答案：E

6、病人,男,65岁。确诊为冠心病2年。护士为其进行健康教育时,告知其引起发病的危险因素不包括( ) ( )

A、高血压

B、高血糖

C、肥胖

D、高纤维素饮食

E、缺少运动

答案：D

7、患儿,8岁。咳嗽2周,病除发热,近1周咳嗽加剧,晚间明显,痰稠伴胸痛。体检:双肺呼吸音稍粗,偶闻干鸣音。胸部x线片示肺门阴影增浓,右下肺可见云雾状阴影。曾用过利巴韦林及青霉素无效,后改为红霉素症状明显好转。应考虑的诊断是( ) ( )

A、腺病毒肺炎

B、过敏性肺炎

C、支原体肺炎

D、合胞病毒肺炎

E、真菌性肺炎

答案：C

8、患者男,38岁。胆道手术、T管引流半个月,拔管前先试行夹管1-2天,护理应观察最重要的内容是( )

A、腹痛、发热、黄疸

B、生命体征

C、睡眠和饮食

D、引流管口周围有无渗液

E、大便颜色

答案：A

9、晨会时间不超过()分钟( )

A、10

B、15

C、20

D、30

E、60

答案：B

10、患者，男性，58岁，有肝硬化病史，某日突然呕出400ml鲜血后出现神志恍惚、淡漠少言、口齿不清、嗜睡、昼睡夜醒。呕血后出现以上症状的原因是（）（）

- A、失血量多导致休克
- B、失血后引起脑卒中
- C、失血造成脑组织缺氧
- D、失血量大于干扰脑代谢
- E、肠道积血产氨增多

答案：E

11、新冠肺炎患者解除隔离管理或出院后继续进行（）天居家健康监测，佩戴口罩，有条件的居住在通风良好的单人房间，减少与家人的近距离密切接触，分餐饮食，做好手卫生，避免外出活动（）

- A、2
- B、3
- C、5
- D、7
- E、10

答案：D

12、蛛网膜下腔出血最常见的原因是（）（）

- A、颅内肿瘤破裂
- B、动静脉畸形
- C、颅内动脉瘤破裂
- D、高血压脑动脉硬化
- E、头部创伤

答案：C

13、对于抗原检测适用人群，不正确的是（）（）

- A、到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员
- B、到三甲医院就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状7天以内的人员
- C、隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员
- D、有抗原自我检测需求的社区居民

答案：B

14、下列不属于阿拉明用药不良反应的是（）

- A、心律失常

- B、肝肾功能异常
- C、抽搐
- D、急性肺水肿
- E、外渗引起组织坏死或红肿硬结

答案：B

15、陈先生，36岁，与朋友聚餐回家后出现左上腹疼痛，逐步波及全腹，腹痛加重。入院后检查全腹压痛、反跳痛、肌紧张，腹腔穿刺有淡红色血性液体，血清胰淀粉酶升高，本病例应首先考虑（）（）

- A、急性胰腺炎
- B、胃肠穿孔
- C、阑尾穿孔
- D、胆囊穿孔
- E、急性胃肠炎

答案：A

16、下肢骨折进行皮牵引时采取何种卧位（）

- A、端坐位
- B、半坐卧位
- C、头低足高位
- D、头高足低位
- E、俯卧位

答案：C

17、热疗法的局部生理效应为（）

- A、血管收缩
- B、血流加快
- C、神经传导速度减慢
- D、代谢减慢
- E、需氧量减少

答案：B

18、患儿张某，左上肢烫伤，Ⅱ度烫伤面积达10%，入院后经评估需使用保护具，下列哪项措施不正确（）（）

- A、使用前需取得病人及家属的理解和同意
- B、属于保护性制动措施，只能短期使用
- C、将病人右上肢外展固定于身体右侧
- D、约束带下应置衬垫，且松紧适宜
- E、经常观察约束部位的皮肤颜色和温度

答案：C

19、成人鼻饲流质时，其胃管的长度为（ ）

- A、35~45cm
- B、45~55cm
- C、50—60cm
- D、40~60cm
- E、40~55cm

答案：B

20、国务院有关部门、省级人民政府及其有关部门应当有效引导社会舆论科学、准确报道生物恐怖袭击和生物武器攻击事件，及时发布疏散、转移和紧急避难等信息，对应急处置与恢复过程中遭受污染的区域和人员进行长期（ ）

（ ）

- A、危害评估和消毒处理
- B、消毒隔离和加强防护
- C、环境监测和健康监测
- D、消毒隔离和生态恢复

答案：C

21、膀胱炎病人的尿液呈（ ）

- A、烂苹果味
- B、硫化氢味
- C、粪味
- D、氨臭味
- E、大蒜样臭味

答案：D

22、《发表学术论文“五不准”》中，错误的是（ ）（ ）

- A、不准由“第三方”代写论文
- B、不准由“第三方”代看论文
- C、不准由“第三方”对论文内容进行修改
- D、不准提供虚假同行评审人信息
- E、不准违反论文署名规范

答案：B

23、患者，男，40岁，因外伤导致左下肢毁损伤，予以急诊截肢手术，截肢术后安装假肢时间为（ ）

- A、术后1周
- B、术后即装临时假肢

- C、不完全骨折
- D、术后 20 天
- E、术后 1 个月

答案：B

24、下列哪种症状不是骨折特有的表现（ ）

- A、畸形
- B、反常活动
- C、疼痛与压痛
- D、功能障碍
- E、精神障碍

答案：E

25、儿童输血的速度应该控制在（ ）（ ）

- A、5~7ml/min
- B、1~2ml/min
- C、2~4ml/min
- D、3ml/min
- E、6ml/min

答案：C

26、常用于反映肾小球滤过率功能的指标是（ ）

- A、血肌酐
- B、尿渗量
- C、尿蛋白
- D、昼夜尿比重
- E、尿  $\beta_2$  微球蛋白

答案：A

27、“2/2E”表示（ ）（ ）

- A、清洁灌肠后未解大便
- B、清洁灌肠后解大便 1 次
- C、清洁灌肠前解大便 1 次、清洁灌肠后解大便 2 次
- D、清洁灌肠后解大便 3 次以上
- E、第 2 次清洁灌肠后解大便 2 次

答案：E

28、患者，女性，剖宫产术前医嘱与导尿，下列消毒尿道口及小阴唇的顺序正确的是（ ）（ ）

- A、自上而下，由内向外

- B、自上而下，由外向内
- C、自下而上，由内向外
- D、自下而上，由外向内
- E、尿道口外螺旋式消毒 2 次

答案：B

29、《中华人民共和国护士条例》自（）年 5 月 12 日起施行。（）

- A、2005
- B、2006
- C、2007
- D、2008
- E、2009

答案：D

30、病人安置原则，以下哪项错误（）

- A、感染与非感染病人分开安置
- B、同类感染病人分室安置
- C、特殊感染病人单独安置
- D、传染病和可疑传染病要按传染病常规隔离
- E、同类感染病人可安置同一病室

答案：B

31、关于锐器伤的预防，错误的是（）

- A、应立即采取相应的保护措施，清创，对创面进行严格消毒处理
- B、对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访
- C、被 HBV 阳性病人血液、体液污染了的锐器刺伤，应在 1 周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白
- D、被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤，应进行血液乙型肝炎标志物检查
- E、被 HBV 阳性病人血液、体液污染了的锐器刺伤，血液乙型肝炎标志物阴性者按规定接种乙型肝炎疫苗

答案：C

32、患儿男，2 岁。患先天性心脏病。因支原体肺炎入院。平时由保姆照顾，此时资料的主要来源是（）

- A、患儿母亲
- B、患儿
- C、保姆
- D、文献资料

E、患儿父亲

答案：C

33、医嘱必须由本医疗机构拥有（）开具方可执行（）

A、医师资格证和处方权的医师

B、医师执业证和处方权的医师

C、医师资格证、执业证、处方权的医师

D、医师执业证的医师

E、医师资格证的医师

答案：C

34、最严重的石膏综合征是（）（）

A、呼吸困难

B、剧烈疼痛

C、急性胃扩张

D、寒战

E、末梢血运差

答案：C

35、对长期应用抗生素的患者，观察口腔特别注意（）（）

A、有无牙结石

B、有无真菌感染

C、口唇是否干裂

D、有无口臭

E、牙龈有无肿胀出血

答案：B

36、患儿女，生后8天因惊厥入院，遵医嘱静脉补钙，在输液过程中患儿心率低于多少应停用（）

A、80次/分

B、110次/分

C、90次/分

D、70次/分

E、100次/分

答案：A

37、3级肌力指（）（）

A、肌肉轻微收缩，但不能产生动作。（似动非动）

B、肢体能在床上移动，但不能对抗地心引力。（水平运动）

C、肢体能抬离床面，但不能抵抗阻力。（垂直运动）

D、肢体不能抵抗较强阻力

E、肢体能够抵抗较强阻力

答案：C

38、申报难免压力性损伤除具备基本条件外，还应具备的其他条件除外（ ）

A、大小便失禁

B、重度水肿

C、极度消瘦

D、拒卧气垫床

E、肢体感觉异常

答案：E

39、不是静脉输血并发症的是（ ）

A、非溶血性发热反应

B、溶血反应

C、循环负荷过重（肺水肿）

D、代谢性酸中毒

答案：D

40、抢救心搏骤停患者，首先实施的是（ ）

A、开放气道

B、清除呼吸道分泌物

C、人工呼吸

D、胸外心脏按压

答案：D

41、护士在临床操作过程中被乙肝、丙肝阳性患者血液污染的针头刺伤后，应在24小时内抽血查乙肝、丙肝抗体，同时注射（ ）

A、乙肝免疫高价球蛋白

B、丙种球蛋白

C、白蛋白

D、乙肝疫苗

E、卡介苗

答案：A

42、骨折晚期并发症有（ ）（ ）

A、血管损伤

B、骨筋膜室综合征

C、关节僵硬

D、脂肪栓塞

E、神经损伤

答案：C

43、关于肛门坐浴护理，错误的是（ ）（ ）

A、准备清洁坐浴盆

B、用 1：5000 高锰酸钾溶液

C、坐浴 15~20 分钟

D、水温保持 60 度

E、年老体弱者防止跌倒

答案：D

44、骨折患者功能锻炼的原则正确的是（ ）（ ）

A、伤后 1~2 周以患肢肌肉的等长舒缩运动为主

B、伤后 1~2 周以骨折远近侧关节运动为主

C、伤后 3~4 周以重点关节为主的全身活动

D、伤后 3~4 周以患肢肌肉的舒缩运动为主

E、伤后 6~8 周以骨折远近侧关节运动为主

答案：A

45、除颤仪的保养不包括（ ）

A、恢复除颤仪的出厂设置

B、清洁记录仪打印头

C、维护电池

D、清洁仪器外表面、电极板

答案：A

46、防止烧伤休克的主要措施是（ ）

A、保暖

B、镇痛、镇静

C、创面处理

D、补液治疗

E、多饮水

答案：D

47、医学科研机构应当加强对科研论文和成果发表的（ ）（ ）

A、署名管理

B、论文管理

C、字数管理

D、页码管理

E、真实性管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786001134240010043>