

常见伤病处置理论知识考核

一、选择题

1. 虽然引起休克的原因不同，但各类休克的共同点都是（） [单选题] *

A.口唇发绀

B.血压下降

C.有效循环血量锐减 ✓

D.尿量减少

E.心率加快

2. 伤员男，20岁。右小腿软组织挫裂伤3小时，急诊行清创术后，给予静脉滴注头孢唑林，输液5分钟时，伤员出现胸闷气急、烦躁不安、头晕和面色苍白。检查伤员脉速而弱，最可能诊断（） [单选题] *

A.失血性休克

B.心源性休克

C.过敏性休克 ✓

D.神经性休克

E.感染性休克

3. 伤员男，30岁，左上腹被汽车撞伤后出现腹痛、恶心、呕吐2小时。查体：T36.2℃，P120次/分，R22次/分，BP70/50mmHg。意识尚清，面色苍白，四肢发凉。全腹有压痛、反跳痛、肌紧张，肠鸣音弱。B超检查：脾包膜连续性中断，局部回声模糊，脾周及腹腔内可见异常液性暗区。最可能的诊断是（） [单选题] *

A.脾破裂合并心源性休克

B.脾破裂合并失血性休克 ✓

C.脾破裂合并神经性休克

D.脾破裂合并感染性休克

E.脾破裂合并肠破裂

4 .伤员男, 24 岁。背部刀刺伤, 2 小时后被抬入院。查体:神志清楚, 烦躁, 诉口渴, 皮肤苍白、稍冷, 脉搏 110 次/分, 收缩压 90~70mmHg,表浅静脉塌陷, 伤口仍有少许渗血。最合理的处理是 () [单选题] *

A.只需将伤口缝合

B.立即输血浆

C.快速静滴平衡盐溶液同时做好手术准备 ✓

D.纱布包扎伤口继续观察

E.给予大量升压药物

5 .严重烧伤患者休克期出现烦躁不安、血压下降, 主要是由于 () [单选题] *

A. 询

8 .中枢神经系统异常

C.血容量不足 ✓

D.脓毒血症

E.心理因素

6. 休克病人的体位一般采用 () [单选题] *

A.头高脚低位

B.头低脚高位

C.平卧位

D.头和躯干抬高 20。~30。 , 下肢抬高 15o-20oV

E.侧卧位

7 . 男性, 23 岁, 因车祸导致四肢多发性骨折, 右大腿挤压伤。查体时面色苍白, 口渴, 脉搏 120 次/分, 血压 80/60mmHg, 给予紧急扩容, 首选液体是 () [单选题] *

A.全血

B 血浆

C.10%葡萄糖液

D.右旋糖好液

E.5%葡萄糖等渗氯化钠溶液 ✓

8 . 男, 24 岁, 因交通事故受伤后出现精神兴奋, 烦躁不安, 出冷汗, 心率 100 次/分, 脉压缩小, 尿量减小。可能的情况 () [单选题] *

A.休克可疑

9 . 休克抑制期

C.已有休克 ✓

D.尚无休克

E.休克晚期

10 卢页脑损伤伤员, 经检伤考虑卢页内压增高, 给予 20%甘露醇溶液降低卢页内压, 以下输液方法正确的是 () [单选题] *

A 快速静推

11 缓慢静滴, 防止高渗液产生静脉炎

C.1~2 小时内静滴完 250ml

D.15~30 分钟内静滴完 250ml

E 输液速度控制在 60~80 滴/分

10 . 颅脑外伤后颅内压增高症状明显， 检伤后考虑颅内血肿， 此时下列哪项诊疗措施最不宜采用（）

[单选题] *

A.冬眠低温和巴比妥疗法, 降低颅脑组织代谢

11 闭式持续引流性脑室外引流

C.腰穿放出血性脑脊液减压 ✓

D.气管内插管过度换气呼吸

E.脱水和激素治疗

12 .有关颅底骨折， 下列哪项错误（） [单选题] *

A.颅底 X 线检查可无阳性发现

B.依靠临床体征可以诊断

C.诊断需有脑脊液外漏发生 ✓

D.单纯颅底骨折以保守治疗为主

E.脑脊液漏无需早期修补

13 . 某战士颅脑受到撞击后， 诊断为脑震荡， 可出现（） [单选题] *

A.伤员不能描述受伤经过 ✓

14 昏迷时间常大于 30 分钟

C.神经系统检查一定有病理反射

D.脑脊液常规、生化有异常

E.CT 检查可有阳性表现

13. 男, 20 岁, 高空坠落伤。查体: BP70/50mmHg, HR100 次/分, 躁动, 双侧瞳孔等大, 对光反应

阳性, 腹腔穿刺抽出未凝血液, 头部 CT 检查示左额硬脑膜下血肿, 血 M 量约 20ml, 中线无明显移位。该病例最佳处理方案 () [单选题] *

- A. 立即开颅清除血 M
- B. 抗休克治疗的同时行开颅血肿清除术
- C. 抗休克治疗的同时先行开腹探查 ✓
- D. 抗休克治疗至血压正常后再行手术
- E. 开颅及开腹探查同时进行

14 男性, 23 岁, 一阵剧烈咳嗽后突发胸闷、胸痛, 来医院急诊。查体: 气管右移, 左肺呼吸音消失, 叩诊

呈鼓音。胸片示左肺被压缩 80%, 此时应采取主要的治疗措施是 () [单选题] *

- A. 剖胸手术
- B. 胸腔闭式引流 ✓
- C. 吸氧
- D. 穿刺抽气
- E. 镇静、止咳

15 男性, 26 岁, 胸部外伤后出现反常呼吸运动, 急诊处理为 () [单选题] *

- A. 剖胸探查
- B. 胸腔闭式引流
- C. 诊断性胸穿
- D. 胸壁胶布固定
- E. 胸壁加压包扎 ✓

16 . 男性, 28 岁, 不慎跌倒后诉左侧胸痛, 咳嗽时加剧。体格检查: 无反常呼吸, 左肺呼吸音减弱, 无啰

音，左侧胸廓前后挤压试验阳性。关于此伤员，下列说法哪项正确（） [单选题] *

- A.诊断以左侧肋骨骨折可能大，好发于第 9~12 肋
- B.诊断以左侧肋骨骨折可能大，好发于第 4~7 肋 ✓
- C.诊断以左侧肋骨骨折可能大，好发于第 1~3 肋
- D.若为多根单处肋骨骨折，因肋间肌的牵拉，易发生上下移位
- E.若为第 12 肋骨折，性质尤为严重

17 .急性阑尾炎最典型的症状是（） [单选题] *

- A.右下腹疼痛
- B.发热
- C.转移性右下腹疼痛 ✓
- D.恶心呕吐
- E.腹部隐痛

18 .急性阑尾炎最常见的重要体征是（） [单选题] *

- A.右下腹麦氏点压痛 ✓
- B.腹部反跳痛
- C.腹肌紧张
- D.右下腹包块
- E.腹膜刺激征阳性

19 .开放性腹部损伤中最容易损伤的脏器是（） [单选题] *

- A 胃
- B 胰腺
- C.肝脏 ✓
- D.小肠

E.肾脏

20 . 闭合性腹部损伤中最容易损伤的脏器是 () [单选题] *

A. 小肠

B. 脾脏 ✓

C. 肾脏

D. 胰腺

E. 肝脏

21 . 闭合性腹部损伤时, 下列哪项不支持腹腔内脏损伤的诊断 () [单选题] *

A. 早期出现休克

B. 明显腹膜刺激征

C. 出现便血

D. 肠鸣音活跃 ✓

E. 出现呕血

22 . 某战士患肾结石, 发生肾绞痛时, 首选治疗方法 () [单选题] *

A. 抗感染治疗

B. 解痉镇痛 ✓

C. 局部热敷

D. 口服中药

E. 针灸

23. 男, 20 岁, 骨盆被重物挤压伤 2 小时入院, 查体: P120 次/分 BP80/50mm/Hg_β 面色苍白, 全腹压痛、反跳痛, 肌紧张明显, 以下腹部为甚。移动性浊音 (+) 骨盆 X 光片: 露骨线性骨折。经补液后, 生命体征平稳, 但

仍无尿，留置尿管仅有 50ml 尿液流出，淡红色。根据伤员病史、体征，结合辅助检查，腹

- A.肾损伤
- B.膀胱损伤 ✓
- C.输尿管损伤
- D.直肠损伤
- E.尿道损伤

24 .男，20 岁，阵发性右侧腰腹部绞痛 1 天，伴恶心呕吐，无发热，腹痛发作时向右下腹放射伴尿频、尿急、尿痛等症状，查体：腹软，右下腹有压痛，无反跳痛，膀胱区不胀，血 WBC 正常，尿常规 WBC0~1 个/HP，最可能的诊断是（） [单选题] *

- A.阑尾炎
- B.肾肿瘤
- C.肾结石
- D.泌尿系感染
- E.右侧输尿管结石 ✓

25 .小腿开放性骨折伤员，查体发现足背动脉搏动弱，下肢麻木后疼痛，初步采取哪种措施（） [单选题]

*

- A. 群怵
- B.减压术 ✓
- C.包扎
- D.手术复位克氏针固定
- E.骨牵引后行髓内钉固定

26 . 伤员男性,28 岁, 摔倒后致左肩关节脱位,X 线片未见合并骨折征象, 首先应采取哪种处置措施 ()

- A.局麻后手法复位 ✓
- B.局麻后切开复位
- C.全麻后手法复位
- D.切开复位后同时修复关节囊
- E.骨牵引后行外展架固定

27 伤员男性，22 岁，投弹训练后致右上肢疼痛、肿胀、功能障碍，查体肱骨成角畸形、异常活动，右手血运及肌力正常，采用哪种初步处置措施（） [单选题] *

- A.冰袋冷敷
- B.止痛药止痛
- C.吸氧
- D.抗休克
- E.妥善固定 ✓

28 . 伤员男性，25 岁，攀爬摔伤后致右手腕疼痛、肿胀、功能障碍，查体手腕部呈枪刺样畸形，右手血运及肌力正常，给予伤员手法复位后，石膏固定前注意（） [单选题] *

- A.注射局麻药
- B 消肿
- C.吸氧
- D.掌屈尺偏位 ✓
- E.屈曲固定

29 . 挠骨远端骨折伸直型的近端骨折移位方向（） [单选题] *

- A.手背侧移位

B.掌侧移位 ✓

C.尺侧移位

D.横侧移位

E.外侧移位

30 . 下列骨折中最不稳定的类型是 () [单选题] *

A.嵌插骨折

31 斜骨折 ✓

C.青枝骨折

D 横骨折

E.裂缝骨折

31. 伤员男性，29 岁，右胫腓骨中段闭合骨折后行手法复位石膏外固定 24 小时，出现患肢持续性剧烈疼痛，进行性加重，此时首先采取的措施应为 () [单选题] *

A.予以确切有效的止痛药物

B.立即解除石膏外固定 ✓

C.抬高患肢以轻疼痛

D.更换石膏或改用其它的外固定方法

E.局部硫酸镁湿敷

32 伤员男性，23 岁，攀爬训练肩部着地，肩部疼痛、肿胀，查体左锁骨无明显移位，X 线显示左锁骨骨折，怎样处置 () [单选题] *

A.卷式夹板固定 3 周

B.石膏固定 2 个月

C.三角巾悬吊 2 周

- D.手术切开复位
- E.横 8 字固定 ✓

33 . 下列哪项不是接触性皮炎的特点 () [单选题] *

- A.边界清楚
- B.忽起忽消 ✓
- C.无接触物形态一致
- D.瘙痒
- E.红斑水疱

34 . 对接触性皮炎首先应采取的措施为 () [单选题] *

- A.扑尔敏口服
- B.激素乳膏外用
- C.脱离过敏环境
- D.去除接触物 ✓
- E.呼叫 120

35 . 下列哪项试验可辅助鉴别接触性皮炎 () [单选题] *

- A.皮内试验
- B.划痕 i 斯
- C.真菌直接镜检
- D.斑贴试验 ✓
- E.口服激发试验

36 . 下列哪项不符合荨麻疹 () [单选题] *

- A.起病急
- B.忽起忽消

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786151124025010050>