

内科理论知识试题及答案

1、诊断 I 型呼吸衰竭的血气诊断标准应是

- A、pH<7.35
- B、PaO₂ 低于 8kPa (60mmHg), PaCO₂ 高于 6.67kPa (50mmHg)
- C、PaO₂ 低于 8kPa (60mmHg), PaCO₂ 低于 6.67kPa (50mmHg)
- D、动脉血氧含量(SaO₂) 低于 20ml / dl
- E、动脉血氧饱和度(SaO₂) 低于 90%

答案：C

2、对肺组织纤维化程度的监测最简单、最实用的方法是

- A、放射性核素肺扫描
- B、支气管肺泡灌洗
- C、肺活检
- D、动脉血气分析
- E、肺功能测定

答案：E

3、限制大剂量环孢素长疗程治疗肾病综合征的最主要原因是

- A、引起血压升高
- B、导致肾小管间质纤维化
- C、多毛、牙龈增生
- D、肝功能损害
- E、费用昂贵

答案：B

4、引起左心室高侧壁心肌梗死闭塞的冠状动脉分支是

- A、左冠状动脉前降支
- B、右冠状动脉右室前支
- C、左冠状动脉回旋支
- D、右冠状动脉后降支
- E、左冠状动脉主干

答案：C

5、原发性扩张型心肌病的临床表现以下错误的是

- A、心电图无病理性 Q 波
- B、可有肝大、水肿
- C、起病缓慢

D、可有气急，甚至端坐呼吸

E、可有第三心音或第四心音

答案：A

6、以下哪项不是系统性硬化硬化期皮肤经典表现+

- A、皮革样皮肤 U
- B、口周皱褶+
- C、尖鼻 4
- D、面具脸+
- E、指垫消失

答案：E

7、肝性昏迷患者昏迷期最适宜的饮食是

- A、高热，高碳水化合物，高维生素，低蛋白质
- B、高热，高糖，高维生素，无蛋白质流汁食物
- C、高热，高糖，低脂，低盐低蛋白质
- D、高热，高糖，高蛋白，少纤维食物
- E、高热，高糖，高维生素，低脂，少量蛋白质食物

答案：B

8、急性早幼粒细胞白血病(M3)首选的药物治疗是

- A、羟基脲
- B、苯丁酸氮芥
- C、反式维. A 酸
- D、罗钙金(1, 25-OH₃. D₃)
- E、干扰素.

答案：C

9、骨髓增生性疾病除外下列哪项

- A、原发性血小板增多症
- B、慢性粒细胞白血病
- C、真性红细胞增多症
- D、骨髓增生异常综合征

答案：D

10、原发扩张型心肌病的病理改变是

- A、无间质纤维化
- B、心肌细胞仅有变性坏死，无肥大增生
- C、可有附壁血栓
- D、瓣膜有退行性变
- E、心腔扩大，室壁增厚

答案：C

11>诊断肝癌最有意义的肝脏体征是

- A、肝脏质地变硬
- B、肝脏有不同程度压痛
- C、肝震颤
- D、肝大
- E、肝表面可听到吹风样血管杂音

答案：E

12、下列哪种情况洋地黄剂量宜偏小

- A、风心病，主动脉瓣关闭不全，左心衰
- B、肺心病，心衰
- C、房颤
- D、风心病，二尖瓣狭窄，右心衰
- E、房扑

答案：B

13、对 ARDS 的严重性评价以及疗效的判断，有意义的肺功能监测结果是

- A、肺顺应性降低
- B、无效腔通气量增加
- C、无呼气流速受阻
- D、VD/VT 降低
- E、DlCO 降低

答案：A

14、肾病综合征造成低蛋白血症的主要原因是

- A、白蛋白分解增加
- B、肠胃吸收差
- C、肝脏合成白蛋白不足
- D、肾小管重吸收蛋白质减少
- E、肾小球毛细血管通透性增加

答案：E

15、人工心脏起搏的作用机制是

- A、替代心脏的自律性与传导性
- B、替代心脏的自律性与收缩性
- C、替代心脏的自律性与兴奋性
- D、替代心脏的兴奋性与传导性
- E、替代心脏的兴奋性与收缩性

答案：A

16、急性弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎引起高血压的可能原因是

- A、肾小管重吸收增加
- B、全身小动脉痉挛
- C、肾小球滤过率减少
- D、肾小管坏死
- E、肾小动脉透明变性

答案：C

17、下列对鉴别扩张型心肌病与缺血性心肌病型冠心病最有意义的是

- A、无创性心脏功能测定
- B、动态心电图
- C、床边漂浮导管检查
- D、超声心动图
- E、冠状动脉造影

答案：E

18、上消化道大出血最常见的病因为

- A、急性糜烂出血性胃炎
- B、食管贲门撕伤
- C、消化性溃疡
- D、胃癌
- E、食管胃底静脉曲张破裂出血

答案：C

19、下列哪项最有助于鉴别细菌性痢疾和溃疡性结肠炎

- A、有无脓血便
- B、有无便血
- C、有无发热
- D、有无里急后重
- E、抗生素治疗是否有效

答案：E

20、室性心动过速最常见的病因是

- A、感染性心内膜炎
- B、冠心病
- C、心肌病

- D、心肌炎
- E、心脏瓣膜病

答案：B

21、某患者由于后负荷增高引起的左心功能不全，下列措施中最重要的是

- A、异山梨酯——减少回心血量
- B、洋地黄——增强心肌收缩力
- C、血管扩张剂——降低外周阻力
- D、利尿剂——降低血容量
- E、吸氧——改善心肌代谢及缺氧状态

答案：C

22、溃疡型肠结核最典型的大便特征是

- A、便秘
- B、糊状便
- C、黏液脓血便
- D、鲜血便
- E、大便变细

答案：B

23、血浆凝血酶时间(TT)延长，常见于

- A、II 因子缺乏
- B、V 因子缺乏
- C、I 因子缺乏
- D、V11I 因子缺乏
- E、Vn 因子缺乏

答案：C

24、脾脏的显著肿大最常出现于下列哪种疾病

- A、类白血病反应
- B、慢性粒细胞白血病
- C、真性红细胞增多症
- D、传染性单核细胞增多症
- E、急性髓细胞白血病

答案：B

25、目前用于支气管扩张诊断的无创检查方法为

- A、支气管造影

- B、肺功能测定
- C、高分辨 CT
- D、纤维支气管镜
- E、胸正侧位片

答案：C

26、关于预激综合征合并心房颤动的治疗，下列描述错误的是

- A、可使用 IC 类抗心律失常药物
- B、可联合应用钙通道阻滞剂与 β 受体阻滞剂
- C、禁用钙通道阻滞剂
- D、禁用洋地黄类药物
- E、禁用 β 受体阻滞剂

答案：B

27、尿毒症时脂肪代谢的异常表现为

- A、血甘油三酯降低
- B、血胆固醇增高
- C、血胆固醇降低
- D、血甘油三酯增高
- E、血中游离脂肪酸增高

答案：D

28、易发生幽门梗阻的溃疡是

- A、胃窦溃疡
- B、幽门管溃疡
- C、球后溃疡
- D、胃角溃疡
- E、复合性溃疡

答案：B

29、一患者对奎尼丁过敏，房颤复律后最好选用的预防复发药物是

- A、维拉帕米
- B、地高辛
- C、普鲁卡因胺
- D、普萘洛尔
- E、胺碘酮

答案：E

30、肺结核的增殖性病变表现为

- A、钙化
- B、结核结节
- C、充血
- D、水肿
- E、干酪样坏死

答案：B

31、铁的吸收主要在

- A、十二指肠及空场上段
- B、各段小肠
- C、降结肠
- D、升结肠

答案：B

32、和肝性脑病程度平行的检查指标是

- A、Child 评分
- B、血 γ -氨基丁酸水平
- C、血钾水平
- D、血氨水平
- E、血清白蛋白水平

答案：B

33、下列关于慢性肺心病心律失常的治疗错误的是

- A、频发室性期前收缩选用利多卡因，
- B、频发房性期前收缩选用常规剂星洋地黄。
- C、室性心动过速可用利多卡因，
- D、窦性心动过速不宜用那受体阻滞剂
- E、偶发房性期前收缩，以纠正缺

答案：B

34、下列情况易引起房室传导阻滞的是

- A、心包积液
- B、肥厚性心肌病
- C、急性下壁心肌梗死
- D、预激综合征
- E、心肌炎

答案：C

35、幽门螺杆菌是一种致病菌，与此菌关系最密切的疾病是

- A、Zollinger-Ellison 综合征
- B、胃息肉
- C、胃平滑肌瘤
- D、胃癌
- E、反流性食管炎

答案：D

36、急性病毒性心肌炎临床表现中错误的是

- A、心肌损伤标志常正常
- B、可有心肌梗死样表现
- C、放射性核素心肌显像心室壁呈花斑样稀疏
- D、可有心力衰竭的表现
- E、发病前常有上感、腹泻病史

答案：A

37、下列心脏瓣膜病的临床表现中判断最正确的是

- A、主动脉瓣狭窄，左房左室大显著，心衰发生晚
- B、主动脉瓣关闭不全，左房左室大显著，心衰发生早
- C、二尖瓣关闭不全，左房左室大显著，心衰发生
- D、二尖瓣脱垂，左房左室大显著，心衰发生早
- E、二尖瓣狭窄，左房大显著，心衰发生晚

答案：C

38、克雷白杆菌肺炎有别于其他肺炎的最主要病理学特征是

- A、小叶性分布
- B、切面可挑起黏稠的丝状渗出物
- C、有明显的发展阶段
- D、常引起组织坏死形成空洞
- E、纤维组织增生

答案：B

39、肾盂肾炎患者尿蛋白定量通常为

- A、 $<3.0\text{g} / 24\text{h}$
- B、 $<1.0\text{g} / 24\text{h}$
- C、 $<2.0\text{g} / 24\text{h}$

D、 $<5.0\text{g} / 24\text{h}$

E、 $<4.0\text{g} / 24\text{h}$

答案：C

40、肺心病发生右室肥大的主要原因是

A、心律失常

B、心肌缺氧

C、细菌毒素对心肌的毒性作用

D、营养不良

E、肺循环阻力增加

答案：E

41、Fanconi 综合征的主要受累部位为

A、肾远曲小管

B、Henle 伴升支对氯离子转运异常

C、Henle 伴降支对水通透性异常

D、肾近曲小管

E、肾集合管

答案：D

42、下述检查可确诊二尖瓣狭窄的是

A、二尖瓣区闻及 Graham-Steel 杂音

B、胸部 X 线示心影呈梨形

C、超声心动图见二尖瓣叶增厚和瓣口面积缩小

D、心电图示左心房大

E、心尖部闻及舒张期隆隆样杂音

答案：C

43、下列不是心脏压塞的体征的是

A、肺部大量湿性啰音

B、血压下降

C、心率增快，心音低远

D、奇脉

E、颈静脉怒张

答案：A

44、代谢障碍引起肝硬化的肝豆状核变性（Wilson 病），下列哪项为非特征性的

A、肝脏铜含量增多

- B、血浆铜盐蛋白明显降低
- C、Kayser-Fleischer 角膜色素环
- D、血清铜增高
- E、尿铜排泄增多

答案：D

45、预激综合征患者最常见的心律失常为

- A、心室颤动
- B、正向房室折返性心动过速
- C、逆向房室折返性心动过速
- D、心房颤动和心房扑动
- E、房性心动过速

答案：B

46、二尖瓣狭窄患者，急性发作快速房颤，心室率 170 次 / min, 血压 70 / 40 mmHg, 最合适的抢救措施是

- A、静注毛花甙 C
- B、静滴地尔硫卓
- C、静注维拉帕米
- D、口服 β 受体阻滞剂
- E、立即同步电复律

答案：E

47、有关 DukeS 大肠癌临床病理分期法，错误的是

- A、.A 期，癌局限于肠壁
- B、.A 期，癌局限于大肠黏膜和黏膜下层
- C、.D 期，有远处转移
- D、.C 期，有局部淋巴结转移
- E、.B 期，癌穿透浆膜

答案：B

48、下列哪种疾病是结肠癌的高危疾病

- A、细菌性痢疾
- B、肠易激综合征
- C、大肠息肉
- D、大肠结核
- E、阿米巴痢疾

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788074143121006034>