

ICU 多重耐药菌感染防控调查表

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

一、受调查人员基本信息

1.您的工号 [单选题] *

- 1~2 年
- 3~5 年
- 5~10 年
- 10 年以上

1.职称* [单选题] *

- 护士
- 护师
- 主管护师
- 副主任护师
- 主任护师
- 住院医师
- 主治医师
- 副主任医师
- 主任医师

2.层级（护理填写）* [单选题]

- NO
- N1
- N2

N3

N4

4.学历 [单选题] *

大专

本科

研究生

硕士

博士

3.人员类别 [单选题] *

本科室人员

进修生

实习生

规培生

二、防控知识调查

请根据您对多重耐药菌相关知识的理解和认识选择您认为合适的答案。

4.多重耐药菌主要是指对临床使用的3类或3类以上抗菌药物同时呈现耐药的细菌。* [单选题] *

正确

错误

5.护理多重耐药菌感染患者时要采取标准预防配合接触隔离的预防措施* [单选题] *

正确

错误

6.标准预防只应用于确诊为感染状态或处于感染潜伏期的患者。* [单选题] *

- 正确
- 错误

9.实施标准预防，主要目的是保护医务人员。* [单选题] *

- 正确
- 错误

10.对多重耐药菌感染或定植患者实施单间隔离，没有条件进行单间隔离时应当进行床旁隔离。* [单选题] *

- 正确
- 错误

7.多重耐药菌感染患者使用蓝色隔离标识。* [单选题] *

- 正确
- 错误

8.可以将定植或感染不同类型多重耐药菌的患者安置在同一房间。* [单选题] *

- 正确
- 错误

9.多重耐药菌定植或者感染患者不可与留置各种管道、有开放伤口或者免疫功能低下的患者安置在同一房间。* [单选题] *

- 正确
- 错误

10.护理多重耐药菌感染患者无需采取专人护理。* [单选题] *

- 正确
- 错误

11.护理人员对患者实施护操作时，应当将高度疑似或确诊多重耐药菌感染患者或定植患者安排在最前面进行。* [单选题] *

- 正确
- 错误

12.多重耐药菌感染或者定植患者转诊之前应当通知接诊的科室，采取相应隔离措施。* [单选题] *

- 正确
- 错误

13.连续3个标本（每次间隔>24小时）均未培养出多重耐药菌或感染已经痊愈方可解除隔离。* [单选题] *

- 正确
- 错误

14.多重耐药菌感染患者使用的医疗器械、器具及物品如听诊器、血压计、体温表等要专人专用，并及时清洁消毒处理。* [单选题] *

- 正确
- 错误

15.轮椅、担架、床旁心电图机等不能专人专用的医疗器械、器具及物品要在每次使用后擦拭消毒。* [单选题] *

- 正确
- 错误

20.多重耐药菌定植或感染患者的诊疗环境要使用专用的抹布进行清洁和消毒。* [单选题] *

- 正确

错误

16.多重耐药菌感染患者住过的房间要进行终末消毒。* [单选题] *

正确

错误

17.直接接触患者前后、对患者实施诊疗护理操作前后应洗手或手消毒。* [单选题]

*

正确

错误

18.接触不同多重耐药菌患者之间应洗手或手消毒。* [单选题] *

正确

错误

24.接触同一患者不同部位间可不洗手。* [单选题] *

正确

错误

19.手上有肉眼可见污染时，应当洗手;无肉眼可见污染时，可以使用速干手消毒剂进行手部消毒。* [单选题] *

正确

错误

20.*因为戴手套可以防止手部污染，脱手套后不需要洗手。* [单选题] *

正确

错误

21.穿脱隔离衣前后应洗手或手消毒。* [单选题] *

- 正确
- 错误

22.接触多重耐药菌感染患者的伤口、血液、体液、引流液、分泌物时应戴手套，摘除手套后应立即进行洗手或手消毒。* [单选题] *

- 正确
- 错误

29.接触患者分泌物或排泄物的操作时，手部皮肤发生破损，戴双层手套。* [单选题] *

- 正确
- 错误

23.接触患者破损的皮肤、粘膜时戴无菌手套。* [单选题] *

- 正确
- 错误

24.当进行有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物喷溅的护理操作时戴面罩、口罩、护目镜、穿防护服。* [单选题] *

- 正确
- 错误

25.多重耐药菌感染患者产生的生活垃圾和医疗废物应使用双层黄色医疗废物袋统一处理，并注明“多重耐药菌”。* [单选题] *

- 正确
- 错误

三、防控态度调查表

下面是护士多重耐药菌隔离防控态度的相关内容，针对每项内容我们分为从“非常不同意”——“非常同意”5个等级，请根据您的真实态度在选择相应的等级。

33.多重耐药菌感染很常见，需特别关注。* [单选题] *

- 非常不同意
- 不同意
- 中立
- 同意
- 非常同意

26.多重耐药菌感染常造成患者病死率增高，医疗费用增加，给患者带来巨大的经济损失的同时也造成了医疗资源的浪费，因此，作为医务工作者，我们有必要采取相应措施预防和控制多重耐药菌的感染和传播。* [单选题] *

- 非常不同意
- 不同意
- 中立
- 同意
- 非常同意

35.临床护士在预防和控制多重耐药菌院内传播中扮演着重要角色。* [单选题] *

- 非常不同意
- 不同意
- 中立
- 同意
- 非常同意

36.临床护士多重耐药菌隔离防控措施执行好可有效控制多重耐药菌的传播。* [单选题] *

- 非常不同意
- 不同意
- 中立
- 同意
- 非常同意

27.临床护士正确认识并掌握多重耐药菌及隔离防控措施很重要。* [单选题] *

- 非常不同意
- 不同意
- 中立
- 同意
- 非常同意

28.有必要加强目前临床护士多重耐药菌相关知识的培训与继续教育。* [单选题] *

- 非常不同意
- 不同意
- 中立
- 同意
- 非常同意

39.医护人员做好手部卫生对控制医院感染具有重要意义。* [单选题] *

- 非常不同意
- 不同意
- 中立
- 同意

非常同意

29.若接触多重耐药菌感染患者，我会特别小心，以免携带或感染多重耐药菌。*

[单选题] *

非常不同意

不同意

中立

同意

非常同意

41.面对患者、家属及其他医务工作者不到位或错误的行为，护士应该及时制止并给予指导。* [单选题] *

非常不同意

不同意

中立

同意

非常同意

30.工作中我担心因为自己手卫生不到位、无菌技术不合格等原因导致患者感染。*

[单选题] *

非常不同意

不同意

中立

同意

非常同意

31.我常担心把医院的病菌带回家，影响家人健康。* [单选题] *

- 非常不同意
- 不同意
- 中立
- 同意
- 非常同意

四、防控态度调查表

下面是多重耐药菌隔离防控措施的相关内容，针对每项内容我们分为从“完全做不到”——“完全做得到”5个等级，请根据您日常护理工作的经验对身边的其他护士多重耐药菌感染防控行为依从性状况进行真实评价，选择相应的等级。

31.接触患者前。* [单选题] *

- 完全做不到
- 偶尔做得到
- 约一半做得到
- 大部分做得到
- 完全做得到

32.接触患者后。* [单选题] *

- 完全做不到
- 偶尔做得到
- 约一半做得到
- 大部分做得到
- 完全做得到

33.处理药物或者配餐前。* [单选题] *

- 完全做不到

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805012131114011104>