

急救理论知识试题库（附答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、关于腹外疝手术前后的护理哪一项是错误的（ ）

- A、术后 3 个月内应避免重体力劳动
- B、股疝和腹股沟疝术前应严格准备会阴部皮肤
- C、腹股沟疝术后，应在患侧膝下垫一小枕头
- D、腹股沟斜疝术后阴囊托起是无意义的
- E、择期手术前，应治愈或控制可引起腹内压升高的症状

正确答案：D

2、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为（ ）

- A、仰头举颏法
- B、托颈法
- C、环状软骨压迫法
- D、双手推举下颌法
- E、托颏法

正确答案：A

3、院外急救护理程序为：（ ）

- A、现场救护、转运与途中监护、现场评估与呼救
- B、现场评估与呼救、转运与途中监护、现场救护
- C、现场救护、现场评估与呼救、转运与途中监护
- D、现场评估与呼救、现场救护、转运与途中监护

正确答案：D

4、多发伤急救现场处理错误的是（ ）（ ）

- A、检查要简便易行
- B、尽快将伤者移到安全地带
- C、原则是不耽误抢救
- D、尽量减少搬动伤员
- E、必要时做心肺复苏

正确答案：B

5、施行人工呼吸时，当患者出现极微弱的自然呼吸时，应如何处理？（ ）

- A、立即停止人工呼吸
- B、继续进行人工呼吸，但人工呼吸应与其自然呼吸的节律相反
- C、继续进行人工呼吸，且人工呼吸应与其自然呼吸的节律一致

正确答案：C

6、关于非同步直流电除颤，不正确的是()

- A、首次能量选用 200J
- B、如室颤为细颤，可给予处理使之变为粗颤再行电除颤
- C、除颤时，操作者要紧贴床体，保持身体稳定
- D、电极板放置位置要正确
- E、急性心肌缺血引起的室颤，除颤易于成功

正确答案：C

7、应先首先判断()

- A、循环
- B、呼吸
- C、意识
- D、气道

正确答案：C

8、患者，女性，35岁。支气管哮喘重度发作2天，使用氨茶碱、沙丁胺醇、大剂量激素治疗无效。体检：呼吸浅快，口唇发绀，神志不清，双肺哮鸣音较弱。血气分析：PaO₂ 50mmHg，PaCO₂ 70mmHg。进一步救治措施为：()

- A、给予高浓度吸氧
- B、气管插管，正压机械通气
- C、联合应用抗生素静脉滴注
- D、静脉推注地塞米松
- E、静脉滴注5%碳酸氢钠

正确答案：B

9、治疗尖端扭转型室速不宜选用下列哪种药物()

- A、镁盐.
- B、利多卡因
- C、普罗帕酮
- D、异丙肾上腺素
- E、心得安

正确答案：C

10、开放性气胸抢救的首要措施是()

- A、快速输液
- B、封闭伤口，变开放性气胸为闭合性气胸
- C、呼救

D、嘱深呼吸

E、取平卧位

正确答案：B

11、成人心肺复苏时肾上腺素的用法为()

A、1mg，稀释后静脉推注，每5分钟重复一次；

B、1mg-3mg-5mg-5mg，稀释后静脉推注，每5分钟重复一次。

C、1mg-3mg-5mg，稀释后静脉推注，每5分钟递增；

D、5mg，稀释后静脉推注，每5分钟重复一次；

正确答案：A

12、一个成年人头面颈部及左上肢被开水烫伤，起大小水疱，血浆样渗出，其烧伤面积计算为()

A、浅II° 28%

B、深II° 20%

C、深II° 25%

D、浅II° 15%

E、浅II° 18%

正确答案：E

13、大腿上的止血带的标准部位_____。()

A、大腿上1/3

B、大腿1/2

C、大腿上1/4

D、大腿中下1/3交界处

正确答案：D

14、急性肺水肿时，患者应采取的体位是()

A、侧卧位

B、半坐卧位

C、头低脚高位

D、去枕平卧位

正确答案：B

15、休克病人补液一般首选()

A、全血

B、10%葡萄糖液

C、右旋糖苷

D、血浆

E、平衡盐溶液

正确答案：E

16、灾区大面积灭蝇的理想方法是（ ）

A、小型便携喷雾器喷药灭蝇

B、烟熏灭蝇

C、卡车装载高压喷雾机喷药灭蝇

D、生物灭蝇

E、飞机喷药灭蝇

正确答案：E

17、符合器官功能障碍的评分标准是（ ）

A、肾：需肾替代治疗

B、肠、胃：应激性溃疡

C、血液：弥散性血管内凝血

D、肝：胆红素 $I \geq 272 \sim 340 \mu\text{mol/L}$

E、中枢神经：意识障碍，轻度定向力障碍

正确答案：E

18、药物产生副作用的剂量是（ ）

A、治疗量

B、无效剂量

C、中毒量

D、LD50

正确答案：A

19、在我国，糖尿病死亡的主要原因是（ ）

A、高渗性非酮症糖尿病昏迷.

B、肾微血管病变

C、脑血管意外、冠心病

D、酮症酸中毒

E、感染

正确答案：C

20、患者今晨小腿关节扭伤，局部青紫，为防止皮下出血与肿胀，早期应选用（ ）

A、热湿敷

B、冷湿敷

C、局部按摩

D、红外线照射

正确答案：B

21、下列哪一种食物中毒可呈现阵发性腹部绞痛，大便呈洗肉水样()

A、葡萄球菌食物中毒

B、沙门氏菌食物中毒

C、变形杆菌食物中毒

D、肉毒杆菌食物中毒

E、嗜盐菌食物中毒

正确答案：C

22、急性左心衰竭的救治原则哪个不正确()

A、使患者呈半坐位，双小腿下垂；

B、使用碳酸氢钠。

C、静脉注射呋塞米或硫酸吗啡；

D、纯氧面罩吸人，氧饱和度要达 95%以上。意识模糊或呼吸无力者可气管插管；

E、含服硝酸甘油，然后静脉点滴硝酸甘油，使收缩压维持在 90~100mmHg 对顽固性高血压或对硝酸甘油无反应者可静脉点滴硝普钠；

正确答案：B

23、现场医疗救援管理的原则错误的是()

A、遵从灾难救援的基本规律

B、根据检伤分类将伤者分为四类：红、蓝、绿、黑

C、根据伤情确定医院救治能力

D、根据就近、就急、就能力的原则转送病人

E、先后转送医院

正确答案：B

24、发热、昏迷、脑膜刺激征阳性，首先考虑的诊断是()

A、颅脑外伤

B、脑炎、脑膜炎

C、脑瘤

D、肝性脑病

E、蛛网膜下腔出血

正确答案：B

25、张力性气胸急救首先是()

A、手术治疗

- B、排气减压
- C、胸带固定
- D、抗生素治疗
- E、镇静止痛观察

正确答案：B

26、心跳骤停的主要原因是()

- A、心脏后负荷增加
- B、室颤
- C、房颤
- D、心肌收缩力减弱

正确答案：B

27、下列哪项不是肺动脉瓣狭窄的临床表现()

- A、胸骨左缘第二肋间可听到 III—IV / 6 级收缩期杂音
- B、心电图示右室扩大
- C、钱示左室大，肺瘀血.
- D、胸骨左缘第二肋间可触及收缩期震颤

正确答案：C

28、下列哪个情况不属于医院感染 ()

- A、原有感染基础上出现其他部位新的感染
- B、无明显的潜伏期的感染患者，入院后 48 小时发生的感染
- C、新生儿产后获得的感染
- D、感染与本次住院密切相关

正确答案：D

29、上-下位除颤时标有胸骨的电极板置于胸骨的()

- A、上端
- B、下端
- C、右侧
- D、左侧

正确答案：A

30、高血压脑病的特征，哪项是错误的 ()

- A、可发生于嗜铬细胞瘤
- B、发作时先有血压突然升高
- C、以颅内压增高为主要表现
- D、大多数伴有急性水肿表现

E、可发生于急进性高血压

正确答案：D

31、关于心肺复苏成功的有效指征叙述错误的是（ ）

A、能摸到大动脉搏动

B、意识逐渐恢复

C、面色、口唇、甲床及皮肤色泽转红润

D、缩小的瞳孔散大

正确答案：D

32、男性，不慎从二楼坠落，致骨盆骨折及左股骨下段开放性骨折，创口大量出血，首先抢救（ ）

A、输液

B、骨折复位

C、止血

D、止痛

E、骨折临时固定

正确答案：C

33、对于开放性颅脑外伤的急救处理不包括：（ ）

A、保持呼吸道畅通

B、在现场拔出致伤物

C、补充血容量

D、消毒敷料包扎伤口

正确答案：B

34、全心衰属于哪一类型紫绀：（ ）

A、以上都不是

B、中心性紫绀

C、周围性紫绀

D、混合性紫绀

正确答案：D

35、一氧化碳中毒时最容易遭受损害的脏器是：（ ）

A、肾和肺

B、胰腺

C、肝和肾

D、脑和心脏

E、肺和脑

正确答案：D

36、关于院外急救的原则中，下列哪种说法不妥？（ ）

- A、先施救后排险、先重伤后轻伤
- B、先施救后运送
- C、紧密衔接、前后一致
- D、转送与监护急救相结合
- E、急救与呼救并重

正确答案：A

37、下列情况可以引起瞳孔缩小的是（ ）

- A、脑出血
- B、脑疝
- C、氰化物中毒
- D、脑桥出血
- E、阿托品中毒

正确答案：D

38、血管内皮细胞受损可激活凝血因子（ ）

- A、V
- B、XII
- C、VII
- D、IX
- E、VIII

正确答案：B

39、肺性脑病早期患者头痛、烦躁、失眠时可用的镇静剂为（ ）

- A、巴比妥类药物
- B、安定
- C、奋乃静或10%水合氯醛
- D、舒乐安定

正确答案：C

40、心脏复苏后出现严重心动过缓，最好的治疗方法是：（ ）

- A、阿托品
- B、人工呼吸，胸外心脏按压
- C、人工心脏起搏
- D、气管插管
- E、冰帽

正确答案：C

41、超高热是指体温超过（ ）

- A、40℃
- B、41℃
- C、38.5℃
- D、39℃
- E、42℃

正确答案：B

42、敌百虫中毒病人禁用下列哪种洗胃溶液（ ）

- A、1:15000~1:20000 高锰酸钾
- B、生理盐水
- C、温开水
- D、2%~4%碳酸氢钠
- E、1%盐水

正确答案：D

43、院前急救处理病人时最可靠的顺序是（ ）

- A、头到脚
- B、哪里出血先处理哪里
- C、个人习惯
- D、先搬运后止血
- E、躯干到四肢

正确答案：A

44、关于包扎的叙述，正确的是（ ）

- A、超出伤口边缘 20cm
- B、有脱出内脏可不必包扎
- C、越紧越好
- D、遇有污染的骨折端还纳后再包扎
- E、良好的包扎能达到止痛、止血的目的

正确答案：E

45、患者男性，34岁。右侧第4—7肋骨骨折并发气胸，呼吸极度困难，发绀，出冷汗。检查：血压65/40mmHg，气管向左侧移动，右侧胸廓饱满，叩诊呈鼓音，颈、胸部有广泛皮下气肿，首要的处理方法是（ ）

- A、气管插管辅助呼吸
- B、吸氧

- C、立即开胸探查
- D、胸膜腔穿刺排气减压
- E、输血、补液

正确答案：D

46、患者男性，68岁，摔倒后出现右髋部疼痛，不能站起行走。体检：右髋部压痛、肿胀、有髋关节活动障碍、右大粗隆上移、右下肢呈外旋位。患肢应采取的体位正确的是（）

- A、内收外旋位
- B、外展内旋位
- C、外展中立位
- D、内收内旋位
- E、外展外旋位

正确答案：C

47、病人，女，28岁。口服家中药箱里多种药物半小时后被家人发现并送往医院就诊，诊断为“急性中毒”。体内毒物主要的排泄器官为：（）

- A、肾脏
- B、唾液腺
- C、皮肤
- D、汗腺
- E、乳腺

正确答案：A

48、患者自主循环恢复后，为维持动脉压，最有效的常用药（）

- A、硝酸甘油
- B、多巴胺
- C、异丙肾上腺素
- D、阿托品
- E、多巴酚丁胺

正确答案：B

49、糖尿病酮症酸中毒救治中哪项不正确（）

- A、补液：视脱水和心功能情况决定补液速度和补液量
- B、可以在现场救治，不需要送到医院
- C、可以鼓励患者口服淡盐水
- D、立即建立静脉通道，尽早开始补液

正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805323132230011104>