

## 护理学模拟试题含答案

1、能通过胎盘的免疫球蛋白是( )。

- A、 IgM
- B、 IgA
- C、 IgG
- D、 IgD
- E、 IgE

答案： C

2、产后生殖系统炎症最常见的是哪种致病菌?( )

- A、 变形杆菌
- B、 链球菌
- C、 大肠杆菌
- D、 葡萄球菌
- E、 结核杆菌

答案： D

3、某医院就 5 年发展目标进行决策, 最适合的决策方法是( )。

- A、 高层领导集体决策
- B、 高层领导个人决策
- C、 中层领导集体决策
- D、 高层和中层领导集体决策
- E、 高、中、基层领导集体决策

答案： A

4、颅内压增高患者宜采取的体位是( )。

- A、 平卧位
- B、 俯卧位
- C、 侧卧位
- D、 床头抬高  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- E、 床尾抬高  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$

答案： D

5、正常情况, 受精的是哪个部位?( )

- A、 输卵管壶腹部
- B、 子宫峡部
- C、 输卵管伞端
- D、 输卵管间质部
- E、 子宫前壁

答案：A

6、患者,男,春游回家后出现胸闷、气促,诊断为支气管哮喘,其发病的原因最可能的是( )。

- A、 感染
- B、 剧烈运动
- C、 精神因素
- D、 气候变化
- E、 过敏原吸入

答案：E

7、抗菌药物是治疗感染的主要药物,所以( )。

A、 对一切感染症都应尽早使用高效广谱抗菌药物  
B、 在治疗感染性疾病时,考虑使用抗菌药物同时要考虑病原体对抗菌药物的敏感性

- C、 抗菌药物可用作消毒剂,对皮肤伤口消毒
- D、 有了各种抗菌药物,预防医院感染就不成问题了
- E、 发烧病人都是感染,均可用抗菌药物治愈

答案：B

8、引起小儿高热惊厥最常见的疾病是( )。

- A、 急性上呼吸道感染
- B、 消化道感染
- C、 中毒性菌痢
- D、 急性泌尿道感染
- E、 败血症

答案：A

9、前列腺切除术后出现膀胱痉挛时的护理措施是( )。

- A、 深呼吸放松腹肌
- B、 鼓励多饮水
- C、 加快膀胱冲洗速度
- D、 拔除尿管
- E、 改变体位

答案：A

10、肾小球滤过膜损伤或通透性增加时可发生( )。

- A、 多尿
- B、 少尿
- C、 血尿多

D、 蛋白尿

E、 无尿

答案： D

11、 下列哪项是尿道球部外伤时最常见的原因?( )

A、 刀伤

B、 尿道器械检查

C、 骨盆骨折

D、 骑跨伤

E、 手术损伤

答案： D

12、 健康传播的特点不包括( )。

A、 传递的是健康信息

B、 具有明确的目的性

C、 具有一定的营利性

D、 传播者属于专门的技术人才

E、 以健康为中心

答案： C

13、 小组讨论需要拟定的讨论提纲不包括( )。

A、 讨论目的

B、 讨论问题

C、 讨论形式

D、 讨论内容

E、 预期目标

答案： C

14、 腹水性质为漏出液的疾病是( )。

A、 自发性腹膜炎

B、 细菌性腹膜炎

C、 结核性腹膜炎

D、 肝硬化

E、 胰腺炎

答案： D

15、 管理者将完成任务所必需的组织资源交给下属, 许自行决定行动方案的授权方式属于( )。

A、 目标授权法

B、 充分授权法

- C、 制约授权法
- D、 弹性授权法
- E、 逐渐授权法

答案： B

16、 重症肺炎患儿发生腹胀大多因为( )。

- A、 低钠血症
- B、 中毒性肠麻痹
- C、 消化不良
- D、 低钾血症
- E、 酸中毒

答案： B

17、 妇女进入老年期后的生理特点不正确的是( )。

- A、 月经不规律, 逐渐绝经
- B、 骨代谢失常
- C、 子宫萎缩
- D、 脂肪沉积、 肥胖
- E、 卵巢功能消退

答案： A

18、 心理健康测量指标不包括下列哪项?( )

- A、 智力测量
- B、 日常生活活动能力评估
- C、 人格测量
- D、 精神心理测量
- E、 情绪评价

答案： B

19、 与高血压发病无关的是( )。

- A、 遗传因素
- B、 饮食习惯
- C、 心理因素
- D、 肥胖
- E、 运动量大

答案： E

20、 泌尿道感染是指( )。

- A、 尿路
- B、 尿路、 膀胱

- C、膀胱感染
- D、除尿路、膀胱外,还包括肾盂感染
- E、包括尿路、膀胱、肾盂、肾实质感染

答案: E

21、哪项是脑血管疾病最重要的危险因素?( )

- A、高脂血症
- B、吸烟
- C、肥胖
- D、高血压
- E、酗酒

答案: D

22、肝穿刺的部位一般在( )。

- A、右侧腋中线8~9肋间
- B、右锁骨中线8~9肋间
- C、右侧腋前线8~9肋间
- D、右锁骨中线9~10肋间
- E、右侧腋中线9~10肋间

答案: A

23、诊断膀胱肿瘤最可靠的方法是( )。

- A、B超检查
- B、CT检查
- C、MRI检查
- D、膀胱镜检查
- E、静脉逆行造影

答案: D

24、下列哪种良性肿瘤最常见于女性生殖器官中?( )

- A、卵巢纤维瘤
- B、子宫内膜异位
- C、畸胎瘤
- D、子宫肌瘤
- E、卵巢囊肿

答案: D

25、引发冠心病的最重要危险因素是( )。

- A、高血脂
- B、高龄

- C、 高血糖
- D、 高体重
- E、 大量饮酒

答案： A

26、原发性肝癌患者肝区疼痛的主要原因是( )。

- A、 肝纤维化
- B、 肝实质塌陷
- C、 肝包膜被牵拉
- D、 癌肿压迫胆道
- E、 门静脉癌栓阻塞

答案： C

27、人体的糖原储备在饥饿状态下供能的最长时间是( )。

- A、 4 小时
- B、 6 小时
- C、 8 小时
- D、 12 小时
- E、 24 小时

答案： D

28、孕妇骨盆对角径 $<11.5\text{cm}$ , 其余各径线均正常, 应属哪种类型骨盆?( )

- A、 漏斗骨盆
- B、 单纯扁平骨盆
- C、 均小骨盆
- D、 类人猿型骨盆
- E、 倾斜骨盆

答案： B

29、母体的哪种免疫球蛋白能通过胎盘转移给胎儿?( )

- A、 IgD
- B、 IgM
- C、 IgG
- D、 IgA
- E、 IgE

答案： C

30、下列哪项是确诊开放性气胸最有意义的体征?( )

- A、 听诊呼吸音消失
- B、 伤侧胸部饱满

- C、 伤侧叩诊鼓音
- D、 气管移向健侧
- E、 呼吸时可听到空气出入胸膜腔声

答案： E

31、 保持产妇乳腺不断泌乳的关键是( )。

- A、 产妇的营养
- B、 产妇的情绪状况
- C、 产妇的睡眠情况
- D、 婴儿的频繁吸吮
- E、 产妇的健康状况

答案： D

32、 患者女, 28 岁。妊娠期糖尿病, 宫内妊娠 40 周分娩。婴儿出生后容易发生( )。

- A、 低血糖
- B、 低血压
- C、 体温低于正常
- D、 高血糖
- E、 体温高于正常

答案： A

33、 有关术后肛门坐浴的叙述, 错误的是( )。

- A、 盆具需消毒
- B、 0.02%高锰酸钾溶液浸泡
- C、 水温 43℃~46℃
- D、 时间 1h
- E、 2~3 次/d, 便后应追加一次

答案： D

34、 宫颈黏液最丰富, 伸展性最大, 羊齿状结晶最高出现, 在正常月经周期中的哪一期?( )

- A、 增生早期
- B、 增生中期
- C、 排卵期
- D、 分泌中期
- E、 分泌早期

答案： C

35、 绒毛膜癌的病理特点包括( )。

- A、 大量出血坏死组织,大量滋养细胞增生,无绒毛结构,无间质,无血管
- B、 绒毛结构退化,仅见绒毛阴影
- C、 间质血管血栓形成,细胞间变
- D、 绒毛水肿,滋养细胞高度增生
- E、 大量出血,滋养细胞高度增生并侵入子宫肌层,仅见少量绒毛结构

答案: A

36、诊断腹腔内实质性脏器破裂的主要依据是( )。

- A、 腹肌紧张
- B、 膈下游离气体
- C、 腹式呼吸消失
- D、 腹腔穿刺抽出浑浊液体
- E、 腹腔穿刺抽出不凝血

答案: E

37、下列哪项不是妊娠常见症状?( )

- A、 便秘
- B、 外阴静脉曲张
- C、 腰背痛
- D、 关节痛
- E、 小腿痉挛

答案: D

38、正常5岁小儿血压应为( )。

- A、 60/40mmHg
- B、 80/54mmHg
- C、 90/60mmHg
- D、 100/66mmHg
- E、 110/75mmHg

答案: C

39、患者男,50岁。肺癌,右肺叶切除术后第3日,为防止患者出现“冻肩”,应教其做的康复运动是( )。

- A、 翻身
- B、 抬头、低头
- C、 将右手举过头顶
- D、 弯曲、伸展右臂肘部
- E、 右手交替握紧、张开

答案: C



40、初产妇第三产程的时间一般不超过( )。

- A、 30 分钟
- B、 50 分钟
- C、 1 小时
- D、 1.5 小时
- E、 2 小时

答案：A

41、对于无明显潜伏期的疾病,判断医院感染的原则是( )。

- A、 入院 8 小时后发生的感染
- B、 入院 18 小时后发生的感染
- C、 入院 24 小时后发生的感染
- D、 入院 48 小时后发生的感染
- E、 入院 72 小时后发生的感染

答案：D

42、先天性心脏病诊断方法中下列哪项进展最重要?( )

- A、 选择性心血管造影
- B、 体格检查
- C、 彩色多普勒超声心动图
- D、 心电图
- E、 心功能检查

答案：C

43、护士长准备以小组讨论的形式在病区进行一次护理问题征集,小组讨论时最好采取的座位形式是( )。

- A、 扇形
- B、 矩形
- C、 三角形
- D、 马蹄形
- E、 阶梯型

答案：D

44、既有复位又有固定作用的治疗与护理措施是( )。

- A、 牵引
- B、 石膏固定
- C、 小夹板固定
- D、 功能锻炼
- E、 骨折内固定

答案：A

45、患者男,69岁。有动脉粥样硬化病史20年,近期多次出现突发的右侧肢体无力+麻木,数分钟后可自行缓解,发作时意识清楚。考虑该患者发生了( )。

- A、 颅内肿瘤
- B、 可逆性缺血性神经功能障碍
- C、 短暂性脑缺血发作
- D、 完全性脑卒中
- E、 脑出血

答案：C

46、首先提出目标管理的是( )。

- A、 孔茨
- B、 德鲁克
- C、 巴纳德
- D、 西蒙
- E、 马斯洛

答案：B

47、正常足月妊娠的羊水量大约( )。

- A、 100~200ml
- B、 <500mL
- C、 600~800mL
- D、 1000~1500mL
- E、 2600~3000mL

答案：D

48、驾车和乘车时使用安全带、发生事故后的自救和他救属于( )。

- A、 日常健康行为
- B、 预警行为
- C、 保健行为
- D、 戒除不良嗜好行为
- E、 避开有害环境行为

答案：B

49、骨肿瘤的好发部位在( )。

- A、 扁骨
- B、 脊椎骨
- C、 长管状骨骨干
- D、 长管状骨干骺端

E、短管状骨干骺端

答案：D

50、对急腹症病人的护理不正确的是( )。

A、病情稳定者取半卧位

B、禁食、胃肠减压

C、遵医嘱给予抗生素

D、禁用吗啡类止痛剂

E、做好备皮、灌肠等术前准备

答案：E

51、肾损伤非手术治疗卧床的时间至少为( )。

A、8天

B、10天

C、12天

D、14天

E、血尿转清后即可下床

答案：D

52、女性,24岁,已婚,月经周期正常,近3个月经期延长,持续10天左右,无腹痛。妇科检查无异常发现,拟行诊断性刮宫术,手术日期应选择为( )。

A、月经前2~3天

B、月经来潮12小时内

C、月经来潮第3天

D、月经来潮第5天

E、随时可进行

答案：D

53、下列哪项是闭合性多根肋骨多处骨折发生胸壁软化后的急救方法?( )

A、应用胸腔闭式引流

B、止痛

C、药物镇痛

D、吸氧

E、加压包扎固定胸廓

答案：E

54、护士在工作中感到,要不断学习才能适应和胜任护理工作,自我要求继续学习成长,在不影响临床工作的前提下宜选择的学习方式是( )。

A、脱产学习

B、半脱产学习

- C、 进修学习
- D、 自学或在临床实践中培训
- E、 加强考核训练

答案： D

55、 急性胰腺炎病人疼痛剧烈时不宜使用的止痛剂是( )。

- A、 阿托品
- B、 山莨菪碱
- C、 东莨菪碱
- D、 吗啡
- E、 哌替啶

答案： D

56、 出生时存在, 终生不消失的神经反射是( )。

- A、 腹壁反射
- B、 角膜反射
- C、 拥抱反射
- D、 膝腱反射
- E、 觅食反射

答案： B

57、 新生儿重度窒息, Apgar 评分标准为( )。

- A、 0~3 分
- B、 0~5 分
- C、 0~6 分
- D、 0~2 分
- E、 0~4 分

答案： A

58、 腰椎间盘突出症最重要的体征是( )。

- A、 腰椎侧突畸形
- B、 腰部活动受限
- C、 压痛、叩击痛
- D、 直腿抬高试验和加强试验阳性
- E、 感觉减退、肌力下降、腱反射减弱

答案： D

59、 指出下列正常分娩机制哪项是正确的?( )

- A、 衔接, 无论初产妇或经产妇儿头均系于临产后衔接
- B、 俯屈, 大囟门下降位置最低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815202102241011104>