

2024

执业药师

药学专业知识（二）
易错易考200题

网校教研团队 © 编

2024 年执业药师《药专业知识（二）》易错易考 200 题

第一章 精神与中枢神经系统疾病用药

一、单选题

1. 关于镇静催眠药作用特点的说法，错误的是（ ）。
 - A. 氟西洋起效快、作用时间长、醒后无不适感
 - B. 地西洋属于长效苯二氮革类药物，临床不常用于治疗失眠
 - C. 硫喷妥钠属于超短效巴比妥类药物，临床主要用于静脉麻醉
 - D. 佐匹克隆口服吸收缓慢，血浆蛋白结合率低，生物利用度约为 45%
 - E. 雷美替胺没有催眠副作用、戒断反应和反跳性失眠
2. 治疗三叉神经痛并可出现“Stevens-Johnson 综合征”的是（ ）。
 - A. 地西洋
 - B. 哌替啶
 - C. 苯妥英钠
 - D. 卡马西平
 - E. 阿司匹林
3. 对接受抗癫痫药治疗的妇女，为降低胎儿神经管缺陷的风险，建议在妊娠前和妊娠期补充（ ）。
 - A. 叶酸，一日 0.4mg
 - B. 叶酸，一日 5mg
 - C. 维生素 K，一日 5mg
 - D. 维生素 K，一日 10mg
 - E. 维生素 K，一日 15mg
4. 疗效与三环类相当，不良反应较少，属于四环类抗抑郁药的是（ ）。
 - A. 阿米替林
 - B. 马普替林
 - C. 丙米嗪
 - D. 氯米帕明
 - E. 多塞平
5. 关于抗抑郁药的使用注意事项，说法错误的是（ ）。
 - A. 抗抑郁药的使用因人而异，需全面考虑患者的症状特点、年龄、药物的耐受性、有无合并症等因素
 - B. 抗抑郁药起效缓慢，一般 4~6 周方显效，切忌频繁换药
 - C. 在足量、足疗程治疗仍无效时，方可考虑更换另一种作用机制不同的抗抑郁药
 - D. 氟西汀需停用 2 周才能换用单胺氧化酶抑制剂
 - E. 抗抑郁药需从小剂量开始并逐渐增加剂量，且尽可能采用最小有效剂量维持
6. 多奈哌齐的作用机制是（ ）。
 - A. 抑制中枢单胺氧化酶，使脑内 DA 降解减少

- B. 抑制中枢胆碱酯酶，使脑内 ACh 增加
- C. 激动中枢 M 胆碱受体，使中枢胆碱能神经功能加强
- D. 抑制中枢 GABA 氨基转移酶，使脑内 GABA 分解减少
- E. 抑制外周单胺氧化酶，使肾上腺素分解减少

7. 关于镇痛药的使用原则，说法错误的是（ ）。

- A. 口服给药，尤其是强阿片类
- B. 按时给药
- C. 按阶梯给药
- D. 剂量应个体化
- E. 按需给药

8. 本身并无药理活性，可通过血-脑屏障，在脑内经多巴脱羧酶脱羧形成多巴胺后发挥药理作用的抗帕金森病药是（ ）。

- A. 司来吉兰
- B. 苯海索
- C. 恩他卡朋
- D. 左旋多巴
- E. 卡巴拉汀

9. 用药后容易出现锥体外系反应，且多见口干、视物模糊、便秘、尿潴留等症状的抗精神病药是（ ）。

- A. 硫利达嗪
- B. 利培酮
- C. 阿立哌唑
- D. 奥氮平
- E. 丙米嗪

二、配伍题

【1-2】

- A. 扎来普隆
- B. 唑吡坦
- C. 苯巴比妥
- D. 地西洋
- E. 卡马西平

1. 对入睡困难者，首选的药物是（ ）。
2. 对原发性失眠者，首选的药物是（ ）。

【3-5】

- A. 苯巴比妥
- B. 丙戊酸钠
- C. 氯硝西洋
- D. 加巴喷丁
- E. 奥卡西平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/818023142070006025>