

[真题] (妇产科学) 女性生殖器肿瘤

A1/A2 型题 每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。
请从中选择一个最佳答案。

第 1 题:

诊断子宫内膜癌最可靠的方法是

- A. 子宫镜检查
- B. 细胞学检查
- C. B 超检查
- D. 淋巴造影
- E. 分段诊刮

参考答案: E

答案解析:

第 2 题:

易发生蒂扭转的卵巢囊肿是

- A. 巧克力囊肿
- B. 粘液性囊腺瘤
- C. 皮样囊肿
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 滤泡囊肿

参考答案: C

答案解析:

第 3 题:

在妊娠期间子宫肌瘤容易发生的变性是

- A. 玻璃样变
- B. 钙化
- C. 红色变
- D. 囊蛙变
- E. 肉瘤变

参考答案: C

答案解析:

第 4 题:

慢性宫颈炎与子宫颈癌早期肉眼难以鉴别。确诊方法应是

- A. 阴道镜检查
- B. 宫颈碘试验
- C. 宫颈及宫颈管活检
- D. 宫颈刮片细胞学检查
- E. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法

参考答案：C

答案解析：

第5题：

近年女性生殖系统恶性肿瘤中死亡率最高的是

- A. 卵巢癌
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 外阴癌
- E. 恶性滋养细胞肿瘤

参考答案：A

答案解析：

第6题：

宫颈活检的病理报告为“鳞状上皮化生”临床上应认为是

- A. 良性病变
- B. 低度恶性病变
- C. 癌前病变
- D. 无病变
- E. 高度恶性病变

参考答案：A

答案解析：

第7题：

女性生殖系统恶性肿瘤中死亡率最高的是

- A. 卵巢癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 子宫颈癌
- D. 恶性滋养细胞肿瘤
- E. 外阴癌

参考答案：A

答案解析：

第 8 题:

卵巢上皮癌患者血清 CA125 检测值最具有特异性意义的是

- A. 透明细胞癌
- B. 浆液性腺癌
- C. 粘液性癌
- D. 未分化癌
- E. 内膜样癌

参考答案: B

答案解析:

第 9 题:

对放射治疗最敏感的卵巢恶性肿瘤是

- A. 颗粒细胞瘤
- B. 浆液性囊腺癌
- C. 未成熟型畸胎瘤
- D. 卵泡膜细胞瘤
- E. 无性细胞瘤

参考答案: E

答案解析:

第 10 题:

属于卵巢性索间质细胞肿瘤的是

- A. 颗粒细胞瘤
- B. 胚胎癌
- C. 绒毛膜癌
- D. 卵巢甲状腺肿
- E. 畸胎瘤

参考答案: A

答案解析:

第 11 题:

子宫肌瘤发生红色样变常见于

- A. 生育期
- B. 绝经前期
- C. 月经中期
- D. 妊娠期

E. 红斑狼疮治疗期

参考答案：D

答案解析：

第 12 题：

女性，58 岁，绝经 10 年，阴道流血伴流液 2 个月就诊，行分段诊刮，诊断为子宫内膜癌 I 期，首选治疗方案为

- A. 子宫全切术
- B. 扩大子宫全切术及双附件切除术
- C. 盆腔外照射治疗
- D. 腔内放射治疗
- E. 子宫广泛切除术及盆腔淋巴结清扫术

参考答案：B

答案解析：

子宫内膜癌首选的治疗方法为手术治疗，I 期患者子宫次根治手术及双侧附件切除术。II 期应行子宫广泛切除术及双侧盆腔淋巴结清扫术。

第 13 题：

女性，45 岁，血性白带 2 个月，妇检阴道未受肿瘤侵犯，宫颈菜花样，宫体正常大小。宫旁明显增厚，未达盆腔，宫颈活检为鳞癌，其分期是

- A. IIC 期
- B. IB 期
- C. IIIA 期
- D. IIA 期
- E. IIB 期

参考答案：E

答案解析：

第 14 题：

浸润性子宫颈癌指肿瘤浸润深度至少要超过基底膜下

- A. 4mm
- B. 3mm
- C. 5mm
- D. 1mm
- E. 2mm

参考答案：B

答案解析：

第 15 题:

宫颈癌临床分期 II a 是指

- A. 肉眼可见癌灶虽位于宫颈, 但体积 $>4\text{cm}^3$
- B. 癌累及阴道下 1/3 段, 无明显宫旁浸润
- C. 癌累及宫旁, 无明显阴道浸润
- D. 癌累及阴道。未达阴道下 1/3 段, 无明显宫旁浸润
- E. 癌累及宫旁. 间质浸润深度 3~5mm

参考答案: D

答案解析:

第 16 题:

腹痛 1 天诊断为卵巢瘤蒂扭转, 错误的处理是

- A. 一经确诊即应手术
- B. 抢救休克同时尽快手术
- C. 术时应在蒂根部下方钳夹
- D. 行肿瘤剝出术避免术中将肿瘤弄破。取下肿瘤应切开检查并送病理
- E. 切除肿瘤前不能松解肿瘤蒂后钳夹

参考答案: D

答案解析:

第 17 题:

月经量多或经期延长但周期基本正常, 应首先考虑

- A. 子宫内膜癌
- B. 无排卵性功能失调性子宫出血
- C. 子宫颈癌
- D. 宫颈息肉
- E. 子宫肌瘤

参考答案: E

答案解析:

第 18 题:

卵巢浆液性乳头状囊腺瘤, 伴非典型增生是

- A. 交界性肿瘤
- B. 原位癌
- C. 癌前病变
- D. 非肿瘤性病变
- E. 癌肉瘤

参考答案：A

答案解析：

第 19 题：

卵巢浆液性肿瘤来源于

- A. 卵巢的生发上皮，发生逆转现象
- B. 卵巢的生发上皮，恶变
- C. 卵巢的生发上皮，向子宫内膜分化
- D. 卵巢的生发上皮，向宫颈粘膜分化
- E. 卵巢的生发上皮，向输卵管上皮分化

参考答案：E

答案解析：

第 20 题：

最常见于幼女和少女的卵巢肿瘤是

- A. 颗粒细胞瘤
- B. 内胚窦瘤
- C. 粘液性囊腺瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 纤维瘤

参考答案：B

答案解析：

第 21 题：

属于良性卵巢肿瘤的是

- A. 卵泡膜细胞瘤
- B. 内胚窦瘤
- C. 无性细胞瘤
- D. 库肯勃瘤
- E. 颗粒细胞瘤

参考答案：A

答案解析：

第 22 题：

子宫内膜癌最多见的病理类型是

- A. 鳞腺癌

- B. 透明细胞癌
- C. 腺角化癌
- D. 鳞癌
- E. 腺癌

参考答案： E

答案解析：

第 23 题：

最常见的子宫肌瘤类型是

- A. 肌壁间肌瘤
- B. 粘膜下肌瘤
- C. 浆膜下肌瘤
- D. 宫颈肌瘤
- E. 阔韧带肌瘤

参考答案： A

答案解析：

第 24 题：

产褥妇，现产后 3 天，出现急性腹痛伴发热 2 天，腹部包块增大。曾诊断患“子宫肌瘤”。本例应考虑的诊断是

- A. 子宫肌瘤红色变
- B. 子宫肌瘤恶性变
- C. 子宫肌瘤玻璃样变
- D. 子宫肌瘤囊性变
- E. 产褥感染

参考答案： A

答案解析：

易，子宫肌瘤红色变多发生于妊娠期或产后。

第 25 题：

女性，65 岁，绝经 6 年，少量阴道流血 2 周。妇科检查：宫颈正常，子宫如妊娠 6 周大，稍软，双附件正常。本例确诊方法是

- A. 分段诊刮
- B. 血清肿瘤标志物检查
- C. 宫颈刮片
- D. B 超
- E. 腹腔镜

参考答案： A

答案解析：

子宫内膜癌确诊靠子宫内膜分段诊刮。

第 26 题：

子宫颈原位癌累及腺体是指

- A. 子宫颈原位癌突破基底膜侵及腺体
- B. 子宫颈表面和腺体先后发生了原位癌，并侵及腺体周围间质
- C. 子宫颈表面发生的原位癌影响腺体分泌排出
- D. 子宫颈原位癌沿基底膜伸入腺体内致腺臂上皮为癌细胞所取代，腺体基底膜完整
- E. 子宫颈腺体充满癌细胞

参考答案： D

答案解析：

第 27 题：

子宫肌瘤患者与临床症状轻重关系密切的是

- A. 肌瘤有无变性
- B. 肌瘤数目
- C. 肌瘤大小
- D. 肌瘤生长部位
- E. 肌瘤与肌壁关系

参考答案： D

答案解析：

第 28 题：

25 岁，未婚，妇科检查发现右侧附件区 4cm 囊性包块，活动好。血清 CA125 20U/ml，B 型超声为单房囊性肿物，此例最可能的诊断是

- A. 卵巢粘液性囊腺瘤
- B. 卵巢滤泡囊肿
- C. 卵巢巧克力囊肿
- D. 卵巢上皮样囊肿
- E. 输卵管卵巢囊肿

参考答案： E

答案解析：

第 29 题：

能引起子宫内膜增生过长的卵巢肿瘤是

- A. 内胚窦瘤

- B. 卵泡膜细胞瘤
- C. 浆液性囊腺瘤
- D. 内膜样肿瘤
- E. 成熟囊性畸胎瘤

参考答案： B

答案解析：

第 30 题：

晚期卵巢癌的首选治疗方法是

- A. 激素治疗
- B. 化学治疗
- C. 肿瘤细胞减灭术+化学治疗
- D. 肿瘤切除术
- E. 放射治疗

参考答案： C

答案解析：

第 31 题：

最常见的子宫肌瘤变性是

- A. 玻璃样变
- B. 囊性变
- C. 钙化
- D. 肉瘤变
- E. 红色变

参考答案： A

答案解析：

第 32 题：

子宫内膜癌的首选治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 手术、放射联合治疗
- C. 化学治疗
- D. 放射治疗
- E. 激素治疗

参考答案： A

答案解析：

第 33 题：

女性，30 岁，1 年前查体发现右侧卵巢囊肿直径 5cm，今晨起突发右下腹痛伴恶心、呕吐。妇检：扪及右下腹肿物增大，有压痛，蒂部最明显，首先的处理是

- A. 急查盆腔磁共振成像
- B. 急查血清 CA125 甲胎蛋白
- C. 密切观察
- D. 剖腹探查或腹腔镜检
- E. 抗生素治疗

参考答案：D

答案解析：

蒂扭转是卵巢肿瘤的最常见并发症。

第 34 题：

女性，64 岁，绝经 14 年，阴道少量出血 3 次。查体：腹膨隆，如足月妊娠，腹水征(-)，B 超示：巨大肿物 40cm×50cm×30cm 大，囊性，多房性。体重、食欲、二便均无变化。本例最可能为卵巢的

- A. 皮样囊肿
- B. 透明细胞癌
- C. 浆液性囊腺瘤
- D. 粘液性囊腺瘤
- E. 卵泡膜细胞瘤

参考答案：D

答案解析：

第 35 题：

宫颈鳞状上皮化提示为

- A. 宫颈未分化储备细胞增生
- B. 人乳头状瘤病毒感染
- C. 宫颈原位癌
- D. 宫颈糜烂愈合过程
- E. 宫颈上皮内瘤样病变

参考答案：D

答案解析：

第 36 题：

宫颈癌的临床表现不包括

- A. 绝经后阴道出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828020124127006035>