

2024

执业药师

药学综合知识与技能
易错易考200题

网校教研团队 © 编

2024 年执业药师《药学综合知识与技能》易错易考 200 题

第一章 执业药师与药学服务

一、单选题

1. 与二、三级信息源相比一级信息源的特点是（ ）。
A. 内容更新
B. 对于查询的药物信息可以提供丰富的内容供读者参考
C. 内容广泛，使用方便
D. 对一个具体的问题提供的信息全面详实（简明扼要）
E. 阅读大量的一级文献要花费的时间较短
2. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 5%两种浓度葡萄糖注射液混合配制，分别需要（ ）。
A. 56ml 和 444ml
B. 72ml 和 428ml
C. 85ml 和 415ml
D. 94ml 和 406ml
E. 106ml 和 394ml
3. 长期大剂量应用头孢哌酮治疗慢性感染，需要监测的临床指标是（ ）。
A. 血压
B. 血糖
C. 血脂
D. 凝血功能
E. 肌肉功能
4. 不能使用氯化钠注射液溶解的药物是（ ）。
A. 青霉素
B. 头孢氨苄
C. 奥沙利铂
D. 氨苄西林
E. 头孢曲松
5. 细菌性脑膜炎患者应用万古霉素治疗，快速大剂量静脉滴注后可能会产生的相关不良后果是（ ）。
A. “胰岛素样自体免疫综合征”
B. “灰婴综合征”
C. “药源性流感样综合征”
D. “手足综合征”
E. “红人综合征”
6. 有关药学服务的叙述，正确的是（ ）。
A. 药学服务的社会属性仅限服务于治疗性药物

- B. 药学服务只涉及更高层次的临床实践，不包括处方调剂、药品检验、药品供应
 C. 用药周期长的慢性病患者属于药学服务的重要人群
 D. 药学服务涵盖了患者用药相关的全部需求，但不包括对公众的健康教育
 E. 药学服务对象仅限于患者和广大公众，不包括对医师和护士在用药过程中咨询问题的指导

二、配伍题

【1-3】

- A. 抗菌药物的合理使用
 B. 减肥、补钙、补充营养素
 C. 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大
 D. 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
 E. 处方中用法用量非药品说明书中指示的用法、用量、适应证
1. 患者用药咨询的内容是（ ）。
 2. 公众用药咨询的内容是（ ）。
 3. 医师用药咨询的内容是（ ）。

答案与解析

一、单选题

1. 【答案】A

【解析】一级信息源的特点优点：

- ①一级信息源提供的信息比二级和三级信息源的内容更新；
- ②使用一级信息源可以看到有关研究的具体细节，如实验设计方法，观察对象的一般资料和对数据的统计分析，以及对研究结果可靠性的分析；
- ③读者可以自己文献进行评价，免受他人观点的影响。

缺点：

- ①如果是单一临床试验得到的信息，其结果或结论有可能是错误的，可能会误导读者；
- ②要求读者具有对药学或医学文献进行评价的能力；
- ③阅读大量的一级文献要花费许多的时间。

2. 【答案】A

【解析】本题考查药学计算。根据溶液稀释计算公式“ $C_{浓} \times V_{浓} = C_{稀} \times V_{稀}$ ”，设 50% 葡萄糖注射液取 x 毫升，故 $50\%x + 5\% (500 - x) = 500 \times 10\%$ ，计算得 $x = 56\text{ml}$ ；则 5% 葡萄糖注射液应取 444ml 。

3. 【答案】D

【解析】本题考查药学咨询。长时间、大剂量应用头孢菌素类（头孢哌酮等）、碳青霉烯类（美罗培南、厄他培南、亚胺培南）、氧头孢烯类（拉氧头孢、氟氧头孢）、头霉素类（头孢米诺）等抗生素均可引起牙龈出血、手术创面渗血等出血倾向反应。由于上述抗生素在分子中有一甲硫四氮唑结构，与维生素 K 竞争性结合谷氨酸- γ 羟化酶，可抑制肠道正常菌群，减少维生素 K 合成，导致维生素 K 依赖性凝血因子合成障碍而致出血。因此，应用头孢菌素类等抗生素时，须注意长期使用宜适当补充维生素 K、维生素 B；与抗凝药合用可能增加出血风险，合用时应监测凝血功能和出血倾向。

4. 【答案】C

【解析】本题考查药学咨询。多烯磷脂酰胆碱注射液、奥沙利铂、两性霉素 B、红霉素、呋库溴铵、氟罗沙星不宜使用氯化钠溶解作为输液，可产生沉淀或药物降解。奥沙利铂与氯化钠生成二氯二氨铂，使疗效降低。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/836032004132010033>