

产科出血急救、诊疗与护理考核

一、单选题

1、阴道分娩出血量大于（ ）属于产后出血[单选题]*

A、100ml

B、300ml

C、500ml✓

D、1000ml

2、休克指数法适应症不包括（ ）[单选题]*

A、未做失血量的收集

B、外院转诊产妇

C、隐匿性产后出血

D、子痫前期患者✓

3、休克指数计算公式为（ ）[单选题]*

A、脉率/舒张压

B、脉率/收缩压✓

C、收缩压/脉率

D、舒张压/脉率

4、引起产后出血常见原因是（ ）[单选题]*

A、产道裂伤

B、胎盘剥离不全

C、宫缩乏力✓

D、胎盘植入

5、血红蛋白每下降 10g，出血量约（ ）[单选题]*

A、100-200ml

B、200-300ml

C、300-400ml

D、400-500ml✓

6、子宫破口小且整齐，感染轻微可考虑（ ）[单选题]*

A、子宫全切除术

B、子宫裂口修补术✓

C、子宫次全切除术

D、子宫根治术

7、25岁，停经6个月，阴道少量咖啡色出血10天，今晨突然腹痛剧烈伴肛坠、恶心，血压60/40mmHg，

下腹部有明显压痛及反跳痛，并有移动性浊音，宫颈举痛（+），后穹窿穿刺抽出5ml暗红色不凝血，应选

择下列哪项处理最适宜（ ）[单选题]*

A、先输血纠正休克后开腹手术

B、即刻剖腹探查

C、边纠正休克边手术✓

D、活血化瘀治疗

E、注射止血药，情况不好再转手术

8、前置胎盘在妊娠晚期或临产时发生无诱因的无痛性阴道流血（ ）[单选题]*

A、正确✓

B、错误

9、初产妇，妊娠 40 周，持续剧烈腹痛 5 小时入院。贫血貌，血压 130/80mmHg，脉搏 120 次/分，子宫硬，不松弛，有局限性压痛，胎位不清，胎心未闻及，阴道少量流血，肛查宫口未开。本例可以排除的诊断是（ ）[单选题]*

A、妊娠 40 周，胎死宫内

B、低张性子宫收缩乏力

C、继发性贫血

D、重度子痫前期✓

E、胎盘早剥

10、处理产后出血的关键在于（ ）[单选题]*

A、输液、输血

B、抗休克与止血同时进行✓

C、切除子宫

D、注射大量宫缩剂

11、宫腔填塞纱条多久取出（ ）[单选题]*

A、36 小时

B、24 小时✓

C、12 小时

D、16 小时

E、8 小时

12、阴道分娩后宫腔填塞宜选用（ ）[单选题]*

A、水囊压迫✓

B、纱布条压迫

C、气囊压迫

D、止血材料

E、以上都对

13、为预防产后出血，下列哪项处理措施不恰当（ ）[单选题]*

A、对具有产后出血高危因素者提前做好准备工作

B、密切观察第一产程，避免产妇过度疲劳

C、重视第二产程处理，指导产妇适时正确应用腹压

D、准确收集出血量，检查胎盘、胎膜是否完整

E、胎盘娩出后留产妇于产房观察半小时✓

14、发生内出血时需要的辅助检查包括（ ）[单选题]*

A、血常规

B、血凝试验：纤维蛋白原可以早期预测严重的出血

C、血气分析

D、床旁彩超

E、以上都对✓

15、产后出血的处理中，四“早”原则包括（ ）[单选题]*

A、尽早呼救

B、尽早止血

C、尽早评估

D、尽早液体复苏

E、以上都是✓

16、助产士在产后出血的抢救中以下哪一项操作是正确的（ ）[单选题]*

- A、去掉产妇外周静脉的肝素帽，彻底消毒后输液器相连，开放静脉通路✓
- B、上级医生下医嘱后再遵医嘱开放静脉通路、吸氧，连接心电监护等
- C、凭经验估算出血量
- D、抢救时争分夺秒，暂时不需要和产妇沟通

17、休克指数大于 1、5，失血量占血容量的比例大约是多少？（ ）[单选题]*

- A、5%-10%
- B、10%-20%
- C、20%-30%
- D、大于 50%
- E、30%-50%✓

18、宫缩乏力，应用缩宫素加强宫缩，下列描述正确的是（ ）[单选题]*

- A、专人守护，严密观察宫缩及胎心音✓
- B、用药后宫缩愈强效果愈好
- C、可用于不协调宫缩
- D、可用于头盆不称
- E、如出现胎儿窘迫，只要调整缩宫素的量即可

19、关于氨甲环酸注射液临床应用过程中不良反应阐述正确的是（ ）[单选题]*

- A、恶心、呕吐是氨甲环酸药物主要的不良反应，这种不良反应是一过性的，由于代谢较快，没有遗留的危害存在，不会对患者的胃肠道造成损伤
- B、建议滴注速度控制 0、5 克：50-70 滴/分，1 克：25-30 滴/分，即可大幅降低此类不良反应的发生率

C、用维生素 B6 止吐可以直接肌注，或者输液时加入小壶中，可以降低不良反应给患者带来的不适✓

D、一旦出现任何不良反应，应立即停药

20、卡贝缩宫素作用特点不正确的是（ ）[单选题]*

A、静脉给药后 2 分钟起效

B、给药方便

C、初步止血后预防后续再出血

D、预防和治疗产后出血的一线药物，相对安全，无明显禁忌症✓

21、产后子宫出血安列克（卡前列素氨丁三醇）注射总剂量不得超过（ ）[单选题]*

A、250pg

B、500ug

C、1mg

D、2mg（8 次剂量）✓

22、妊娠期高血压病人慎用药物（ ）[单选题]*

A、欣母配

B、麦角新碱✓

C、缩宫素

D、氨甲环酸

23、心脏病合并妊娠发生产后出血时，应避免使用（ ）[单选题]*

A、米索前列醇

B、缩宫素注射液 10u 单位肌肉注射

C、缩宫素注射液 20u 静脉滴注

D、麦角新碱肌内注射✓

E、卡前列素氨丁三醇注射液宫体注射

24、麦角新碱的作用有 () [单选题]*

- A、子宫体产生节律性收缩，子宫颈松弛
- B、对子宫体和子宫颈的兴奋作用无明显差别 ✓
- C、对早期或中期妊娠子宫均有强大收缩作用
- D、有中枢性抑制作用和降压作用。
- E、收缩血管，减少动脉搏动幅度

25、麦角新碱治疗产后出血的主要机制是 () [单选题]*

- A、舒张血管
- B、引起子宫平滑肌强直性收缩 ✓
- C、抑制凝血过程
- D、促进纤溶系统
- E、升高血压

26、子宫收缩乏力性产后出血可以采用的治疗措施错误的是 () [单选题]*

- A、注射缩宫素
- B、宫腔填塞纱布
- C、结扎盆腔血管止血
- D、按摩子宫
- E、双手刺激耻骨联合上方。 ✓

27、氨甲环酸注射液说明书的一般推荐用法用量 () [单选题]*

- A、一次 0.25g-0.5g，一日 0.75g-2g ✓
- B、一次 0.25g-0.5g，一日 2g-4g

28、产后出血处理原则 () [单选题]*

- A、迅速止血✓
- B、补充血容量
- C、切除子宫
- D、预防感染

29、出现产后出血应行子宫切除的是 () [单选题]*

- A、穿透性胎盘植入✓
- B、胎盘嵌顿
- C、凝血功能障碍
- D、宫缩乏力
- E、胎盘粘连

30、一产妇，阴道分娩后 12 小时测心率 120 次/分，血压 60/40mmHg，您估计该产妇产后出血量约为 () [单选题]*

- A、500-1000 毫升
- B、1000-1500 毫升
- C、1500-2000 毫升
- D、2500-3000 毫升✓
- E、3500-4000 毫升

31、产后出血是指胎儿娩出后 ()，阴道分娩者出血量 \geq 500ml，剖宫产分娩者出血量 \geq 1000ml。 [单选题]*

- A、2h
- B、12h

C、24h✓

32、产后出血二级预警是指出血达到：() [单选题]*

A、500ml

B、500-1500ml✓

C、≥1500ml

33、Hb 每下降 10g/L，出血量约为() [单选题]*

A、400-500ml✓

B、300-400ml

C、500-600ml

34、红细胞压积 (HCT) 产前与实测量大于 6，出血量 () [单选题]*

A、>600ml

B、>500ml✓

C、>800mL

35、休克指数 () 作为临床风险的界值[单选题]*

A、>1✓

B、>1.5

C、>2.0

36、2012 年我国将大量输血定义为：() [单选题]*

A、24h 内输注红细胞混悬液≥18U✓

B、24h 内输注红细胞≥10U

C、24h 内输注红细胞≥0、4U/Kg

37、产后生血补液时，不宜过大，不宜过快，维持平均动脉压为 () [单选题]*

A、70mmHg

B、65mmHg✓

C、60mmHg

38、下列哪项不是 PPH 导致凝血功能障碍的危险因素：() [单选题]*

A、低体温

B、酸中毒

C、低血钙

D、应用氨甲环酸✓

39、抢救产后出血时，应根据出血严重程度每 () 做系列止

能功能检测，包括 PLT、PT、APTT 和纤维蛋白原，以指导和保证止血血液成分的适宜使用[单选题]*

A、30-60min✓

B、60-90min

C、15-30min

40、下列哪项不是输注红细胞的指证：() [单选题]*

A、Hb < 70g/L

B、Hb70-100g/L，在持续出血

C、Hb>100g/L✓

D、失血量达到血容量 30%-40%

41、我国 1U 红细胞悬液是由 200ml 全血制备，理论上 2U 红细胞可提升 Hb 水平 () [单选题]*

A、10g/L✓

B、5 g/L

C、15g/L

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/837001155165006036>