

外科护理测试题及答案

1. 患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根，现麻醉未醒。目前该患者最重要的护理问题是（）

- A. 焦虑
- B. 疼痛
- C. 知识缺乏
- D. 潜在并发症：窒息(正确答案)
- E. 潜在并发症：感染

2. 患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根，现麻醉未醒。护士应置患者的体位是（）

- A. 头低足高位
- B. 头高足低位
- C. 仰卧位
- D. 平卧，头偏向一侧(正确答案)
- E. 中凹卧位

3. 患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根，术后第一天，护士主要观察患者有无发生（）

- A. 倾倒综合征
- B. 吻合口瘘
- C. 术后出血(正确答案)
- D. 排便困难
- E. 排尿异常

4. 患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根。现拔除胃管后的第三天，护士嘱患者可以食用（）

- A. 牛奶
- B. 土豆
- C. 芋艿
- D. 拉面
- E. 藕粉(正确答案)

5. 患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根。患者进食后，主诉上腹饱胀，呕吐物为食物，含胆汁，考虑该患者可能发生了（）

- A. 倾倒综合征
- B. 吻合口梗阻
- C. 吻合口瘘
- D. 输出襻梗阻(正确答案)
- E. 输入襻梗阻

6. 患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根，现怀疑输出襻梗阻，怀疑上述并发症时，首选的检查是（）

- A. X线造影(正确答案)
- B. 粪便隐血试验
- C. 胃镜检查
- D. 胃酸测定
- E. 血常规

7. 患者，男，68岁，胃溃疡合并幽门梗阻。今日晨于气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术中置入留置胃管及腹腔引流管各1根。术后第2周，患者进食30分钟后出现上腹饱胀、恶心、呕吐，自感头晕，考虑可能发生了（）

- A. 倾倒综合征(正确答案)

- B. 吻合口梗阻
- C. 吻合口瘘
- D. 术后出血
- E. 十二指肠残端破裂

8. 患者，男，28岁，主诉右下腹腹痛难忍，腹痛始于脐周，之后转移至右下腹，查体示：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，血压 118/78mmHg，右下腹压痛、肌紧张、反跳痛，腰大肌试验阳性，实验室检查：白细胞 $14.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例 0.82 该病人阑尾位置最可能位于（）

- A. 靠近闭孔外肌
- B. 腰大肌前方(正确答案)
- C. 盲肠中位
- D. 腰大肌后方
- E. 腰大肌侧面

9. 患者，男，28岁，主诉右下腹腹痛难忍，腹痛始于脐周，之后转移至右下腹，查体示：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，血压 118/78mmHg，右下腹压痛、肌紧张、反跳痛，腰大肌试验阳性，实验室检查：白细胞 $14.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例 0.82 患者 B 超检查可见（）

- A. 阑尾消失
- B. 阑尾形态正常
- C. 阑尾扭转
- D. 阑尾肿大(正确答案)
- E. 阑尾萎缩

10. 患者，男，28岁，主诉右下腹腹痛难忍，腹痛始于脐周，之后转移至右下腹，查体示：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，血压 118/78mmHg，右下腹压痛、肌紧张、反跳痛，腰大肌试验阳性，实验室检查：白细胞 $14.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例 0.82 根据患者的临床表现，判断下列最不可能出现的情况为（）

- A. 阑尾穿孔
- B. 阑尾化脓感染

- C. 阑尾坏疽
- D. 炎性渗出
- E. 炎症局限于粘膜下层(正确答案)

11. 患者，男，28岁，主诉右下腹腹痛难忍，腹痛始于脐周，之后转移至右下腹，查体示：体温38.8℃，脉搏118次/分，血压118/78mmHg，右下腹压痛、肌紧张、反跳痛，腰大肌试验阳性，实验室检查：白细胞 $14.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例0.82 针对患者目前情况，下列措施不妥当的是（）

- A. 手术下切除阑尾
- B. 腹腔镜下切除阑尾
- C. 阑尾切除
- D. 阑尾切除+腹腔引流管置入
- E. 非手术治疗(正确答案)

12. 患者，男，62岁，因前列腺增生行经尿道前列腺电切术，术后第一天患者各方面状况良好，无恶心、呕吐，腹胀，膀胱冲洗通畅。改为术后留置气囊导尿管的主要目的（）

- A. 引流膀胱
- B. 防止感染
- C. 膀胱冲洗
- D. 观察尿量
- E. 压迫前列腺窝(正确答案)

13. 患者，男，62岁，因前列腺增生行经尿道前列腺电切术，术后第一天患者各方面状况良好，无恶心、呕吐，腹胀，膀胱冲洗通畅。目前患者的饮食为（）

- A. 禁食
- B. 流质饮食
- C. 半流质饮食
- D. 普食(正确答案)
- E. 素食

14. 患者，男，62岁，因前列腺增生行经尿道前列腺电切术，术后第一天患者各方面状况良好，无恶心、呕吐，腹胀，膀胱冲洗通畅。膀胱冲洗的目的是（）

- A. 减少尿道出血
- B. 防止膀胱充血
- C. 避免血凝块堵塞导尿管(正确答案)
- D. 减轻患者疼痛
- E. 预防交叉感染

15. 患者，男，35岁，自2楼失足坠落，体格检查：神志模糊，脉搏110次/分，血压90/60mmHg，腹部膨隆，左季肋区皮肤擦伤，四肢无明显骨折征，拟诊为腹部闭合性损伤入院。此时应给予最恰当的措施是（）

- A. 全面检查，以了解伤情
- B. 有重点地做辅助检查，以明确诊断
- C. 诊断性腹腔穿刺
- D. 胸部X片摄片
- E. 补充血容量，以纠正休克(正确答案)

16. 患者，男，35岁，自2楼失足坠落，体格检查：神志模糊，脉搏110次/分，血压90/60mmHg，腹部膨隆，左季肋区皮肤擦伤，四肢无明显骨折征，拟诊为腹部闭合性损伤入院。其休克的类型属于（）

- A. 神经性休克
- B. 过敏性休克
- C. 低血容量性休克(正确答案)
- D. 心源性休克
- E. 感染性休克

17. 患者，男，35岁，自2楼失足坠落，体格检查：神志模糊，脉搏110次/分，血压90/60mmHg，腹部膨隆，左季肋区皮肤擦伤，四肢无明显骨折征，拟诊为腹部闭合性损伤入院。经进一步检查，疑有小肠破裂，在病情观察期间提示患者病情恶化需要手术的情况是（）

- A. 肠道出血停止

- B. 全身情况无恶化趋势
- C. 经积极抗休克治疗情况好转
- D. 腹痛和腹膜刺激征进行性加重(正确答案)
- E. 肠鸣音正常, 无减弱或消失

18. 患者, 男, 43 岁, 无痛间歇全程肉眼血尿 1 周加重 2 日, 伴右侧腰部隐痛 1 月余, 腰部可扪及一约 7cm6cm 的肿块。该患者最可能的诊断是 ()

- A. 肾盂癌
- B. 肾囊肿
- C. 输尿管癌
- D. 肾癌(正确答案)
- E. 肾脓肿

19. 患者, 男, 43 岁, 无痛间歇全程肉眼血尿 1 周加重 2 日, 伴右侧腰部隐痛 1 月余, 腰部可扪及一约 7cm6cm 的肿块。该患者首选简单易行的检查方法是 ()

- A. 尿常规
- B. 排泄性尿路造影
- C. 腹部 X 平片
- D. B 超(正确答案)
- E. 肾动脉造影

20. 患者, 男, 43 岁, 无痛间歇全程肉眼血尿 1 周加重 2 日, 伴右侧腰部隐痛 1 月余, 腰部可扪及一约 7cm6cm 的肿块。患者因瘤体较大, 在手术前 1 天行肾动脉栓塞术, 其作用是 ()

- A. 抑制激素分泌
- B. 使瘤体缩小, 减少术中出血(正确答案)
- C. 鉴别肾实质性肿块与囊性
- D. 预防胸膜破裂
- E. 鉴别与观察低热原因

21. 患者，男，50岁，进行性吞咽困难半年，X线钡餐透视诊断为食管癌。此患者最初期的症状应是（）

- A. 食管内异物感(正确答案)
- B. 吞咽困难
- C. 持续性胸背部疼痛
- D. 声音嘶哑
- E. 喝水时呛咳

22. 患者，男，50岁，进行性吞咽困难半年，X线钡餐透视诊断为食管癌。为判断肿瘤性质，该患者还需要进行的检查是（）

- A. B超
- B. 拍胸部正侧位片
- C. CT
- D. 食道纤维镜检，取活组织(正确答案)
- E. 食道拉网

23. 患者，男，50岁，进行性吞咽困难半年，X线钡餐透视诊断为食管癌。该患者术后护理错误的是（）

- A. 术后48小时内吸氧
- B. 适当止痛
- C. 尽量避免咳嗽(正确答案)
- D. 病情平稳后取半卧位
- E. 拔除胸腔引流管尽早下床

24. 患者，男，52岁，身高177cm，体重50KG，既往吸烟20年，因进行性吞咽困难3个月就诊入院。经食管镜检查示食管中段6cm长之管腔狭窄，黏膜中断，病检报告为鳞癌Ⅱ级。查体：锁骨上无肿大淋巴结，无声嘶。对患者行食管-胃吻合术。此患者术前最重要的护理诊断是（）

- A. 知识缺乏
- B. 低效性呼吸型态
- C. 有外伤的危险

D. 有皮肤完整性受损的危险

E. 营养失调：低于机体需要量(正确答案)

25. 患者，男，52岁，身高177cm，体重50KG，既往吸烟20年，因进行性吞咽困难3个月就诊入院。经食管镜检查示食管中段6cm长之管腔狭窄，黏膜中断，病检报告为鳞癌Ⅱ级。查体：锁骨上无肿大淋巴结，无声嘶。对患者行食管-胃吻合术。下列术后护理措施不妥的是（）

A. 听诊双肺呼吸音是否清晰

B. 术后2日内持续胃肠减压(正确答案)

C. 术后第1日每2小时鼓励患者使用深呼吸训练器

D. 患者若出现呼吸浅快应立即行鼻导管深部吸痰

E. 保持气道通畅

26. 患者，男，52岁，身高177cm，体重50KG，既往吸烟20年，因进行性吞咽困难3个月就诊入院。经食管镜检查示食管中段6cm长之管腔狭窄，黏膜中断，病检报告为鳞癌Ⅱ级。查体：锁骨上无肿大淋巴结，无声嘶。对患者行食管-胃吻合术。患者术后可能发生的最严重的并发症是（）

A. 出血

B. 感染

C. 吻合口瘘(正确答案)

D. 乳糜胸

E. 反流性食管炎

27. 患者，男，52岁，身高177cm，体重50KG，既往吸烟20年，因进行性吞咽困难3个月就诊入院。经食管镜检查示食管中段6cm长之管腔狭窄，黏膜中断，病检报告为鳞癌Ⅱ级。查体：锁骨上无肿大淋巴结，无声嘶。对患者行食管-胃吻合术。该患者出院后1月又出现吞咽不畅，可能的原因是（）

A. 反流性食管炎

B. 幽门梗阻

C. 肠梗阻

D. 吻合口狭窄(正确答案)

E. 吻合口溃疡

28. 赵先生，30岁，肛门周围不断有少量脓性分泌物溢出，甚至有大便和气体排出一周，肛周皮肤瘙痒。肛门检查：肛门周围皮肤有一乳头状隆起开口，挤压可见少量脓性分泌物。根据患者上述症状，你考虑为（）

A. 肛瘘(正确答案)

B. 肛门周围脓肿

C. 肛裂

D. 内痔

E. 外痔

29. 赵先生，30岁，肛门周围不断有少量脓性分泌物溢出，甚至有大便和气体排出一周，肛周皮肤瘙痒。肛门检查：肛门周围皮肤有一乳头状隆起开口，挤压可见少量脓性分泌物。下列那一种检查可以确诊（）

A. 直肠指诊

B. 从皮肤开口插入探针(正确答案)

C. 肛门镜检查

D. X线钡剂灌肠

E. 局部穿刺

30. 关于代谢性酸中毒，以下哪项正确（）

A. $\text{pH} \uparrow$ ， $\text{PaCO}_2 \uparrow$ ， $\text{HCO}_3^- \uparrow$

B. $\text{pH} \uparrow$ ， $\text{PaCO}_2 \downarrow$ ， $\text{HCO}_3^- \downarrow$

C. $\text{pH} \downarrow$ ， $\text{PaCO}_2 \downarrow$ ， $\text{HCO}_3^- \uparrow$

D. $\text{pH} \downarrow$ ， $\text{PaCO}_2 \uparrow$ ， $\text{HCO}_3^- \downarrow$

E. $\text{pH} \downarrow$ ， $\text{PaCO}_2 \downarrow$ ， $\text{HCO}_3^- \downarrow$ (正确答案)

31. 患者男性，15岁，伸直型肱骨髁上骨折愈合后致爪形手形成。其原因是损伤了（）

A. 肱动脉(正确答案)

B. 正中神经

C. 正中静脉

D. 尺神经

E. 桡神经

32. 男，55岁，血栓闭塞性脉管炎Ⅱ期，左小腿疼痛剧烈。下列止痛措施错误的是（）

A. 用血管扩张药

B. 用低分子右旋糖酐

C. 用中分子右旋糖酐(正确答案)

D. 用麻醉性镇痛药

E. 通过硬膜外使用镇痛泵

33. 患者，女性，64岁。食管癌收治入院，准备行食管-胃吻合术，术前护理人员向其家属提供临床教育时，下列不正确的是（）

A. 术前常规留置胃管

B. 术前需清洁灌肠(正确答案)

C. 术后最严重的并发症是吻合口瘘

D. 术后可出现进食后呼吸困难

E. 术后应严格按医嘱进食

34. 女，46岁，反复出现腹痛、寒战高热、黄疸，确诊为原发性胆总管结石。结石的主要成分为（）

A. 胆汁酸结石

B. 胆固醇结石

C. 胆盐结石

D. 胆色素结石(正确答案)

E. 含钙结石

35. 患者女性，30岁。右腰部撞伤后局部疼痛，肿胀，有淡红色血尿，诊断为右肾挫伤，行非手术治疗。其护理措施下列哪项是错误的（）

A. 观察腹痛的变化

B. 注意血尿情况

C. 绝对卧床至少2周

D. 监测血尿变化，颜色加深提示出血加重

E. 血尿消失，可下地活动(正确答案)

36. 患者男性，58岁，经结肠镜检查确诊为右半结肠癌。下列哪一临床表现其最不可能出现（）

A. 贫血

B. 乏力

C. 消瘦

D. 腹部肿块

E. 肠梗阻(正确答案)

37. 患者男性，38岁，因房屋倒塌长时间压迫而致严重挤压伤。对其护理时应特别注意观察的是（）

A. 体温脉搏

B. 精神状态

C. 局部疼痛情况

D. 肢端的温度

E. 尿量和尿色(正确答案)

38. 患者，男性，34岁。1周前左足底被铁钉刺伤，自行包扎，昨夜突感胸闷、紧缩感。晨起，张口困难和抽搐，诊断为破伤风。破伤风是破伤风梭菌所致的（）

A. 菌血症

B. 败血症

C. 脓血症

D. 毒血症(正确答案)

E. 脓毒败血症

39. 患者男性，35岁，颈5-颈6骨折合并四肢瘫痪，无感染灶，出现高热，下列措施中哪项不适宜（）

A. 冰水灌肠

B. 冰水擦浴(正确答案)

- C. 通风
- D. 药物降温
- E. 调节室温

40. 患者男性，28岁，脑外伤后出现小脑幕切迹疝，下列对其临床表现描述正确的是（）

- A. 血压升高，心率加快
- B. 意识障碍，呼吸急促
- C. 同侧瞳孔缩小，对侧肢体肌张力下降，腱反射消失
- D. 同侧瞳孔扩大，同侧肢体肌张力升高，腱反射亢进
- E. 意识丧失，患侧瞳孔短暂缩小，以后散大，对侧肢体瘫痪(正确答案)

41. 男，48岁，双下肢静脉曲张并伴慢性溃疡，下列不正确的处理是（）

- A. 积极换药
- B. 预防感染
- C. 进行分期动、静脉转流术(正确答案)
- D. 创面湿敷
- E. 休息，抬高患肢

42. 患者，女性，42岁。自6米高处跌下1小时，腹痛，腹肌紧张，伴压痛和反跳痛，肠鸣音弱，血压100/60mmHg，脉率132次/分，X线摄片显示：右第9、10肋骨骨折，右膈肌升高。应考虑为（）

- A. 肝破裂(正确答案)
- B. 脾破裂
- C. 十二指肠破裂
- D. 胰腺破裂
- E. 结肠破裂

43. 患者男性，58岁，3个月前出现无痛血尿，应用止血药物后有好转，其他无不适。1周前再次出现血尿，应考虑为下列何种疾病（）

- A. 尿路结石
- B. 膀胱肿瘤(正确答案)

- C. 尿路感染
- D. 前列腺增生
- E. 尿道损伤

44. 患者，女性，26岁。车祸致头部受伤后当即昏迷，20分钟后逐渐清醒，1天后出现烦躁、头痛、呕吐，随后再次昏迷。体检：伤侧瞳孔散大，对光反射消失，对侧肢体不完全性瘫痪、巴宾斯基征(+)，应考虑为()

- A. 脑震荡
- B. 慢性硬膜下血肿
- C. 原发性脑干损伤
- D. 硬脑膜外血肿(正确答案)
- E. 急性硬脑膜下血肿

45. 患者女性，22岁，突有寒战高热，膝关节红、肿、热、痛明显。诊断为急性化脓性关节炎。其早期治疗不包括()

- A. 静脉输注抗生素
- B. 关节腔注入抗生素
- C. 关节灌洗
- D. 牵引
- E. 内固定(正确答案)

46. 患者男性，60岁。行食管癌切除术，术后胃管保留时间，一般至少为()

- A. 1-2天
- B. 3-4天(正确答案)
- C. 5-6天
- D. 7-10天
- E. 11-14天

47. 患者男性，27岁，胸部损伤后，考虑为单纯肋骨骨折，下列哪项症状对诊断最有意义()

- A. 胸部叩击为鼓音

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856150013213010044>