

# 宁夏超声医学科模拟题 2021 年(59)

(总分 100,考试时间 120 分钟)

## A1/A2 题型

1. 关于子宫内膜异位症的描述, 不正确的是
  - A. 一般见于生育年龄妇女, 以 25~45 岁妇女多见
  - B. 异位种植的子宫内膜随卵巢激素的变化而发生周期性出血
  - C. 继发性痛经及渐进性加重为其典型症状
  - D. 超声检查是目前国际公认的最佳诊断方法
  - E. 具有增生、浸润、转移及复发等恶性行为
2. 能够准确检测子宫内膜癌肌层浸润深度的检查方法是
  - A. 经腹超声检查
  - B. 经阴道超声检查
  - C. 宫腔镜检查
  - D. 分段诊刮检查
  - E. 经会阴超声检查
3. 关于多囊卵巢综合征的描述, 不正确的是
  - A. 临床常有月经稀发或闭经、多毛、肥胖等症状
  - B. 双侧卵巢呈均匀性增大, 包膜较厚, 回声增强
  - C. 卵巢包膜下可见大小相近的类圆形无回声区
  - D. 卵巢内小囊总数常超过 10 个
  - E. 超声可直接诊断多囊卵巢综合征
4. 关于卵巢黏液性囊腺癌的描述, 不正确的是
  - A. 发生率较卵巢浆液性囊腺癌高
  - B. 多为单侧发生
  - C. 多合并腹水
  - D. 囊腔内有较多光带分隔, 间隔较厚且不规则
  - E. 可向周围组织浸润粘连
5. 关于胎头侧脑室的描述, 不正确的是
  - A. 侧脑室水平横切面位于丘脑水平横切面与颅顶之间
  - B. 在侧脑室水平横切面上, 颅骨光环呈椭圆形, 较丘脑平面略大
  - C. 侧脑室后角内含有强回声的脉络丛及无回声的脑积液
  - D. 在任何孕周, 侧脑室内径测值均应 $<10\text{mm}$
  - E. 侧脑室水平横切面为测量侧脑室内径的标准切面
6. 关于多胎妊娠的描述, 不正确的是
  - A. 以双胎发生率最高
  - B. 多胎妊娠常合并羊水过多

- C. 双绒毛膜囊单羊膜囊双胎妊娠罕见
- D. 多胎妊娠属高危妊娠
- E. 孕早期诊断多胎妊娠，诊断准确性高
7. 脊柱裂时关于脊柱的声像图表现，不正确的是
- A. 脊柱三角形骨化中心失去正常形态
- B. 位于后方的两个椎弓骨化中心向前开放
- C. 脊柱三个骨化中心呈"U"或"V"字形改变
- D. 较大的脊柱裂时，矢状切面可显示明显的脊柱后凸畸形
- E. 脊柱冠状切面可显示后方的两个椎弓骨化中心距离增大
8. 关于前置胎盘超声检查的描述，不正确的是
- A. 检查时膀胱充盈得越好，对"前置胎盘"的诊断越准确
- B. 检查时首先要明确胎盘下缘的位置
- C. 确定胎盘下缘与宫颈内口的关系
- D. 可采用经腹检查法
- E. 也可采用经会阴检查法
9. 最常与葡萄胎并发的卵巢囊肿是
- A. 滤泡囊肿
- B. 皮样囊肿
- C. 巧克力囊肿
- D. 黄素囊肿
- E. 黄体囊肿
10. 关于子宫肌瘤分型的描述，不正确的是
- A. 根据肌瘤与子宫肌壁的关系分为肌壁间、浆膜下和黏膜下肌瘤
- B. 肌壁间肌瘤位于肌层内，占总数的 40%~50%
- C. 浆膜下肌瘤突出于子宫表面，仅由子宫浆膜层覆盖
- D. 黏膜下肌瘤向宫腔内突出，表面由子宫内膜覆盖
- E. 阔韧带肌瘤属于浆膜下肌瘤
11. 关于羊水测量的描述，不正确的是
- A. 测量羊水最大深度时，要选择羊水池最大暗区，测量其垂直前后径
- B. 羊水指数为子宫四个象限内羊水池最大深度之和
- C. 测量羊水深度时，要避开胎儿肢体或脐带
- D. 测量羊水深度时，探头应垂直于孕妇的腹壁
- E. 测量羊水深度时，要在胎儿相对不活动时测量
12. 患者女性，36 岁，孕 33 周，胎儿腹部横切面显示腹壁皮肤层回声中断，肠管及部分肝脏向腹腔外突出并漂浮在羊水内，最正确的诊断是
- A. 脐疝
- B. 脐膨出
- C. 腹裂畸形
- D. 中肠疝
- E. 肠管外翻畸形
13. 患者女性，42 岁，孕 3 产 1。经量增多并经期延长 3 年余，同时伴有进行性痛经。妇科检查发现子宫均匀性增大，质硬并有压痛根据临床表现及声像图特征，该患诊断为子宫腺肌病，关于子宫腺肌病的声像图描述，不正确的是
- A. 子宫饱满增大、圆钝

- B. 子宫肌壁回声粗糙、不均匀
- C. 子宫内膜增厚、回声增高呈球状，内有多发小点状暗区
- D. 子宫内膜线多向前移位，也可向后移位
- E. 增厚的子宫后壁回声有时可见斑点状无回声区
14. 患者，女性，34岁，无明显诱因出现左下腹部疼痛，伴恶心呕吐。无停经史。查体：急症面容，脸色苍白，血压 110/70mmHg，下腹有压痛和反跳痛，移动性浊音(-)，体温 38.5℃，血 HCG 正常，血白细胞升高。根据以上病史及检查结果，应首先考虑该患者可能是什么病
- A. 黄体破裂
- B. 阑尾炎
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 宫外孕
- E. 盆腔积液
15. 患者女性，42岁，月经规律，自觉腹部胀痛、消瘦就诊。超声显示：子宫未见异常；左右卵巢可见大小分别为 68mm×51mm、57mm×43mm 呈椭圆形、边界清楚、被膜完整、高低回声不均匀的实质性肿块，肿块内有不规则无回声区；腹水中等量，并于上腹部胃区可见"假肾状"回声。如果胃区未发现"假肾状"回声，应重点扫查的部位，哪项除外
- A. 回盲部
- B. 乳腺
- C. 直肠
- D. 结肠
- E. 肝脏
16. 患者，女，34岁，妊娠 27 周。超声检查发现羊水过多。羊水过多提示胎儿可能存在下述畸形，不正确的是
- A. 脊柱裂
- B. 无脑儿
- C. 十二指肠闭锁
- D. 婴儿型多囊肾
- E. 食道闭锁
17. 对子宫肌瘤的描述，不正确的是
- A. 子宫肌瘤由平滑肌细胞增生而成，其中含少量纤维结缔组织
- B. 子宫肌瘤周围具有真包膜，故与肌壁之间界限清楚，手术时易剥出
- C. 子宫肌瘤具有漩涡状或编织状结构，质地较韧
- D. 子宫肌瘤表面光滑，多呈球形，也可呈不规则形
- E. 子宫肌瘤可发生恶变
18. 关于卵巢子宫内膜异位症的描述，不正确的是
- A. 卵巢子宫内膜异位症是最常见的盆腔内膜异位症
- B. 卵巢囊肿内为"巧克力样"液体，即可诊断为卵巢子宫内膜异位囊肿
- C. 异位内膜随卵巢激素的变化而发生周期性出血
- D. 多累及双侧卵巢
- E. 可发生不孕症或急腹症
19. 子宫内膜癌与子宫内膜息肉的鉴别要点，不正确的是
- A. 病变区与周围正常内膜界限是否清晰
- B. 病灶部位与正常肌层有无清晰分界
- C. 病灶部位内膜基底层是否完整

- D. 是高回声型还是低回声型  
E. 血流信号丰富程度及阻力指数
20. 关于黄素囊肿的描述, 不正确的是  
A. 常与妊娠滋养细胞疾病并发  
B. 囊肿大小不一, 分隔粗细不等  
C. 卵巢内呈多房性囊肿样改变  
D. 常为双侧性, 也可单侧发生  
E. 与绒毛膜促性腺激素过度刺激有关
21. 关于卵巢转移癌的描述, 不正确的是  
A. 多来自于胃肠道、乳腺等  
B. 多为双侧发生  
C. 原发于胃肠道的卵巢转移癌又称库肯勃瘤(Krukenberg tumor)  
D. 病灶内不会出现黏液样囊性区  
E. 瘤内有出血、坏死时, 局部出现不规则无回声区
22. 关于胎儿头围的描述, 不正确的是  
A. 头围测量可全面显示出胎头的实际大小  
B. 孕 32 周后, 腹围大于头围  
C. 测量头围时沿胎头颅骨光环外缘描记  
D. 测量头围标准切面同双顶径测量切面  
E. 测量头围的标准切面内不能显示第四脑室
23. 关于死胎的临床及超声描述, 不正确的是  
A. 超声检查是诊断死胎最常用、最简便、最准确的方法  
B. 随胎儿死亡时间的推移, 羊水量逐渐增多  
C. 脐带异常(如脐带脱垂、缠绕、打结等)是引起死胎最常见的原因  
D. 超声显示无胎心搏动、无胎体胎肢活动  
E. 胎儿死亡 1 周左右时, 可出现胎头变形、皮肤水肿等改变
24. 脊柱裂时常合并的颅脑异常, 下列描述不正确的是  
A. 脑室扩张  
B. 香蕉小脑征  
C. 柠檬头征  
D. 后颅窝池消失  
E. 骶尾部脊柱裂常合并无脑儿
25. 关于胎盘早剥的临床及病理描述, 不正确的是  
A. 胎盘早剥分为隐性早剥和显性早剥  
B. 主要病理变化是底蜕膜出血, 形成的血肿使胎盘与底蜕膜分离  
C. 主要临床症状是无痛性阴道出血  
D. 胎盘后出血和胎盘边缘出血可引起胎盘早剥  
E. 隐性胎盘早剥严重时可致子宫卒中
26. 超声判断胎儿宫内生长迟缓的指标不包括以下哪一项  
A. 双顶径  
B. 羊水  
C. 腹围  
D. 头围  
E. 股骨长

27. 卵巢浆液性囊腺瘤，临床和声像图表现，下列哪一项不正确
- A. 肿瘤轮廓清晰
  - B. 囊肿后壁及后方回声增强
  - C. 囊壁纤薄
  - D. 双侧性占 80%
  - E. 肿瘤直径一般为 5~10cm
28. 患者女性，18 岁，无月经来潮，因周期性腹痛就诊，无发热。超声检查：子宫体正常，子宫下方相当于阴道位置可见 82mm×53mm 边界清楚，椭圆形液性暗区，内透声不好，有较多细弱回声光点。可能的诊断为
- A. 卵巢囊肿
  - B. 盆腔脓肿
  - C. 巧克力囊肿
  - D. 处女膜闭锁
  - E. 盆腔包裹性积液
29. 女性，65 岁，自述绝经 10 年，不规则阴道出血半个月，二维超声检查见宫腔分离，子宫内膜增厚。可提示为
- A. 子宫内膜癌
  - B. 子宫颈癌
  - C. 宫腔积液
  - D. 子宫内膜息肉
  - E. 子宫内膜积血
30. 患者女性，42 岁，孕 3 产 1。经量增多并经期延长 3 年余，同时伴有进行性痛经。妇科检查发现子宫均匀性增大，质硬并有压痛于子宫后壁还可见一大小 56mm×52mm 边界模糊、等回声不均匀实质性占位，内部血流信号较丰富，周边无环状或半环状血流信号，最可能的诊断为
- A. 子宫壁间肌瘤
  - B. 子宫浆膜下肌瘤
  - C. 子宫肉瘤
  - D. 子宫腺肌瘤
  - E. 子宫体癌
31. 患者，女性，34 岁，无明显诱因出现左下腹部疼痛，伴恶心呕吐。无停经史。查体：急症面容，脸色苍白，血压 110/70mmHg，下腹有压痛和反跳痛，移动性浊音(-)，体温 38.5℃，血 HCG 正常，血白细胞升高。经阴道超声检查，于左下腹见 50mm×55mm 类圆形囊性为主的混合性肿块，边界尚清晰，被膜较厚，一侧囊肿壁旁可见高回声光团伴声影，囊性部分内有密集细小点状回声飘动，被膜周围可见细小低回声暗带，请问该患者最可能患的疾病是
- A. 肠炎
  - B. 阑尾炎
  - C. 卵巢囊肿蒂扭转
  - D. 宫外孕
  - E. 卵巢囊性畸胎瘤蒂扭转
32. 患者女性，42 岁，月经规律，自觉腹部胀痛、消瘦就诊。超声显示：子宫未见异常；左右卵巢可见大小分别为 68mm×51mm、57mm×43mm 呈椭圆形、边界清楚、被膜完整、高低回声不均匀的实质性肿块，肿块内有不规则无回声区；腹水中等量，并于上腹部胃区可见"假肾状"回声。不易引起腹水的卵巢肿瘤是

- A. 黏液性囊腺癌
  - B. 浆液性囊腺癌
  - C. 卵巢囊性畸胎瘤
  - D. 卵巢纤维瘤
  - E. 卵巢转移癌
33. 患者，女，34岁，妊娠27周。超声检查发现羊水过多。超声检查发现胎儿骶尾部脊柱裂合并脊膜膨出，该胎儿最可能出现的脑部特征是
- A. 透明隔腔增宽
  - B. 第四脑室扩张
  - C. 颅后窝池消失
  - D. 脑膜膨出
  - E. 胼胝体缺失
34. 关于子宫肌瘤的声像图表现，错误的是
- A. 子宫增大，轮廓正常或异常
  - B. 子宫肌瘤内部回声复杂，多数为低回声，少数为等回声或高回声
  - C. 子宫肌瘤发生玻璃样变时，变性区漩涡状结构消失，呈边界模糊的高回声区
  - D. 较大的壁间肌瘤可压迫或推挤宫腔，使内膜移位或显示不清
  - E. 阔韧带肌瘤易误诊为卵巢肿瘤、子宫畸形等
35. 关于子宫内膜异位症的表现，不正确的是
- A. 月经异常
  - B. 多有痛经，且呈进行性加重趋势
  - C. 可有不孕
  - D. 闭经
  - E. 下腹或腰骶部疼痛
36. 对子宫内膜增生过长的声像图描述，不正确的是
- A. 单纯型增厚内膜多呈均匀高回声
  - B. 腺囊型增厚内膜内散在小囊状或筛孔状无回声暗区
  - C. 内膜基底线回声模糊
  - D. 内膜回声不均匀
  - E. 多伴有单侧或双侧卵巢增大
37. 关于卵巢浆液性囊腺瘤的描述，不正确的是
- A. 属于卵巢上皮性肿瘤
  - B. 肿瘤直径一般为5~10cm
  - C. 多为双侧发生
  - D. 囊壁薄，呈单房或多房
  - E. 可分为单纯性和乳头状两种
38. 关于正常妊娠囊的描述，不正确的是
- A. 位于宫腔中上段的宫腔中央
  - B. 轮廓光滑完整
  - C. 回声及厚度均匀、饱满
  - D. 可见双环征
  - E. 经腹超声一般在停经后5~6周可发现妊娠囊
39. 关于测量股骨标准切面的描述，不正确的是
- A. 声束与股骨长径垂直

- B. 声束从股骨内侧扫查，完全显示股骨
- C. 测量股骨的骨化部分，不包括两端的软骨部分
- D. 股骨两端呈平行的斜面
- E. 测量点放在股骨两端的中点上
40. 关于胎儿宫内生长迟缓(IUGR)的描述，不正确的是
- A. 胎儿体重低于相应胎龄正常胎儿体重的第 10 个百分位数即可诊断
- B. 超声检查是首选的最有效的方法
- C. 胎盘早剥、胎盘血管瘤等可导致 IUGR
- D. 匀称型 IUGR 较常见，且预后较严重
- E. 母亲患有严重糖尿病、慢性高血压等是发生 IUGR 的高危因素
41. 脊髓脊膜膨出的声像图表现，不正确的是
- A. 在脊柱裂发生部位可见囊状物膨出
- B. 囊状膨出物表面无皮肤覆盖
- C. 可合并羊水过多
- D. 膨出的囊性包块内可见多条纤细光带
- E. 膨出包块的液性成分为脑脊液
42. 胎盘早剥的声像图表现，不正确的是
- A. 急性出血时，胎盘和子宫之间可见中等或强回声的血肿声像图
- B. 1~2 周后，此血肿由于机化变为更强回声
- C. 隐性剥离时，剥离区的胎盘增厚
- D. 如血液破入羊膜腔，羊水内透声差，可见漂浮的低回声光点
- E. 如果剥离面过大，可能出现胎心减慢或胎死宫内
43. 超声检查至少在妊娠几周后才能较好地看到胎儿
- A. 2 周      B. 4 周
- C. 6 周      D. 8 周
- E. 9 周
44. 关于慢性输卵管积水的声像图表现，不正确的是
- A. 常无症状，多数患者因不孕症检查发现
- B. 多为双侧发生
- C. 附件区囊性肿块，呈腊肠状、弯曲长管状或盲袋状
- D. 囊壁较厚呈不均质低回声，囊内呈无回声液性暗区
- E. 常伴有盆腔粘连、盆腔积液
45. 患者女性，既往月经正常，现闭经 68 天，尿妊娠试验阳性，阴道无流血。超声检查：子宫饱满稍大，宫腔内可见平均内径为 29mm 妊娠囊，囊内未见明显胚胎组织及胎心搏动。正确的诊断是
- A. 先兆流产
- B. 不全流产
- C. 稽留流产
- D. 枯萎孕卵
- E. 难免流产
46. 患者，女性，19 岁，月经稀少，多毛，肥胖。超声检查：子宫正常大小，双侧卵巢增大，其内可见多个无回声。血 LH/FSH>3.0，诊断可能为
- A. 多囊卵巢
- B. 卵巢肿瘤

- C. 垂体瘤
- D. 子宫畸形
- E. 子宫内膜炎

47. 患者女性，26岁，平素月经规律并有痛经史。此次月经推迟4天，阴道少量流血3天，同时伴下腹部隐痛，加剧4小时。超声检查显示：子宫大小：58mm×45mm×51mm，形态饱满，内膜厚11mm，左侧卵巢大小35mm×21mm，右侧卵巢显示不清，于右附件区可见85mm×69mm形态不规则，高低回声不均匀实质性占位，血运不丰富，盆腔及腹腔可见少量透声尚可的游离性积液根据病史及超声表现，右附件区的实质性占位，首先考虑的疾病为

- A. 右附件恶性肿瘤
- B. 右附件凝血块
- C. 右附件纤维瘤
- D. 右附件炎性肿块
- E. 右附件巧克力囊肿

48. 患者，女性，34岁，无明显诱因出现左下腹部疼痛，伴恶心呕吐。无停经史。查体：急症面容，脸色苍白，血压110/70mmHg，下腹有压痛和反跳痛，移动性浊音(-)，体温38.5℃，血HCG正常，血白细胞升高。对于卵巢囊性畸胎瘤的临床和声像图表现，下列哪一项是错误的

- A. 最常见于青年女性
- B. 是常见的卵巢肿瘤
- C. 也称皮样囊肿
- D. 后方无声影或声衰减
- E. 可见脂-液平面

49. 患者女性，39岁，月经规律，因下腹部胀痛3天就诊。超声显示：左附件区可见53mm×45mm边界清楚、被膜完整稍厚、内有光带分隔、透声不好的囊肿根据以上超声表现，可除外下列哪项诊断

- A. 左输卵管、卵巢积脓
- B. 左卵巢巧克力囊肿
- C. 左卵巢黄体出血
- D. 左卵巢黄素囊肿
- E. 左卵巢浆液性囊腺瘤伴出血

50. 患者，女，34岁，妊娠27周。超声检查发现羊水过多。超声检查还发现该胎儿侧脑室扩张，宽度为17mm，诊断为脑积水。关于脑积水的诊断标准，正确的是

- A. 侧脑室宽径大于15mm
- B. 侧脑室宽径大于14mm
- C. 侧脑室宽径大于13mm
- D. 侧脑室宽径大于12mm
- E. 侧脑室宽径大于11mm

51. 下列哪项不属于子宫肌瘤的继发变性

- A. 脂肪变
- B. 囊性变
- C. 肉瘤样变
- D. 纤维变
- E. 钙化

52. 关于子宫腺肌瘤与子宫肌瘤的声像图表现，主要鉴别点是



- A. 子宫增大
  - B. 子宫内膜移位
  - C. 子宫肌层回声不均
  - D. 子宫形态不规则
  - E. 瘤体周边未见环状或半环状血流信号
53. 下列哪一项不属于卵巢非赘生性囊肿
- A. 滤泡囊肿
  - B. 多囊卵巢
  - C. 黄体血肿
  - D. 未成熟卵泡
  - E. 黄素囊肿
54. 关于黏液性囊腺瘤的描述, 不正确的是
- A. 多为单侧发生
  - B. 囊腔内充满胶冻状、藕糊状或黏液性液体
  - C. 囊肿破裂可引起腹膜种植
  - D. 多数囊壁合并有乳头状物
  - E. 囊内呈多房结构, 房腔大小不一
55. 关于卵黄囊的描述, 不正确的是
- A. 是妊娠囊内超声能发现的第一个解剖结构
  - B. 发现卵黄囊可以肯定为妊娠囊并有胚胎存在
  - C. 卵黄囊直径超过 10mm 提示妊娠后果不良
  - D. 卵黄囊呈球形, 壁薄光滑, 透声好
  - E. 孕 11 周时卵黄囊最大, 而后逐渐缩小
56. 关于胎儿头臀长(CRL)的叙述, 不正确的是
- A. 测量 CRL, 适用于 7~12 孕周
  - B. 孕 8 周以前, 所测头臀长实际是颈臀长
  - C. 测量 CRL 的标准切面为胎体最长、最直的正中冠状切面
  - D. 测量 CRL 时, 不能包括胎儿肢体或卵黄囊
  - E. 胚胎的颅顶部至臀部外缘的距离即为 CRL
57. 超声检查胎儿宫内生长迟缓的主要观察指标及注意事项, 不正确的是
- A. 胎头双顶径
  - B. 胎儿头围、腹围及其比值
  - C. 胎儿股骨长及股骨长与腹围的比值
  - D. 头径指数
  - E. 不能仅根据一次测量结果做出诊断, 应动态观察 2~3 周后才能下结论
58. 十二指肠闭锁常常伴发的其他畸形, 不包括下列哪一项
- A. 小肠旋转不良
  - B. 胆囊不发育
  - C. 食管闭锁
  - D. 室间隔缺损
  - E. 多囊肾
59. 引起月经过多的常见病因是
- A. 浆膜下子宫肌瘤
  - B. 卵巢畸胎瘤

- C. Asherman 综合征  
D. 黏膜下子宫肌瘤  
E. 输卵管妊娠
60. 脐带内有  
A. 两条动脉，一条静脉  
B. 两条动脉，两条静脉  
C. 两条静脉，一条动脉  
D. 一条动脉，一条静脉  
E. 一条动脉，几条静脉
61. 葡萄胎声像图上宫腔内有多数直径 3~5mm 无回声囊泡，最大可能是  
A. 宫腔内积液  
B. 钙化  
C. 黄体囊肿  
D. 水肿绒毛  
E. 妊娠囊
62. 患者女性，31 岁。婚后 4 年，既往月经规律。现停经 54 天，不规则阴道流血 4 天。超声检查：于左侧附件区可见平均内径为 25mm 妊娠囊，并见胚芽及原始心管搏动。最不可能的妊娠部位是  
A. 输卵管峡部  
B. 输卵管壶腹部  
C. 卵巢  
D. 阔韧带  
E. 输卵管间质部
63. 患者，女，37 岁，孕 4 产 1，下腹部及腰骶部疼痛约 6 年，临床诊断盆腔静脉淤血综合征，申请超声检查，下述各项不支持该诊断的是  
A. 大多数发生在 30~50 岁的经产妇  
B. 是由多种因素引起的盆腔静脉血管充血、扩张和淤血所致的综合征  
C. 是引起妇科慢性疼痛的重要原因之一  
D. 声像图主要表现为子宫旁串珠状或蜂窝状无回声区，呈红、蓝相间血流  
E. 频谱为连续、高速、搏动性波形
64. 患者女性，26 岁，平素月经规律并有痛经史。此次月经推迟 4 天，阴道少量流血 3 天，同时伴下腹部隐痛，加剧 4 小时。超声检查显示：子宫大小：58mm×45mm×51mm，形态饱满，内膜厚 11mm，左侧卵巢大小 35mm×21mm，右侧卵巢显示不清，于右附件区可见 85mm×69mm 形态不规则，高低回声不均匀实质性占位，血运不丰富，盆腔及腹腔可见少量透声尚可的游离性积液为明确诊断，下列哪项检查是首选而且简便易行的  
A. 超声引导下对腹腔积液进行诊断性穿刺  
B. 超声引导下对占位病变进行穿刺活检  
C. CT 检查  
D. MRI 检查  
E. 腹部 X 线平片
65. 患者，女性，34 岁，无明显诱因出现左下腹部疼痛，伴恶心呕吐。无停经史。查体：急症面容，脸色苍白，血压 110/70mmHg，下腹有压痛和反跳痛，移动性浊音(-)，体温 38.5℃，血 HCG 正常，血白细胞升高。该患者手术中，于脐周左侧腹部又发现两个囊性畸胎瘤，请问超声误诊的主要原因是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/865323243230011104>