

口腔颌面外科学练习题+参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、关于药物止血法的适应证，错误的是

- A、小静脉出血
- B、组织渗血
- C、小动脉出血
- D、知名动脉出血
- E、可全身及局部使用

正确答案：D

2、女，61 岁。右上尖牙残根，拟拔除后修复。局部麻醉最好选择

- A、眶下孔阻滞麻醉
- B、翼腭管传导阻滞麻醉
- C、腭前神经阻滞麻醉
- D、切牙孔阻滞麻醉
- E、唇、腭侧局部浸润麻醉

正确答案：E

3、女，35 岁。左下颌下腺炎长期反复发作，双合诊左口底区可触及一硬结，为明确是否有结石，最正确的检查是

- A、B 超检查
- B、拍牙片
- C、拍下颌咬合片
- D、MRI 检查
- E、CT 检查

正确答案：C

4、患者男，57 岁。拟诊为右三叉神经痛，对鉴别原发、继发三叉神经痛最有意义的检查结果是

- A、痛觉障碍
- B、温觉障碍
- C、咀嚼肌力减弱
- D、触觉障碍
- E、角膜反射的变化

正确答案：E

5、下颌智齿冠周炎面颊部红肿消退后仍有中度张口受限应考虑

- A、面颊痿

- B、下颌骨边缘性骨髓炎
- C、翼下颌间隙感染
- D、下颌下间隙感染
- E、眶下间隙感染

正确答案：B

6、颧弓骨折的重要临床体征是

- A、咬合错乱
- B、局部塌陷
- C、眶周瘀斑
- D、张口受限
- E、局部肿痛

正确答案：B

7、诊断 OSAS 最可靠的方法是

- A、X 线头影测量
- B、多导睡眠图仪监测
- C、关节造影
- D、B 超检查
- E、肌电图检查

正确答案：B

8、下列哪项不是口腔颌面部损伤的特点

- A、常发生面部畸形
- B、血循环丰富，易发生组织血肿和水肿
- C、易发生窒息
- D、由于污染多，容易感染及组织坏死
- E、易并发颅脑损伤

正确答案：D

9、预防颞下颌关节紊乱病的措施中，错误的是

- A、注意关节保护
- B、避免长时间大张口
- C、保持乐观情绪
- D、多食质硬食物
- E、纠正不良咀嚼习惯

正确答案：D

10、患者，男，24 岁。上唇部肿胀疼痛 3 天，伴发热。检查：体温

38. 5°C，上唇肿胀明显、紫红色，可见多个黄白色脓头。此病可诊断为

- A、上唇皮脂腺囊肿继发感染
- B、上唇脓肿
- C、上唇疔
- D、上唇疖
- E、唇炎

正确答案：D

11、早期以导管炎症为主要表现的是

- A、流行性腮腺炎
- B、舍格伦综合征
- C、慢性复发性腮腺炎
- D、慢性阻塞性腮腺炎
- E、急性化脓性腮腺炎

正确答案：B

12、腭裂术后穿孔或部分裂开，术后至少多长时间可行二期手术

- A、F. 以上都不对
- B、4~5个月
- C、6~12个月
- D、1~2个月
- E、3~4个月

正确答案：C

13、患者女，30岁。右下智齿舌向远中倾斜，牙冠完全萌出，此牙的拔除方法宜采用

- A、冲击法拔除
- B、翻瓣、去骨拔除
- C、用牙挺向远中挺出
- D、用涡轮钻拔除
- E、劈开，分根拔除

正确答案：A

14、下列颌面部间隙中最容易并发骨髓炎的是

- A、颞浅间隙
- B、颊间隙
- C、颞深间隙
- D、下颌下间隙

E、颞下间隙

正确答案：C

15、涎石摘除术的适应证不包括

- A、涎石在导管内，腺体有纤维化者
- B、涎石在腺体内，进食有明显肿胀者
- C、涎石在前部导管腺体未纤维化者
- D、涎石在腺体内，腺体未纤维化者
- E、涎石在导管与腺体交接处

正确答案：C

16、利多卡因的一次注射最大剂量是

- A、800~1000mg
- B、500~600mg
- C、100~150mg
- D、60~100mg
- E、300~400mg

正确答案：E

17、智齿冠周炎常形成瘻道，其常见部位为

- A、第三磨牙颊部皮肤
- B、第二磨牙颊侧牙龈
- C、第二磨牙颊部皮肤
- D、第一磨牙颊侧牙龈
- E、第一磨牙舌侧牙龈

正确答案：D

18、下列诊断方法中不适用于舍格伦综合征的是

- A、询问病史、体检
- B、腮腺活检
- C、唾液流量测定
- D、施墨试验
- E、类风湿因子检查

正确答案：B

19、常用麻醉剂 2% 普鲁卡因液，一次注射量为 2~4ml，不能超过

- A、40ml
- B、50ml
- C、20ml

D、30ml

E、10ml

正确答案：B

20、下列哪一项不是关节外强直的临床特点

A、有颌间瘢痕

B、咬合关系错乱不严重

C、下颌骨角前切迹加深

D、有口腔溃烂史、烧伤以及放射治疗史等

E、X线片见关节部正常

正确答案：C

21、下颌正中颈部双侧颈孔区骨折或粉碎性骨折均可使舌后坠引起呼吸困难，甚至窒息，其原因是

A、舌骨舌肌的牵引

B、颈结节区所附着肌肉的牵引

C、下颌舌骨肌的牵引

D、颈舌肌的牵引

E、二腹肌的牵引

正确答案：D

22、目前最佳的牙种植材料是

A、钛

B、陶瓷

C、玻璃碳

D、不锈钢

E、树脂

正确答案：A

23、患者男性，34岁，左侧颊部、上颈部大型动静脉畸形，肿块表面皮肤不平，呈蚯蚓状，听诊有吹风样杂音，触有搏动感。该患者的最佳治疗方案为

A、栓塞后手术治疗

B、微波热凝治疗

C、冷冻治疗

D、硬化剂注射治疗

E、高能激光治疗

正确答案：A

24、双侧唇裂整复术的最佳时间

- A、2 岁以后
- B、7-12 个月
- C、1-2 个月
- D、1 岁以后
- E、3-6 个月

正确答案：B

25、如果诊断为成釉细胞瘤，则最佳治疗方案为

- A、下颌骨区段切除术
- B、下颌骨区段切除，后期行植骨术
- C、下颌骨区段切除，同期植骨
- D、半侧下颌骨切除术
- E、行肿瘤刮治术

正确答案：C

26、患者男,46 岁。右侧腮腺区无痛性肿大 4 年，近半年起左侧腮腺也明显肿大，两侧面部不对称，并伴口干、不适。在行腮腺扪诊检查时，正确的方法是

- A、示指、中指、环指做平触扪诊
- B、中指、环指做平触扪诊
- C、拇指、环指夹住做提拉式扪诊
- D、拇指、示指夹住做提拉式扪诊
- E、拇指、示指相对触诊扪诊

正确答案：A

27、腮腺造影显示末梢导管点状、球状扩张，排空迟缓的是

- A、急性化脓性腮腺炎
- B、慢性阻塞性腮腺炎
- C、慢性复发性腮腺炎
- D、舍格伦综合征
- E、流行性腮腺炎

正确答案：C

28、对于颌骨发育异常所致的反（牙合）的形成机制中，不包括

- A、真性下颌前突
- B、上、下颌骨发育不足
- C、上颌发育不足

- D、颞部前突
- E、下颌前突，上颌发育不足

正确答案：D

29、采用根尖片分角线投照技术显示被检查牙齿邻面影像重叠的原因

- A、x 线中心线位置不正确
- B、投照垂直角度过小
- C、x 线与被检查牙齿的邻面不垂直
- D、投照垂直角度过大
- E、x 线与被检查牙齿的邻面不平行

正确答案：E

30、边缘性颌骨骨髓炎死骨刮除术应在急性炎症后

- A、2 个月以上
- B、4~ 6 周
- C、半年以上
- D、2~ 4 周
- E、6~ 8 周

正确答案：D

31、关于切开拔除阻生智齿的切口设计，错误的是

- A、应做黏骨膜全层切开，紧贴骨面将瓣翻起
- B、如仅用远中切口就可以消除阻力，可不作颊侧切口
- C、缝合后切口下应有足够骨
- D、远中切口尽量偏舌侧
- E、颊侧切口一般不必超过前庭沟

正确答案：D

32、关于整复手术的技术特点，错误的是

- A、尽量减轻瘢痕
- B、避免锐性剥离
- C、尽量保存组织
- D、应严格无菌操作
- E、尽量减少创伤

正确答案：B

33、咬肌间隙感染肿胀区域主要为

- A、眶下区弥漫性水肿
- B、以下颌角为中心的红肿

- C、张口受限
- D、颌下、口底广泛水肿
- E、颌下三角区的红肿

正确答案：B

34、对三叉神经痛有明显止痛作用的是

- A、阿司匹林
- B、地巴唑
- C、氯丙嗪
- D、酰胺咪嗪
- E、颅痛定

正确答案：D

35、牙槽突裂的植骨时机主要是依据

- A、裂隙宽度大小
- B、单侧还是双侧
- C、患者发育情况
- D、手术侧恒尖牙未萌，牙根形成 2 / 3
- E、正畸治疗基本完成

正确答案：D

36、下列哪一项不属于咀嚼肌紊乱疾病

- A、肌筋膜疼痛
- B、肌纤维变性挛缩
- C、咀嚼肌群痉挛
- D、不能分类的局部肌痛
- E、间隙感染引起翼外肌痉挛

正确答案：E

37、下列哪一项不是阻塞性睡眠呼吸障碍疾病的临床表现

- A、打鼾
- B、晨起头痛
- C、肾功能损害
- D、白天嗜睡
- E、支气管扩张

正确答案：E

38、常用于外科手术前的皮肤、黏膜的消毒剂是

- A、碘伏

B、次氯酸钠

C、戊二醛

D、乙醇

E、合成酚

正确答案：A

39、切开引流的绝对指征：

A、局部肿胀、疼痛

B、脓肿已穿破，但局部仍有疼痛

C、有凹陷性水肿，波动感或穿刺有脓

D、牙源性感染 1 周以后

E、感染早期即应行切开引流术

正确答案：C

40、分布于口轮匝肌的面神经分支是

A、颞支

B、颧支

C、下颌缘支

D、颊支

E、颈支

正确答案：D

41、可见光固化器手柄消毒推荐使用

A、乙醇

B、碘伏

C、戊二醛

D、次氯酸钠

E、合成酚

正确答案：A

42、某患儿，5 岁。先天Ⅲ度腭裂，于全麻下接受腭裂修复术。为使发音和讲话接近正常，术后应

A、正畸矫治错 HE 牙

B、长期配戴腭护板

C、局部理疗

D、调整饮食习惯

E、进行语音训练

正确答案：E

43、边缘性骨髓炎好发于

- A、下颌骨髁状突
- B、上颌骨体部
- C、下颌骨体部
- D、下颌骨升支
- E、下颌骨牙槽突

正确答案：D

44、用牙挺时，挺刃一般插入牙槽嵴的

- A、远中颊侧
- B、近中颊侧
- C、邻牙间
- D、颊侧
- E、舌侧

正确答案：B

45、如果在注射麻药后，拔出注射针时，左颊部随即出现肿胀，最可能的原因是发生了

- A、水肿
- B、过敏
- C、血肿
- D、感染
- E、肌肉痉挛

正确答案：C

46、关于拔牙术中分离牙龈，正确的是

- A、应分离至釉牙骨质交界
- B、分离牙龈的目的是避免牙钳夹伤牙龈
- C、正畸减数时可不用分离牙龈
- D、可减少拔牙时软组织的阻力
- E、乳牙拔除时可不用分离牙龈

正确答案：B

47、填塞止血主要用于

- A、骨断端出血
- B、开放性和洞穿性创口
- C、创口内出血的血管断端
- D、广泛的组织渗血

E、凝血机制障碍者的创面溶血

正确答案：B

48、左下颌第三磨牙冠周炎并发面颊痿的常见位置相当于左下颌

A、第一前磨牙

B、第一磨牙

C、第三磨牙

D、第二磨牙

E、第二前磨牙

正确答案：B

49、某老年患者全口无牙颌进行义齿修复时发现左侧颊系带附着于牙槽嵴顶，影响将来义齿固位。应该采用的治疗措施是

A、颊系带矫正术

B、不做处理，将来通过调磨义齿，进行缓冲

C、牙槽突修整术

D、不做处理，改变修复方法

E、牙槽嵴加高术

正确答案：A

50、牙科用高速手机灭菌应首选

A、浸泡消毒法

B、盐灭菌法

C、玻璃球灭菌法

D、酚类消毒

E、高温蒸汽灭菌法

正确答案：E

51、化脓性颌骨骨髓炎根据临床病理特点，病变始于颌骨骨松质和骨髓者，称

A、放射性骨髓炎

B、婴幼儿上颌骨骨髓炎

C、边缘性骨髓炎

D、中央性骨髓炎

E、根尖周致密性骨炎

正确答案：D

52、普鲁卡因一次最大用量为

A、4，4ms / kg

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/876213234155010055>