

# 血液科实习生出科理论考核试题

## 一、选择题

1. 高热病人药物降温后易出现 ( ) [单选题]。

A. 虚脱或休克症状 ✓

B. 呼吸衰竭症状

C. 口腔溃疡

D. 体温不升

2. 不属于高热持续期的临床表现是 ( ) [单选题]。

A. 颜面潮红

B. 呼吸脉搏加快。

C. 大量出汗 ✓

D. 尿量减少

3. 病人用冰袋进行降温时，冰袋不能放置的部位不包括 ( ) [单选题]。

A. 心前区。

B. 枕后耳廓

C. 腹部

D. 腹股沟 ✓

4. 体温上升期病人,出现寒战、畏寒等情况,我们护理应注意 ( ) [单选题]。

A. 防止低血压休克

B. 保暖 ✓

C、注意患者安全

D、补充营养

5. 当病人体温大于 39 摄氏度时,我们给与应用冰袋,使用时间为 ( ) [单选题]。

A、1 小时

B、2h

C、30 分钟✓

D、直至冰块融化

6. 发热病人,体温上升 ( ) °或下降 2°C时,需要在体温单上画复试符号。( ) [单选题]。

A、1°C

B、1、5°C✓

C、2°C

D、2.5°C

7. 静脉补 K 时,成人每小时速度不宜超过多少 mol/L,每日不应超过多少 g:C ( ) [单选题]。

A.40 5g✓

B.30 5g

C.40 6g

D.30 6g

8. 血钾增高可见于 ( ) [单选题]

A.输入库存血✓

B.呕吐

C.腹泻

D.大量利尿

9. 高钾血症是指血钾超过 ( ) [单选题]。

A.3.5mmol/L

B.4mmol/L

C.4.5mmol/L

D.5.5mmol/L ✓

10. 静脉补钾前,应首先考虑病人的 ( ) [单选题]。

A.血压

B.呼吸

C.尿量 ✓

D.神智

11. 下列药液中不能直接静脉推注的是 D ( ) [单选题]。

A.5%葡萄糖溶液

B.10%葡萄糖溶液

C.5%碳酸氢钠溶液

D.10%氯化钾 ✓

12. 静脉补钾的浓度一般不超过 A ( ) [单选题]。

A.0.3% ✓

B.0.03%

C.3%

D.2%

13. 高钾血症最严重的并发症是 B ( ) [单选题]。

A.室性心动过速

B.心室颤动✓

C.酸中毒

D.低血压休克

14. 采血的注意事项哪项是错误的 ( ) [单选题]。

A、凝血功能障碍、血小板低患者拔针后按压时间延长至 20-30 分钟

B、同时采取不同的血标本,应先将血液注入血培养瓶内

C、采血时,肘部血管不好,可拍打前臂,适当延长结扎止血带的时间至 5 分钟✓

D、严禁在输血输液侧肢体采集血标本

15. 采集血培养抽的时机一般为 ( ) [单选题]。

A、体温上升期

B、高热持续期

C、体温下降期

D、患者出现寒战或者体温 > 38 摄氏度✓

16. 采集血培养时,一套为两瓶:需氧瓶和厌氧瓶,成年人每瓶采集 ( ) ml 血液。( ) [单选题]。

A.5-8

B. 8-10✓

C. 10-12

D. 3-5

17. 凝血测定取真空采血管的:( ) [单选题]。

A、蓝色✓

B、红色

C、紫色

D、黑色

18. 治疗再生障碍性贫血时下列哪项不妥 ( ) [单选题]。

A. 部分病人可做脾切除

B. 注射丙酸睾酮

C. 输新鲜血

D. 感染时用氯霉素 ✓

E. 骨髓移植

19. 急性白血病病人容易发生感染，主要原因是 ( ) [单选题]。

A. 成熟粒细胞缺乏 ✓

B. 白细胞增多

C. 继发性营养不良

D. 长期贫血导致机体抵抗力下降

20. 急性白血病病人缓解期出现中枢神经系统白血病的主要原因是 ( ) [单选题]。

A. 免疫功能低下

B. 多数化疗药不能通过血脑屏障 ✓

C. 疗程不够

D. 化疗药剂量不足

E. 对化疗药产生耐药性

21. 在护理粒细胞缺乏症病人时，最重要的护理目的是防止病人 ( ) [单选题]。

A. 出血

B. 跌倒

C. 感染 ✓

D.发热

22. 护理化疗的病人，下列哪项不妥（ ）[单选题]。

A. 药液必须新鲜配制

B.注射时不可溢于血管外

C.注射速度不宜快

D.应饭后 1 小时用药✓

E.用药期间定期检查血象

23. 血小板低患者突然出现头痛、呕吐、视物模糊等症状，常提示可能发生了 D（ ）[单选题]。

A. 败血症

B. 脑膜炎

C. 脑炎

D.颅内出血✓

24. 容易引起出血性膀胱炎而导致血尿的化疗药物是（ ）[单选题]。

A. 甲胺碟吟

B. 长春新碱

C. 环磷酰胺✓

D.阿糖胞苷

25. 护士夜间巡视病区，发现某 M3 型急性白血病患者突然出现烦躁不安、呕吐、颈项强直， 护士应立即采取的应对措施不包括（ ）[单选题]。

A.予以吸氧

B.绝对安静平卧位✓

C.通知医生

D.建立静脉通道

26. 血小板低的患者需注意不包括 ( ) [单选题]。

A 血小板小于  $50 \times 10^9$  时，绝对卧床休息✓

B、病人宜食高维生素易消化的软食或半流质，禁食过硬粗糙食物

C、保持大便通畅，排便时不可用力

D、指导病人勿用力擤鼻，勿用力揉眼

27. 下列哪项不是急性白血病的临床表现 ( ) [单选题]。

A、血糖降低✓

B、发热

C、出血

D、贫血

E、器官浸润

28. 关于铁的吸收，哪项错误 ( ) [单选题]。

A、低价铁比高价好

B、与维生素

C 同时服用比较好

D、与牛奶同服比较好✓

29. 服用时，应避免与牙齿接触的药物是 ( ) [单选题]。

A、止咳糖浆

B、硫酸亚铁✓

C、碳酸氢钠片

D、羟基脲片

30. 女,32岁,两年来月经量多,乏力,心悸。检查面色较苍白,血红蛋白 70g/L,白细胞  $8 \times 10^9/L$ ,血小板  $110 \times 10^9/L$ ,血清铁 300ug/L,治疗首选 ( ) [单选题]。

- A. 输血
- B. 硫酸亚铁口服 ✓
- C. 维生素 B12 肌肉注射
- D. 右旋糖酐铁肌注
- E. 肾上腺糖皮质激素

31. 下列哪一项不符合多发性骨髓瘤的是: ( ) [单选题]。

- A. 高钙血症
- B. 高粘滞血症
- C. 高尿酸血症
- D. 高白蛋白血症 ✓
- E. 肾功能衰竭

32. 特发性血小板减少性紫癜的发病因素目前认为大多数与下列哪种因素有关 ( ) [单选题]。

- A. 脾亢
- B. 自身免疫反应 ✓
- C. 化学及物理因素
- D. 病毒感染
- E. 血小板功能异常

33. 孕妇最易发生那种贫血 ( ) [单选题]。

- A. 恶性贫血
- B. 缺铁性贫血、 ✓



C、再生性障碍性贫血

D、溶血性贫血

34. 再生性障碍性贫血应选用 ( ) [单选题]。

A、铁剂

B、叶酸、

C、丙酸睾酮✓

D、维生素 B6

35. 按照血红蛋白浓度分,中度贫血 ( ) [单选题]。

A、 >90g/L

B.60 - 90g/L✓

C.30 - 59g/L

D. < 30g/L

36. 大细胞性贫血常见于 ( ) [单选题]。

A、巨幼细胞性贫血✓

B、再生性障碍性贫血

C、缺铁性贫血

D、溶血性贫血

37. 妇女儿童缺铁性贫血的主要原因是 ( ) [单选题]。

A、铁摄入不足✓

B、铁吸收不良

C. 铁丢失过多

D. 幽门螺杆菌感染

38. 治疗再障的一线药物是 ( ) [单选题]。

A.糖皮质激素

B. 环孢素✓

C. 雄激素

D. 环磷酰胺

39. 急性白血病和慢性白血病的主要区别是 ( ) [单选题]。

A.肝脾是否增大

B.感染严重程度

C.白血病细胞成熟程度✓

D.贫血严重程度

E.出血严重程度

40. 根据病人的血红蛋白浓度,贫血的诊断标准是 B ( ) [单选题]。

A.Hb < 150g/L

B.男性 Hb < 120g/L,女性 Hb < 110g/L✓

C.Hb

D.Hb

E.Hb

41. 特发性血小板减少性紫癜患者应避免使用下列哪种药物 ( ) [单选题]。

A.泼尼松

B.阿司匹林✓

C.红霉素

D.双嘧达莫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/887033065166006036>