

# 2023 年主治医师之全科医学 301 模拟考试试卷 A 卷 含答案

单选题（共 40 题）

1、下述不属于中医药“正治法”的是

- A. 实者泻之
- B. 寒者热之
- C. 虚者补之
- D. 标本兼治
- E. 热者寒之

【答案】 D

2、细支气管充气征，该肺癌 CT 征象的病理基础是

- A. 瘤细胞浸润及间质反应
- B. 肿瘤内残存正常含气肺组织
- C. 肿瘤瘢痕收缩
- D. 瘤内含气、扩张的细支气管
- E. 肿瘤钙化或包埋原有钙化灶所致

【答案】 D

3、可首选治疗急、慢性金葡菌性骨髓炎的药物是

- A. 链霉素
- B. 氯霉素
- C. 克林霉素
- D. 红霉素

E. 四环素

【答案】 C

4、最容易发生广泛出血的急性白血病是

A. 急性粒细胞白血病微分化型

B. 急性粒细胞白血病未分化型

C. 急性粒细胞白血病部分分化型

D. 急性早幼粒细胞白血病

E. 急性淋巴细胞白血病

【答案】 D

5、中枢型 SAHS

A. PSG 检查睡眠时，口鼻气流停止时，记录不到膈肌和胸壁肌活动

B. PSG 检查睡眠时，口鼻气流停止时，膈肌和胸壁肌活动明显

C. PSG 检查睡眠时，最低血氧低于 80%

D. PSG 检查睡眠时，RD124，血氧 89%

E. PSG 检查睡眠时，RD1 > 20，血氧 > 90%

【答案】 A

6、急性中毒患者需导泻治疗时以下哪项不正确

A. 患者有肾功能不全

B. 常用盐类泻药

C. 患者有呼吸抑制

D. 患者昏迷

E. 有机磷农药中毒晚期患者

【答案】 B

7、1986年首届健康教育促进大会通过的宣言奠定了健康促进的理论基础，该宣言是

A. 雅加达宣言

B. 渥太华宣言

C. 曼谷宣言

D. 阿德莱德宣言

E. 宋兹瓦尔宣言

【答案】 B

8、过敏性鼻炎典型的临床表现是

A. 单侧鼻塞，涕血伴鼻腔异味

B. 鼻痒、打喷嚏，流清涕

C. 鼻塞，头痛、流脓涕

D. 会吸涕血

E. 鼻塞、流涕

【答案】 B

9、加强腹股沟管前壁的疝修补术有

A. McVay 法

B. Bassini 法

C. Halsted 法

D. Ferguson 法

E. 疝囊高位结扎法

【答案】 D

10、患者男性，50岁。因旅游途中进食海鲜后1天出现右足趾及跖趾关节剧烈疼痛，伴红肿，有发热。既往发作过两次，每次发作一周左右可自行缓解，曾用过青霉素治疗效果不明显。查体：痛苦面容，呻吟。体温39.2℃，右足趾及跖趾关节红肿、压痛，局部皮温增高。血白细胞 $11.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞0.88，血尿酸 $630 \mu mol / L$ 。

A. 双氢克尿噻

B. 秋水仙碱

C. 丙磺舒

D. 别嘌醇

E. 苯溴马隆

F. 布洛芬

【答案】 B

11、消化性溃疡最常见的并发症是

A. 出血

B. 癌变

C. 梗阻

D. 穿孔

E. 电解质紊乱

【答案】 A

12、禁用于肾衰竭患者的抗菌药物是

- A. 青霉素 G
- B. 阿莫西林
- C. 头孢曲松
- D. 阿米卡星
- E. 阿奇霉素

【答案】 D

13、甲、乙两地女性宫颈癌标化死亡率相同，甲地死亡率高于乙地死亡率，由此可知

- A. 甲、乙两地人口的年龄分布相同
- B. 乙地人口较甲地年轻
- C. 甲地人口较乙地年轻
- D. 甲地诊断水平高于乙地
- E. 地诊断水平高于甲地

【答案】 B

14、婴儿 4 天，于生后第 2 天出现黄疸，体查：皮肤黄染，精神好，哭声大，血清胆红素  $150 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，该患儿可诊断为

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿肝炎
- D. 新生儿溶血症
- E. 新生儿胆道闭锁

【答案】 A

15、某医院儿科收治了一名高热患儿，经医生初诊“发热待查，脑炎可能”。急诊值班护士凭多年经验，对患儿仔细观察，发现精神越来越差，末梢循环不良，但患儿颈部不强直。于是，护士又详细询问家长，怀疑是中毒性菌痢。经肛门指诊大便化验，证实为菌痢，值班护士便及时报告医生，经医护密切配合抢救，患儿得救。

- A. 敬业负责，精益求精
- B. 关心病人，体贴入微
- C. 作风严谨，准确无误
- D. 平等待人，尊重病人
- E. 举止端庄，言语文明

【答案】 A

16、青年男性，家人诉其近2年来逐渐变得少语少动，不与人交往，孤僻离群，对亲人冷淡，不讲究个人卫生，患者自诉自己没有情感体验，脑子空空。

- A. 抑郁症
- B. 精神分裂症
- C. 神经症
- D. 偏执性精神病
- E. 人格障碍

【答案】 B

17、下列关于 Her-2/neu 阳性乳腺癌患者的说法中错误的是

- A. 预后较差
- B. 应用 TAM
- C. 对 CMF 方案耐药

- D. 应用含蒽环类或紫杉类联合化疗
- E. 治疗中加入曲妥珠单抗可降低死亡率

【答案】 B

18、患儿9个月，呕吐，腹泻两天入院，发病初伴发热，咳嗽，呕吐2~3次/日，腹泻7~8次/日，水样便，大便镜检少量脂肪球，尿量不少，口渴，略见消瘦，入院时体温37℃，双眼窝、前囟稍下凹，皮肤弹性尚好，四肢温暖

- A. 大量静脉用抗生素
- B. 口服大量抗生素
- C. 口服补液及治疗上感
- D. 静脉滴注葡萄糖
- E. 只需给助消化药

【答案】 C

19、患者，男性，48岁。因皮肤黄染、食欲不振、恶心10天，意识模糊、烦躁不安1天由急诊入院。有乙肝病史8年。查体：BP110/70mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染；颈部可见数枚蜘蛛痣；心肺未见异常；腹软，肝肋下未触及，脾肋下3cm；上肢穿刺部位有淤血斑。化验：Hb90g/L，WBC $3.2 \times 10^9$

- A. 肝硬化，并发肝性脑病
- B. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 脑血管病
- E. 尿毒症

【答案】 A

20、一男性患者，28岁，农民，10月30日高热，头痛、腰痛、眼眶痛，呕吐，腹泻。连续发热4天，鼻出血1次，用“扑热息痛”后热退，但出现头晕、尿少。血象：白细胞数  $18 \times 10^9$

- A. 肾盂肾炎
- B. 急性胃肠炎
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 流行性出血热
- E. 败血症

【答案】 D

21、关于溃疡性结肠炎的叙述中，不正确的是

- A. 里急后重，常有黏液，脓血样便
- B. 有发热症状，右下腹或脐周疼痛较重
- C. 可有中毒性巨结肠
- D. 黏膜脆性增加，触之易出血
- E. 常见炎性息肉

【答案】 B

22、有一青年患者，大腿有一感染伤口，为防止气性坏疽，应该采取的最重要措施是

- A. 应用抗生素
- B. 对伤口进行充分的清创处理
- C. 截肢
- D. 反复输血
- E. 吸氧

【答案】 B

23、发病率适用于

- A. 某病的隐性感染
- B. 疾病的长期流行
- C. 易于确切指出发病时间的急性病
- D. 慢性病
- E. 以上都不对

【答案】 C

24、有关急性糜烂性胃炎的临床表现不正确的是

- A. 往往以上消化道出血为主要表现
- B. 出血量大，常难以自止
- C. 起病前可无明显不适
- D. 消化不良的症状常为原发病掩盖
- E. 大多数患者可找到病因

【答案】 B

25、患者，男，31岁，双足跖无诱因反复起小脓疱1年，左足跖骨间关节红肿、疼痛半年，病情呈周期性发作，且关节症状与皮肤轻重程度平行。血常规、尿常规、尿道分泌物培养均无异常，类风湿因子阴性。X线检查：软骨消失、骨质疏松、关节腔狭窄伴有不同程度的关节侵蚀和软组织肿胀。此患者的诊断为

- A. 类风湿关节炎
- B. 红斑狼疮

- C. 风湿热
- D. 银屑病关节病型
- E. 下肢静脉炎

【答案】 D

26、知识对行为的发生和保持的作用是

- A. 必要的因素，但不是决定性因素
- B. 有作用，但不一定需要
- C. 不是必要的因素
- D. 决定性因素，因为知识的增加可以使行为发生改变
- E. 知识增加，健康行为必定增加

【答案】 A

27、特发性肺纤维化胸部 X 线特征是

- A. 两中下肺大小均匀一致，境界清晰的粟粒状阴影
- B. 两中下肺弥漫性网状结节阴影、肺门阴影增大
- C. 两中下肺纹理增强、紊乱
- D. 两中下肺野弥漫性网状或结节状阴影，可出现蜂窝肺，肺体积缩小
- E. 两中下肺斑片状以至融合成大片状浸润阴影

【答案】 D

28、患者男性，30岁，近日感脑内大量涌现无现实意义的问题而工作效率明显下降。

- A. 强迫性思维

- B. 焦虑体验
- C. 思维奔逸
- D. 意志活动增强
- E. 强制性思维

【答案】 A

29、25岁患者，右侧肱骨中、下1/3交界处骨折，复位固定后发现垂腕畸形，最有可能的原因是

- A. 正中神经损伤
- B. 尺神经损伤
- C. 桡神经损伤
- D. 臂丛神经损伤
- E. 肱桡肌肌腱损伤

【答案】 C

30、感染后0~4小时内，发挥吞噬杀菌作用的细胞是

- A. 巨噬细胞
- B. B1细胞
- C. 中性粒细胞
- D. NK细胞
- E. T细胞

【答案】 C

31、患者，男，27岁。装修工人。因乏力伴双下肢反复瘀点1年就诊。体格检查：重度贫血貌，双下肢可见散在瘀点，全身可见散在出血点，浅表淋巴结不

肿大，胸骨无压痛，肝脾未触及。血象：Hb65g / L，WBC $3.0 \times 10^9$  / L，中性粒细胞 0.3，淋巴细胞 0.7，血小板  $22 \times 10^9$  / L，网织红细胞 0.003。

- A. 非重型再障
- B. 重型再障
- C. 急性粒细胞缺乏症
- D. 急性早幼粒细胞白血病
- E. 败血症合并 DIC

【答案】 A

32、冰片入丸散剂的一般用量是

- A. 0.3~0.5g
- B. 0.1~0.5g
- C. 0.03~0.1g
- D. 0.3~1g
- E. 0.06~0.1g

【答案】 C

33、住院农村患者，36岁，婚后8年不孕，月经周期缩短，经期延长多年，近两年加重，近一个月阴道流血不止，量多，食欲不振，心悸，无力，尿频，无尿痛。妇科检查：宫颈正常大小，光滑，宫体前倾如新生儿头大，前壁突出，较硬双附件区正常，门诊以“盆腔包块”收入院，血红蛋白 50g/L。

- A. 子宫肌瘤摘除术
- B. 子宫次全切除术
- C. 子宫全切加双侧切除术
- D. 子宫次全切加双附件切除术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/887160030053006043>