

80.风湿病

一、A1型题：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 关于风湿热的说法错误的是

A. 要防止上呼吸道感染

B. 首选青霉素治疗急性链球菌感染

C. 已有心脏炎的病人，风湿热复发率最高

D. 儿童随诊预防至 18 岁，成人不短于 5 年

E. 风湿性心脏病合并主动脉瓣病变者预后较好

正确答案:E

2. 在诊断风湿热中，你认为下列哪项不正确

A. 抗链 O 不是诊断风湿热的惟一指征

B. 血沉升高及 CRP 阳性在其他风湿性疾病中也可见到

C. 有两项主要表现就可诊断为风湿热

D. 风湿热是青少年易患的疾病，超过发病年龄，发病率则明显下降

E . 目前由于医疗条件的改善 , 风湿性心脏瓣膜病已较少见到

正确答案:C

3 . 风湿热与下列哪种病原菌有关

A . B 组乙型溶血性链球菌

B . 草绿色链球菌

C . 乙组 A 型溶血型链球菌

D . 金黄色葡萄球菌

E . A 组乙型溶血性链球

正确答案:E

4 . 关于晨僵 , 最正确的说法是

A . 仅见于类风湿关节炎

B . 见于大多数类风湿关节炎

C . 见于大多数类风湿关节炎 , 也见于其他疾病

D . 见于少数类风湿关节炎

E . 仅见于类风湿关节炎晚期

正确答案:C

5 . 下列治疗类风湿关节炎的药物中不良反应会出现皮疹的是

A . D-青霉胺

B . 阿司匹林

C . 金制剂

D . 消炎痛

E . 氯喹

正确答案:C

6 . 类风湿关节炎的发病因素 , 下列哪种说法正确

A . 已证实有直接感染因子 , 如病毒、支原体、细菌

B . 感染因子通过某些途径影响类风湿关节炎进展

C . 类风湿关节炎是个遗传性疾病

D . 类风湿关节炎与遗传无关

E . 类风湿关节炎无遗传易感性基础

正确答案:B

7 . 类风湿关节炎的转诊原则错误的是

A . 需手术治疗者

B . 诊断不清者

C . 需用慢作用抗风湿药、肾上腺皮质激素治疗者

D . 有关节外临床表现需进一步检查治疗者

E . 需与痛风性关节炎鉴别者

正确答案:E

8 . 关于风湿热治疗应用抗生素的说法错误的是

A . 目的是消除链球菌感染

B . 可减少瓣膜病的发生

C . 首选青霉素

D . 疗程 10 ~ 14 天

E . 疗程结束后用长效剂预防咽部感染

正确答案:B

9 . 一个类风湿关节炎病人 , 就诊时诉右肘关节伸侧长了一个蚕豆大小的结节约 4 个月时间 , 医生检查完后告诉她 , 这个结节说明

A . 病情活动已持续 4 个月

B . 病情目前并不活动

C . 曾有病情活动

D . 曾有病情活动 , 目前是否活动应依据其他表现来判断

E . 目前有病情活动

正确答案:D

10 . 下列哪种药物不属治疗类风湿关节炎的慢作用抗风湿药

A . 金合剂

B . 氯喹

C . 青霉胺

D. 氢氧化铝

E. 甲氨蝶呤

正确答案:D

11. 明确诊断的类风湿关节炎后, 新近出现类风湿结节, 临床意义是

A. 类风湿关节炎已诊断明确

B. 进一步证实诊断正确

C. 需要除外其他疾病, 如系统性红斑狼疮

D. 说明类风湿关节炎病情活动

E. 需活检才能确定

正确答案:D

12. 关于类风湿关节炎的发病机制, 下列哪种说法正确

A. 并无抗原参与

B. 只有体液免疫异常

C. 只有细胞免疫异常

D．抗原激起免疫反应，免疫反应引起炎症

E．细胞凋亡正常

正确答案:D

13．类风湿关节炎病人，查体时发现巩膜上出现了蓝色斑块，这说明

A．没有什么问题

B．不需治疗

C．应去眼科看病

D．与类风湿关节炎无关

E．与类风湿关节炎有关，应积极治疗

正确答案:E

14．男，48岁，患类风湿关节炎10年，双髌、膝关节严重屈曲畸形，四肢肌萎缩，不能行走，四肢关节无肿胀，个别关节有疼痛。ESR：10mm/小时，血尿常规均无异常，该病人的治疗应是

A．转诊，外科手术治疗

B．青霉胺

C . 非甾体类消炎镇痛药

D . MTX+ 氯喹

E . SASP

正确答案:A

15 . 在风湿热的发病机制中下列哪项是不正确的

A . 为感染后的变态反应和自身免疫反应

B . 细菌的抗体与人的心脏等组织发生交叉反应 , 导致 I 型变态反应

C . 细菌成分及代谢物与相应抗体作用形成免疫复合物沉积于关节、心脏等

D . 患者可出现抗心肌抗体

E . 以上都不正确

正确答案:B

16 . 下列哪项不能作为判断类风湿关节炎病活动的指标

A . 晨僵

B . 肿胀关节的个数

C . 关节畸形的个数

D . 血沉

E . 类风湿因子滴度

正确答案:C

17 . 风湿热出现关节炎的首选药物是

A . 青霉素

B . 苄星青霉素

C . 氢氧化铝

D . 阿司匹林

E . 泼尼松

正确答案:D

18 . 双手近侧指间关节的关节炎，发现肘部皮下结节，临床意义是

A . 类风湿关节炎诊断明确

B . 不一定是类风湿关节炎

C . 是类风湿关节炎关节炎的可能性大 , 要除外系统性红斑狼疮

D . 要活检才能确定

E . 要化验 ESR 和 CRP

正确答案:C

19 . 风湿热关节炎的典型表现是

A . 局部红肿

B . 局部发热

C . 游走性多关节炎

D . 功能障碍

E . 关节畸形

正确答案:C

20 . 风湿热的次要临床表现是

A . 舞蹈症

B . 发热

C . 皮下结节

D . 心脏炎

E . 关节炎

正确答案:B

21 . 风湿热的发病年龄多见于

A . 5 ~ 15 岁

B . 3 ~ 18 岁

C . 4 ~ 16 岁

D . 1 ~ 15 岁

E . 2 ~ 14 岁

正确答案:A

22 . 哪项是类风湿关节炎的最主要临床特点

A . 有晨僵

B . 类风湿因子阳性

C . 有关节肿

D . 有关节畸形

E . 以小关节为主的、对称的、反复发作的关节炎

正确答案:E

23 . 系统性红斑狼疮与风湿热相鉴别的要点是

A . 发热

B . 关节炎

C . 蝶形红斑

D . 心脏病

E . 血沉加快

正确答案:C

24 . 类风湿关节炎的主要表现是

A . 晨僵

B . 类风湿结节

C . 关节肿

D . 对称性多关节炎

E . 手 X 线改变

正确答案:D

25 . 下列哪项不是类风湿关节炎的临床特征

A . 掌指关节肿

B . 腕关节肿

C . 对称性关节肿

D . 近端指间关节肿

E . 远端指间关节肿

正确答案:E

26 . 下列哪项与类风湿关节炎病情活动有关

A . 晨僵

B . 关节畸形

C . 关节功能障碍

D . 颈部受累

E . X 线片有骨质破坏

正确答案:A

27 . 女 , 20 岁 , 下腰背痛 3 个月 , 两踝关节肿痛 2 个月。ESR : 50mm/小时 , C LIP : 8mS/L , RF(-) , WBC : $8 \times 10^9/L$, Hb : 120g/L , 尿常规(-)。双侧 4 字实验(+) , HLAB27(+). 该患者最可能的诊断是

A . 骨关节炎

B . 风湿性关节炎

C . 类风湿关节炎

D . 强直性脊柱炎

E . 系统性红斑狼疮

正确答案:D

28 . 男 , 38 岁 , 四肢多关节肿疼 13 年 , X 线示双手指关节、腕关节有多处骨质破坏 , 脾肋下 2cm 可触及 , 质略硬。WBC : $3 \times 10^9/L$, 血小板 : $65 \times 10^9/L$, E SR : 56mm/小时 , RF(-) , 10 年来一直服用非甾体类消炎镇痛药。该患者最可能的诊断是

- A . 药物性再障
- B . 类风湿综合征
- C . 风湿性关节炎
- D . Felty 综合征
- E . 白血病

正确答案:D

29 . 下列概念除了哪项都是错误的

- A . 风湿病与风湿热是同一个病
- B . 风湿热也叫风湿性关节炎
- C . 风湿热与风湿没有区别
- D . 风湿热的病因同其他结缔组织病的病因一样是不清楚的
- E . 风湿热是累及多系统的炎症性疾病

正确答案:E

30 . 哪项是风湿热心脏炎的特点

- A . 年龄越小者 , 预后越好
- B . 小儿心脏炎的发病率为 20% ~ 40%
- C . 可同时侵犯心肌、心内膜及心包膜
- D . 以心包炎病变者为多见
- E . 心内膜炎一次受累则可造成瓣膜变形

正确答案:C

31 . 风湿热最重要的临床表现是

- A . 心脏炎
- B . 关节炎
- C . 舞蹈症
- D . 环形红斑
- E . 皮下结节

正确答案:A

32 . 非甾体类消炎药的作用机制是

A . 抑制前列腺素的产生

B . 抑制中性粒细胞

C . 抑制 B 细胞

D . 抑制 T 细胞

E . 抑制 NK 细胞

正确答案:A

33 . 下列除了哪项之外都是风湿热的关节表现特点

A . 主要累及大关节

B . 以对称性关节炎表现为主

C . 关节痛比关节肿更多见

D . 关节炎治愈后不会出现畸形

E . 关节局部可表现为红、肿、热、痛

正确答案:B

34 . 类风湿因子是一种

- A . 抗体
- B . 抗原
- C . 炎症介质
- D . 淋巴因子
- E . 变异细胞

正确答案:A

35 . 类风湿关节炎的关节病理特征是

- A . 类风湿结节
- B . 骨性关节炎
- C . 滑膜炎
- D . 灶性淋巴细胞浸润
- E . 痛风结节

正确答案:C

36 . 下列除哪项外 , 均为慢作用抗风湿药

A . 抗疟药

B . 甲氨蝶呤

C . 环磷酰胺

D . 环孢素

E . 萘普生

正确答案:E

二、A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(1 ~ 3 题共用题干)

女，48 岁，双手近端指间关节肿痛半年，晨僵 0.5 小时，ESR：50mm/小时，X 线示双手指间关节软组织肿胀和关节两端骨质疏松。

1 . 此时类风湿关节炎应定为哪一期

A . I 期

B . II 期

C . III 期

D . IV期

E . V 期

2 . 下列治疗方案哪项最佳

A . 首先使用非甾体类消炎镇痛药半年无效加用慢作用抗风湿药

B . 早期大量激素控制炎症

C . 在应用非甾体类消炎药同时早期应用慢作用抗风湿药

D . 有关节畸形者加用慢作用抗风湿药

E . 首先应用理疗和中草药治疗

3 . 该病人若能坚持治疗 , 除了哪一种预后均属可能

A . 能缓解

B . 能好转

C . 大部分能控制

D . 关节活动能控制

E . 能根治

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897114165024006042>