

## 2023 年重庆主治医师(外科)考试真题卷(8)

本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。

一、单项选择题（共 50 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 尿中脱落细胞学检查，应取（）。

- A. 任何时间的尿均可
- B. 24 小时尿
- C. 12 小时尿
- D. 晨起第一次尿
- E. 晨起第二次尿

2. 男，72 岁。排尿困难 2 年，有终末排尿痛，1 月前因尿潴留，留置导尿 7 天，拔除尿管后仍排尿困难。肛诊前列腺 I° 增生；B 超可见中叶向膀胱内突出 4cm 左右，膀胱内有结石 3cm，双肾无积水，心肝功好，其最佳治疗（）。

- A. 耻骨后膀胱外前列腺切除术
- B. 经膀胱前列腺切除术

- C. 膀胱造瘘
- D. 前列腺尿道支架网置入
- E. 留置导尿管

3. 病理改变主要在肾脏，但临床表现主要在膀胱的疾病是（）。

- A. 肾结石
- B. 肾结核
- C. 肾肿瘤
- D. 肾积水
- E. 多囊肾

4. 男，35岁，查体发现阴囊有一肿块，质地坚硬，托起和掂量有沉重感，透光试验阴性，诊断为（）。

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 附睾炎
- C. 精液囊肿
- D. 睾丸肿瘤
- E. 完全性腹股沟斜疝

5. 男，40岁。左肾切除术2年，抗结核治疗后，尿频25次/天，现恶心呕吐，B超见右肾积水，行右肾穿刺造影，可见上段输尿管狭窄，尿常规：正常，血Cr620 $\mu$ mol/L，该患者适合于哪样治疗？（）

- A. 结肠膀胱扩大术
- B. 输尿管狭窄切除对端吻合术
- C. 输尿管皮肤造口术
- D. 肾造口术
- E. 输尿管膀胱吻合术

6. 男，42岁。被车撞伤致骨盆骨折，不能排尿一天。查：抬入病室，BP：70/50mmHg，P：120次/分，该患者入院后紧急治疗最好方法？（）

- A. 尿道会师术
- B. 膀胱造瘘术
- C. 抗休克治疗后膀胱造瘘术
- D. 止痛止血镇静消炎
- E. 尿道缝合术

7. 女性，24岁，突然发热，一天后出现肉眼血尿，无尿频尿痛，化验尿常规蛋白(+)，红细胞30~40个/HP，白细胞10~20个/HP。应考虑应用何种检查诊断？（）

- A. 尿细菌培养
- B. 血常规检查
- C. 尿蛋白定性

D. 膀胱镜

E. 肾盂造影

8. 男，42岁。右腰痛5年，查B超：右肾积水中度；腹部平片可见右中段输尿管结石1.2cm，肾盂静脉造影，左肾显示正常，右肾盏显示扩张，肾盂未显示，行右肾穿刺造影右肾中度积水，输尿管上段扩张2cm，结石下输尿管有狭窄，该患最好治疗方法是（）。

A. 右肾盂造瘘

B. 经输尿管镜取石

C. 右输尿管切开取石，输尿管成形

D. 右肾切除术

E. 继续中西药排石

9. 膀胱肿瘤的T2期是指（）。

A. 乳头状无浸润

B. 局限于固有层内

C. 肿瘤浸润肌层深度小于1/2

D. 肿瘤浸润肌层深度大于1/2

E. 已有局部淋巴结转移

10. 男，75岁。进行性排尿困难6个月，直肠指诊发现前列腺右侧有2cm×2cm硬结，一周后行PSA检查为120ng/ml，

核素全身骨扫描示骨盆及腰椎系统放射性浓聚区，诊断为前列腺癌骨转移，此患现最适宜的治疗是（）。

- A. 根治性前列腺切除+放射治疗
- B. 根治性前列腺切除+化疗
- C. 根治性前列腺切除+盆腔淋巴结清扫
- D. 前列腺切除+综合治疗
- E. 双睾丸切除+抗雄性激素药物+放射治疗

11. 男，28岁。左阴囊内肿块半年，时有挤压痛，无热，不影响活动，查：左阴囊肿大，触之睾丸上部有一鹅卵大小囊性肿块，牵拉睾丸可随之活动，挤压不变小，睾丸可触之正常大小，透光试验阳性，应诊断（）。

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 精索鞘膜积液
- C. 交通性鞘膜积液
- D. 左斜疝
- E. 精液囊肿

12. 女，22岁。尿频尿急2年，有米汤样尿和终末血尿。尿检：脓细胞（+++），红细胞（+）。尿细菌培养阴性，IVU：左肾未显影，左肾区可见斑片状高密度阴影，右肾盂肾盏显示光滑，有轻度积水，诊断应为（）。

- A. 左肾结核
- B. 右肾结核
- C. 双肾结核
- D. 左输尿管结石肾积水
- E. 左肾癌

13. 烧伤休克最主要的原因 ( )。

- A. 烧伤组织的渗透压增高，加重组织水肿
- B. 细胞膜功能受损，细胞外液进入细胞内
- C. 毛细血管通透性增加，循环液渗出至细胞间质
- D. 伤后低蛋白血症，循环内液体渗出至组织间隙内
- E. 烧伤创面大量渗液

14. 关于烧伤焦痂切开减张，正确的是 ( )。

- A. 只要确定为环形深度烧伤，应该尽早切开减张，愈早愈好
- B. 非环匝形创面，无需行焦痂切开减张
- C. 烧伤焦痂切开减张，切口范围和切口深度在焦痂范围内进行，以免造成新的损伤
- D. 手术必须在良好的麻(zui)下进行
- E. 只要不出现血管、神经压迫症状，尽管为环形深度烧伤，

也不用行焦痂切开减张

15. 关于肠道喂养，正确的是（）。

- A. 休克期就开始给病人进行肠道喂养
- B. 在休克期过后
- C. 在烧伤后机体代谢亢进期
- D. 休克期即补充足量高营养膳食
- E. 休克期补充高张葡萄糖

16. 关于烧伤休克期血压变化（）。

- A. 休克早期，收缩压先升高
- B. 休克早期，舒张压先降低
- C. 休克早期，收缩压先降低
- D. 休克早期，舒张压先升高
- E. 休克早期，舒张压和收缩压同时降低

17. 关于烧伤创面脓毒症，错误的是（）。

- A. 由于创面感染的细菌及其毒素所诱发
- B. 痂下组织中细菌数量一般超过  $10^5$ cfu/g
- C. 创面感染向邻近正常组织或深部未烧伤组织侵袭
- D. 血培养多为阴性
- E. 全身症状无

18. 生石灰烧伤后，最佳的现场处理方法为（）。

- A. 大量清水冲洗
- B. 先去除残留石灰，再大量清水冲洗
- C. 大量酸性溶液中和
- D. 立即包扎，后送医院
- E. 到专科医院就诊

19. 烧伤合并吸入性损伤病因不包括（）。

- A. 热力损伤
- B. 吸入干热空气大都比湿热空气造成的吸入性损伤更严重
- C. 烟雾损伤
- D. 毒性颗粒
- E. 腐蚀性气体或液体

20. 随意形皮瓣的最适长宽比例为（）。

- A. 1:1
- B. 1.5:1
- C. 2:1
- D. 2.5:1
- E. 3:1

21. 阴茎再造是一项复杂的外科手术，其中最关键的难题是



( )。

- A. 支撑组织选择和植入
- B. 阴茎体形成
- C. 尿道形成
- D. 血供
- E. 阴茎缺损带来的精神创伤

22. 隆鼻术时假体过长或过厚，常引起的并发症有 ( )。

- A. 感染
- B. 驼峰鼻
- C. 穿破皮肤或粘膜
- D. 鼻部光照阴影
- E. 鼻假体漂浮感

23. 有恶变的小腿慢性溃疡最好采用以下哪种治疗方法？ ( )

- A. 保守治疗
- B. 局部坏死组织切除
- C. 游离植皮
- D. 比目鱼肌肌瓣移植加游离植皮
- E. 背阔肌肌皮瓣修复加延期植皮

24. 神经修复一定要在无张力条件下缝合，如缺损超过多少，

则改变关节位置（如用屈曲位）以克服张力？（）

- A. 超过 5%
- B. 超过 6%
- C. 超过 7%
- D. 超过 8%
- E. 超过 9%

25. 如肘关节有挛缩畸形时，术中彻底切除瘢痕组织充分松懈仍不能使肘关节伸直时，以下处理中哪项是错误的？（）

- A. 可在尺、桡骨下端横穿一克氏针作骨牵引
- B. 切不可用暴力伸直肘关节，以免损伤血管神经
- C. 形成的创面可用凡士林纱布与疏松的湿纱布包扎
- D. 骨牵引最初可用 1~2kg 重量，48 小时后逐渐加至 3~5kg 重量
- E. 牵引 3~4 周后肘关节即可伸直，此时再行中厚游离植皮

26. 关于眶距增宽症，下列说法错误的是（）。

- A. 面裂可造成眶距增宽
- B. 最佳手术时机是 5~6 岁
- C. 手术不当可造成颅内高压
- D. 术后要重视眼、鼻、口腔的护理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/907162151003006101>