

外科 1

考试时间：100 分钟

总分：0 分

一. 单选题（共 337 题，每题 0 分）

1. 结核性脓胸，肺出现结核病变，治疗方法是：（ ）
A. 胸腔穿刺排脓 B. 脓胸纤维板剥脱术
C. 开放引流 D. 闭式引流
2. 少尿是指成人 24h 尿量少于：（ ）
A. 600ml B. 400ml
C. 500ml D. 700ml
E. 800ml
3. 术后早期下床活动的主要优点在于：（ ）
A. 防止心衰 B. 预防肾衰竭
C. 减少伤口感染 D. 促进伤口愈合
E. 预防下肢静脉血栓形成
4. 当风湿性心脏病二尖瓣狭窄程度加重时：（ ）
A. 心尖部舒张期滚筒样杂音增强，肺动脉第二音减低 B. 心尖部舒张期滚筒样杂音减低，肺动脉第二音减低
C. 心尖部舒张期滚筒样杂音减低，肺动脉第二音增强 D. 心尖部舒张期滚筒样杂音增强，肺动脉第二音增强
5. 复苏处理要分秒必争，主要目的是：（ ）
A. 为迅速恢复脑的血液循环 B. 使心脏迅速恢复跳动
C. 使自发呼吸提早恢复 D. 为减轻酸中毒
E. 为保护肾功能
6. 奇脉最常见于：（ ）
A. 急性左心衰竭 B. 动脉导管未闭
C. 大量心包积液 D. 高血压病
7. 心跳骤停后碱性药物的应用中，下列说法正确的是：（ ）
A. 动脉注射 B. 静脉注射
C. 心内注射，同时静脉注射 D. 每 10min 静脉注射一次
E. 心内注射，按摩过久可每 10min 注射一次
8. 自发性 SAH 病人的处理，错误的是：（ ）
A. 绝对卧床 B. 镇静药物
C. 止血药物 D. 便秘者予肥皂水灌肠
9. 发生小脑幕切迹疝时，下列哪项通过小脑幕切迹被推移至幕下：（ ）
A. 额叶直回 B. 颞叶钩回
C. 中央前回 D. 扣带回
10. 心脏复跳后，首要的处理是：（ ）
A. 维护和支持呼吸和循环功能 B. 控制全身抽搐
C. 防止脑水肿 D. 防治急性肾衰竭
E. 应用大剂量皮质激素
11. 早期中央型肺癌诊断率最高的检查方法是：（ ）
A. 纤维支气管镜检查 B. 纵隔镜检查

- C. 转移灶活组织检查 D. 胸水检查
- 12.胸膜下界在锁骨中线处相交于：()
- A. 第六肋 B. 第八肋
C. 第十肋 D. 第九肋
- 13.下列哪项不是截肢术的远期并发症：()
- A. 神经瘤 B. 幻肢痛
C. 坏疽 D. 残端痛
- 14.非溶血性发热反应的首要措施是：()
- A. 减慢输血速度 B. 给予皮质类固醇药物
C. 给予苯海拉明 25mg 口服 D. 碱化尿液
E. 给予广谱抗生素
- 15.急性肾衰竭少尿期造成病人死亡的常见电解质失衡是：()
- A. 高磷血症和低钙血症 B. 低钠血症
C. 低氯血症 D. 高镁血症
E. 高钾血症
- 16.以下说法不正确的是：()
- A. 正常尿内可出现红细胞 B. 正常尿内可出现微量葡萄糖
C. 正常尿内可出现微量蛋白质 D. 正常尿内可出现白细胞
E. 正常尿内可出现微量脂肪
- 17.下面不是急性胰腺炎血清淀粉酶变化特点的是：()
- A. 发病后数小时升高 B. 4~5日降至正常
C. 24h达到高峰 D. 1~2周降至正常
- 18.关于输血的作用，下列说法错误的是：()
- A. 可补充血容量 B. 改善循环能力
C. 增加血浆蛋白，使伤口愈合 D. 输入抗体可杀灭细菌
E. 改善凝血功能，有助于止血
- 19.洋地黄中毒最常见的心电图表现是：()
- A. 心房颤动 B. 室性期前收缩
C. 房性期前收缩 D. ST-T缺血性改变
- 20.肠内营养最常见的并发症是：()
- A. 误吸 B. 管道堵塞
C. 呕吐、腹泻 D. 高血糖
- 21.目前对睾丸固定术的时间选择是：()
- A. 1岁之前 B. 2岁左右
C. 5岁 D. 入学前
E. 尽可能得早
- 22.膀胱内平均静止压(cmH₂O)应小于：()
- A. 5 B. 10
C. 15 D. 20
E. 2
523. II° 烧伤的组织学划分是指：()
- A. 表皮角质层+透明层 B. 表皮角质层+透明层+颗粒层
C. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层 D. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层

- E. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层+真皮乳头层
- 24.最简单而快速诊断输血时细菌污染反应的方法是：()
- A. 血袋血做细菌培养 B. 病人血做细菌培养
C. 血袋血做细菌涂片 D. 病人尿培养
E. 抗菌药物治疗性诊断
- 25.急性胰腺炎残余感染期最常见的并发症是：()
- A. 胰性脑病 B. 休克
C. 全身细菌感染 D. 营养不良，消化道痿
- 26.腹膜炎引起的肠梗阻属于：()
- A. 机械性绞窄性肠梗阻 B. 机械性单纯性肠梗阻
C. 麻痹性肠梗阻 D. 血运性肠梗阻
- 27.低钾血症时，最早出现的临床表现是：()
- A. 心电图改变 B. 肌乏力
C. 口苦、恶心 D. 心脏传导阻滞
E. 心脏节律异常
- 28.腕管由屈肌支持带与腕骨沟共同围成。管内有指浅、深屈肌腱及屈肌总腱鞘、拇长屈肌腱及其腱鞘和_____通过。腕骨骨折时可压迫之而导致腕管综合征：()
- A. 桡神经 B. 尺神经
C. 正中神经 D. 桡动脉
- 29.诊断颅盖骨折通常依据：()
- A. 头皮伤痕 B. 头痛，呕吐
C. 局部触诊闻及骨擦音 D. 头颅 X 线摄片
- 30.一颈部软组织刀割伤病人，受伤时间已达 12h，伤口长 6cm，无血管神经损伤。处理应：()
- A. 清创后一期缝合 B. 按感染伤口处理
C. 清创后延期缝合 D. 加压包扎
E. 冲洗消毒后缝合
- 31.法洛三联征患者青紫的程度主要取决于：()
- A. 肺动脉狭窄的程度 B. 室间隔缺损的大小
C. 室间隔缺损的部位 D. 主动脉骑跨的程度
- 32.在溶血反应的治疗中，下列说法错误的是：()
- A. 5%碳酸氢钠 250ml 静脉滴注 B. 20%甘露醇 250ml 静脉快速滴注
C. 减慢输血速度至每分钟 10 滴 D. 肝素治疗
E. 输血浆
- 33.结核全身最高发部位是：()
- A. 髋关节 B. 脊柱
C. 膝关节 D. 肘关节
E. 踝关节
- 34.确诊下尿路梗阻是由前列腺增生症引起的方法是：()
- A. 肛门指诊 B. B 超
C. 尿动力学检查 D. 泌尿系造影
E. 膀胱镜
- 35.直腿抬高在多少度以内便产生坐骨神经痛，称为直腿抬高试验阳性：()
- A. 10° B. 20°

C. 40° D. 60°

36.骨痂的形成大致可分为四期。下列哪一项不属于骨痂形成期：()

- A. 肉芽组织修复期 B. 原始骨痂形成期
C. 成熟骨痂形成期 D. 成熟骨板期

37.判断休克已纠正除血压正常外，尿量每小时至少应稳定在：()

- A. 25ml 以上 B. 30ml 以上
C. 40ml 以上 D. 50ml 以上
E. 60ml 以上

38.正常成人颅内压为：()

- A. 7~20mmHg B. 5~20mmH₂O
C. 0.5~1.0kPa D. 0.7~2.0kPa

39.直肠肛管周围间隙不包括：()

- A. 坐骨直肠间隙 B. 骨盆直肠间隙
C. 直肠后间隙 D. 肛管间隙

40.各种较重的脊髓损伤后均可立即发生损伤平面以下弛缓性瘫痪。这是失去高级中枢控制的一种病理现象，称之为：()

- A. 脊髓休克 B. 脊髓振荡
C. 脊髓麻痹 D. 截瘫

41.急性脓胸的治疗方法哪项是不正确的?()

- A. 消炎治疗 B. 支持治疗
C. 开放引流 D. 闭式引流

42.股骨颈骨折 GardenIV型是：()

- A. 部分骨折，骨折无移位 B. 完全骨折，无移位
C. 完全骨折，部分移位 D. 完全骨折，完全移位

43.在多发性损伤的急救处理中，应首先处理的紧急情况是：()

- A. 张力性气胸 B. 四肢骨折
C. 肺挫伤 D. 肋骨骨折

44.符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是：()

- A. PaO₂ 为 50mmHg, PaCO₂ 为 40mmHg B. PaO₂ 为 55mmHg, PaCO₂ 为 50mmHg
C. PaO₂ 为 65mmHg, PaCO₂ 为 40mmHg D. PaO₂ 为 70mmHg, PaCO₂ 为 40mmHg
E. PaO₂ 为 70mmHg, PaCO₂ 为 45mmHg

45.防止急性肾衰竭时的高钾血症，下列说法错误的是：()

- A. 彻底清创，预防感染 B. 供应足够能量
C. 适当使用蛋白质合成激素 D. 禁含钾食物
E. 如有贫血，可输库血

46.闭合性气胸肺萎陷最多达到多少时病人无明显自觉症状：()

- A. 10% B. 20%
C. 30% D. 40%

47.下列哪项不是骨折切开复位术的优点：()

- A. 可使长骨干骨折达到解剖复位 B. 有效的内固定，可使病人提前下床活动，减少肌萎缩和关节僵硬
C. 可使关节内骨折，达到解剖复位 D. 方便护理，减少并发症

48.急性肾衰竭少尿期的蛋白质补给量应为：()

- A. 每日每公斤体重补蛋白质量 0.5g B. 每日每公斤体重补蛋白质量 0.6g

- C. 每日每公斤体重补蛋白质量 0.7g D. 每日每公斤体重补蛋白质量 0.8g
E. 每日每公斤体重补蛋白质量 1.0g
49. 骨科常用的成人跟骨牵引重量为: ()
A. 3~5kg B. 4~6kg
C. 5~8kg D. 6~9kg
50. 预防心跳骤停的原则中, 下列说法错误的是: ()
A. 术前重视全面准备 B. 术中密切监测生理变化, 避免麻醉药过量
C. 术中严防缺氧和二氧化碳蓄积 D. 术中补足失血失液, 纠正水、电解质失衡
E. 术中应用强心药和升压药
51. 急性硬膜外血肿最具特征性的表现是: ()
A. 中间清醒期 B. 两侧瞳孔不对称
C. 颅骨骨折线跨过脑膜中动脉沟 D. 进行性意识障碍
52. 治疗慢性硬膜下血肿最常用的手术方法是: ()
A. 开颅血肿清除术 B. 脑室外引流术
C. 去骨瓣减压术 D. 钻孔引流术
53. 单侧多根多处肋骨骨折哪种固定方法是常用的: ()
A. 压迫固定 B. 牵引固定
C. 胶布固定 D. 胸带固定
54. 诊断张力性气胸最充分的证据是: ()
A. 呼吸困难伴有严重皮下气肿 B. 伤侧胸部呈高调鼓音
C. 伤侧呼吸音消失 D. 胸膜腔抽出高压气体
55. 直肠的长度是: ()
A. 5~15cm B. 12~15cm
C. 10~20cm D. 15~25cm
56. 最多见的脑脓肿是: ()
A. 血源性 B. 耳源性
C. 外伤性 D. 隐源性
57. 严重创伤性休克后, 首先应预防的是: ()
A. 感染 B. 肝性脑病
C. 急性心力衰竭 D. 肾衰竭少尿
E. 急性呼吸窘迫综合征
58. 小脑幕裂孔疝与枕骨大孔疝的根本区别是: ()
A. 剧烈头痛, 频繁呕吐 B. 生命体征改变
C. 意识障碍发生较早 D. 呼吸骤停发生较早
59. 60 岁的男性急性肾衰竭病人, 血钾 5.6mmol/L。下列治疗措施有原则性错误的是:
()
A. 10%氯化钾 20ml 静脉滴注 B. 口服钠型树脂 15g, 每日 3 次
C. 山梨醇 5g, 2h 口服一次 D. 5%碳酸氢钠溶液 100ml, 缓慢静脉滴注
E. 25%葡萄糖溶液加胰岛素(3g: 1U~5g: 1U)200ml, 缓慢静脉滴注
60. 诊断绞窄性肠梗阻最可靠的依据是: ()
A. 阵发性腹部绞痛 B. 有气过水音和金属音
C. X 线检查小肠有多个阶梯状液平 D. 腹肌紧张, 有压痛和反跳痛
61. 中晚期食管癌最典型的临床表现是: ()
A. 吞咽哽噎感 B. 胸骨后烧灼感

- C. 食管内异物感 D. 进行性吞咽困难
62. 关节镜检查对下列哪一关节的滑膜结核早期诊断具有独特价值: ()
- A. 肘关节 B. 腕关节
C. 膝关节 D. 髋关节
63. 采用牢固内固定后发现骨折端 X 线摄影无骨痂, 形成无外骨痂的骨愈合, 称为: ()
- A. 临床愈合 B. 二期愈合
C. 一期愈合 D. 完全愈合
64. 单侧多根多处肋骨骨折急救的原则首先是: ()
- A. 肋间神经封闭止痛 B. 输血
C. 止痛药 D. 局部加压包扎固定
65. 急性硬膜外血肿最常见的出血来源为: ()
- A. 颅骨板障 B. 静脉窦
C. 脑膜中动脉 D. 大脑中动脉
66. 如食管癌病人的进行性吞咽困难症状突然消失, 提示: ()
- A. 食管癌穿孔 B. 食管痉挛解除
C. 部分癌肿坏死脱落 D. 食管水肿消退
67. 40 岁男性患者, 汽车上跌下, 左枕着地。出现进行性意识障碍, 继以右瞳散大。最可能的诊断是: ()
- A. 左枕部硬膜外血肿伴脑疝 B. 左额颞硬膜下血肿伴脑疝
C. 右额颞硬膜下血肿伴脑疝 D. 右额颞硬膜外血肿伴脑疝
68. 高血压脑出血最常见的部位是: ()
- A. 大脑半球 B. 小脑半球
C. 基底节 D. 脑干
69. 右胸闭合性外伤, X 线检查第四肋后端骨折, 稍移位, 气胸占 30%, 自觉胸痛, 呼吸 20 次/分, 脉搏 80 次/分, 血 14.7/10.7kPa。处理原则是: ()
- A. 胶布固定 B. 胸腔穿刺
C. 闭式引流 D. 局部封闭
70. 男性, 30 岁, 急性化脓性阑尾炎, 术后 1 周腹部持续性胀痛, 排气排便消失, 诊断为麻痹性肠梗阻。其临床表现应除外: ()
- A. 肠鸣音亢进 B. 肠鸣音消失
C. 大小肠均胀气 D. 无肠型及蠕动波
71. 造成连枷胸唯一的原因是: ()
- A. 多根多处肋骨骨折 B. 闭合性多根肋骨骨折
C. 开放性粉碎性肋骨骨折 D. 一根肋骨多处骨折
72. 自发性 SAH 病人, 其最常见的病因是: ()
- A. 颅内动脉瘤 B. 脑血管畸形
C. 脑动脉硬化 D. 烟雾病
73. I° 烧伤的组织学划分是指: ()
- A. 表皮角质层 B. 表皮角质层+透明层
C. 表皮角质层+透明层+颗粒层 D. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层
E. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层
74. 下列哪项不是绞窄性肠梗阻的临床表现: ()
- A. 便隐血阳性 B. 腹痛剧烈而持续
C. 腹部有固定压痛和腹膜刺激征 D. 呕吐呈反射性, 吐出物为食物或胃液

- 75.中央型肺癌指的是: ()
- A. 肺鳞癌 B. 起源于肺泡组织的肺癌
C. 起源于段支气管以上的肺癌 D. 已有纵隔淋巴结转移的肺癌
E. 发生于50岁以上男性的肺癌
- 76.最易形成小脑幕裂孔疝的是: ()
- A. 额叶肿瘤 B. 颞叶肿瘤
C. 顶叶肿瘤 D. 小脑肿瘤
- 77.以下哪种情况不宜做胸腔引流?()
- A. 急性脓胸 B. 脓气胸
C. 血胸、感染 D. 结核性脓胸
- 78.急性肾衰竭少尿、无尿期急需防治的电解质失调是: ()
- A. 低血钠 B. 低血钙
C. 高血镁 D. 高血钾
E. 低血钾
- 79.在输血适应证中, 下列说法错误的是: ()
- A. 出血, 补充血容量 B. 纠正贫血或低蛋白血症
C. 严重感染者输入抗体补体 D. 凝血异常者补充各种凝血因子
E. 增加营养素供应能量
- 80.手术后最易发生尿潴留的是: ()
- A. 脾切除术后 B. 胃次全切除术后
C. 胆囊切除术后 D. 腹股沟斜疝修补术后
E. 肛门直肠手术后
- 81.甲状腺术后导致呼吸困难的原因中, 下列哪项是错误的: ()
- A. 伤口内出血压迫气管 B. 双侧喉上神经损伤
C. 双侧喉返神经损伤 D. 急性喉头水肿
- 82.慢性脓胸最主要的诊断依据是: ()
- A. X线见有胸膜钙化 B. 胸部下陷肋间变窄
C. 颈部气管向患侧移位 D. 胸腔抽出脓液
- 83.诊断颅内转移瘤最有价值的检查手段是: ()
- A. X线 B. CT
C. MRID. DSA
- 84.食管癌手术食管切除范围应在距癌肿: ()
- A. 1~2cm B. 2~3cm
C. 3~4cm D. 5~8cm(>5cm)
- 85.骨折早期并发症是: ()
- A. 压疮 B. 感染
C. 缺血性骨坏死 D. 神经损伤
- 86.关于肠外营养液的成分下列叙述正确的是: ()
- A. 应每天常规给予水溶性、脂溶性维生素和微量元素 B. 氨基酸是肠外营养的唯一氮源
C. 无肝肾疾病的住院病人其热氮比为150~200kcal: 1g D. 多以葡萄糖作为单一能源
- 87.50岁男性患者, 2h前被木棒击伤左颞部, 伤后头痛、呕吐, 1h前意识不清。PE: 中度昏迷, 左瞳散大, 右侧肢体病理征(+). 诊断考虑为: ()
- A. 颅骨凹陷性骨折伴脑疝 B. 急性硬膜外血肿伴脑疝
C. 急性硬膜下血肿伴脑疝 D. 脑挫裂伤伴脑疝

- 88.引起人工关节远期松动的主要原因是：()
- A. 人工关节感染 B. 外伤
C. 人工关节摩擦 D. 安装不当
- 89.颅内压增高时最客观的体征是：()
- A. 头痛 B. 呕吐
C. 视神经乳头水肿 D. 昏迷
- 90.急性脓胸致病菌最多见的是：()
- A. 金黄色葡萄球菌 B. 革兰阴性杆菌
C. 溶血性链球菌 D. 绿脓杆菌
- 91.关于脓胸下列哪一项是错误的?()
- A. 脓胸多为继发性感染 B. 结核性脓胸多属慢性脓胸
C. 脓胸的病程分早、中、晚三期 D. 脓胸的主要症状是高烧、胸痛
- 92.气性坏疽的病原菌主要侵犯：()
- A. 皮下脂肪组织 B. 筋膜蜂窝组织
C. 肌肉组织 D. 骨与关节
E. 伤处附近所有软组织
- 93.闭合性肋骨骨折，说明肺或支气管有损伤的一项是：()
- A. 伤侧肺呼吸音减弱 B. 伤侧肺有音
C. 伤侧皮下气肿 D. 透视伤侧胸腔积液
- 94.风湿性心脏病严重二尖瓣狭窄突发大咯血是由于：()
- A. 肺毛细血管破裂 B. 合并肺结核
C. 急性肺水肿 D. 支气管静脉破裂
- 95.诊断冠心病最常用的非创伤性检查方法是：()
- A. 休息时心电图 B. 24h 动态心电图
C. 心电图运动负荷试验 D. 超声心动图
- 96.下述临床表现哪项诊断肋骨骨折最可靠?()
- A. 局部疼痛 B. 损伤部位肿胀
C. 损伤部位间接压痛 D. 听到胸部有骨擦音
- 97.一中年女性诉胸痛。查体发现左第 2、3 肋软骨肿大隆起，表面光滑，有局限性压痛，胸片未见异常。最常见的病因是：()
- A. 肋间神经痛 B. 带状疱疹
C. 肋骨肿瘤 D. 非特异性肋软骨炎
- 98.下列哪种脉搏提示主动脉瓣关闭不全：()
- A. 交替脉 B. 奇脉
C. 水冲脉 D. 脱落脉
- 99.以下叙述正确的是：()
- A. 直肠瓣有阻止粪便的作用 B. 齿线以下静脉回流至门静脉
C. 直肠内括约肌为随意肌 D. 肛门直肠周围间隙抗感染能力强
- 100.可以确诊膀胱癌的方法是：()
- A. CTB. B 超
C. 膀胱造影 D. 尿脱落细胞
E. 膀胱镜
- 101.缩窄性心包炎最常见的病因是：()
- A. 外伤性血心包 B. 化脓性感染

- C. 风湿性心包炎 D. 结核性心包炎
102. 下列哪项不是凹陷性骨折的手术指征: ()
- A. 有颅高压症状 B. 开放性骨折
C. 引起偏瘫 D. 静脉窦处凹陷性骨折, 无明显颅高压症状
103. 胸外心脏按摩操作方法中, 下列说法错误的是: ()
- A. 卧硬板床 B. 按压胸骨中下 1/3 处
C. 向脊柱方向下压, 使胸骨下陷 4~5cm D. 按压次数成人每分钟 80~100 次/分
E. 可用于任何情况下
104. 胸部损伤中对呼吸和循环生理危害最显著的是: ()
- A. 开放性气胸 B. 纵隔及皮下气肿
C. 张力性气胸 D. 闭合性气胸
105. 深 II° 烧伤的组织学划分是指: ()
- A. 表皮角质层+透明层+颗粒层 B. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层
C. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层 D. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层+真皮乳头层
E. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层+真皮乳头层+真皮乳头层以下的真皮
106. 阑尾炎术后最常见的并发症是: ()
- A. 切口感染 B. 腹腔脓肿
C. 肠粘连性肠梗阻 D. 粪瘘
107. 右主支气管的叙述何者正确: ()
- A. 细而长 B. 粗而陡直
C. 异物不易落入 D. 前方有下腔静脉
108. 目前认为最佳加强骨折修复的材料是: ()
- A. 自体松质骨 B. 异体松质骨
C. 自体皮质骨 D. 人工合成材料
109. 在结直肠癌的 Dukes 分期中, 发现有淋巴结转移, 至少应属: ()
- A. Dukes A B. Dukes B
C. Dukes C D. Dukes D
110. 骨筋膜室综合征最常见的部位为: ()
- A. 小腿和上臂 B. 小腿和足部
C. 上臂和前臂 D. 前臂和足部
111. 一般手术前禁食时间为: ()
- A. 禁食 4h, 禁饮 2h B. 禁食 6h, 禁饮 2h
C. 禁食 8h, 禁饮 3h D. 禁食 10h, 禁饮 3h
E. 禁食 12h, 禁饮 4h
112. 38 岁女性, 活动后心悸、气喘一年余。查体轻度贫血, 心率快, 律整, 胸骨右缘第 2 肋间闻及响亮而粗糙的收缩期杂音(3/6 级)。首先应想到的疾病是: ()
- A. 动脉导管未闭 B. 主动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣关闭不全 D. 主动脉瓣狭窄
113. 输血后非溶血性发热反应最常见的原因是: ()
- A. 污染 B. 感染
C. 过敏反应 D. 致热原
E. 血液凝集
114. 小面积浅烧伤清创处理错误的是: ()

- A. 水疱皮完整，应予保存 B. 如水疱皮已撕脱，可以用无菌油性敷料包扎
C. 水疱皮没有作用，应尽量去除 D. 创面已感染，应勤换敷料
115. 男性，67岁，肺源性心脏病急性加重期患者。血气分析：pH7.25， PaCO_2 9.3kPa(70mmHg)， HCO_3^- 30mmol/L。对其酸碱失衡的治疗措施应为：()
- A. 静脉滴注5%碳酸氢钠 B. 静脉滴注盐酸精氨酸
C. 给予利尿剂 D. 补充氯化钾
E. 改善通气功能
116. 男，45岁，转移性右下腹疼痛72h，就诊时高热40℃，伴寒战，下腹部腹肌紧张，压痛明显，巩膜轻度黄染，诊断为急性坏疽穿孔性阑尾炎。该病最可能同时有下列哪项并发症或合并症：()
- A. 腹腔脓肿 B. 黄疸性肝炎
C. 肠内瘘形成 D. 门静脉炎
117. 小儿烧伤补液过多，早期出现恶心、呕吐、嗜睡、高热、抽搐，应考虑到患儿可能有：()
- A. 水、电解质紊乱 B. 低钾血症
C. 低血糖症 D. 脑水肿
118. 低钾血症的病人，补钾后病情仍无改善时，应首先考虑缺乏：()
- A. 镁 B. 磷
C. 钠 D. 氯
E. 钙
119. 开放性气胸首要的急救措施是：()
- A. 纠正休克 B. 封闭伤口
C. 清创缝合 D. 胸膜腔穿刺
120. 关于肋骨骨折胸壁胶布固定方法，错误的是：()
- A. 准备3~5cm宽的胶布 B. 病人吸气末屏气后贴敷
C. 胶布由后向前拉紧粘贴 D. 固定期为2~3周
121. 60岁女性患者，头部棍击伤，无昏迷及意识障碍，无颅骨骨折。1个月后出现颅高压症状。最可能的诊断是：()
- A. 慢性硬膜外血肿 B. 多发颅内血肿
C. 慢性硬膜下血肿 D. 脑外伤后遗症
122. 颅高压病人，腰穿释放脑脊液后突然呼吸停止，其原因是：()
- A. 小脑扁桃体疝 B. 小脑幕裂孔疝
C. 脑室出血 D. 颅内压过低
123. 挤压综合征主要是指损伤后出现：()
- A. 呼吸困难 B. 休克
C. 昏迷 D. 肾衰竭
E. 心力衰竭
124. 关于治疗心跳骤停后缺氧所造成的脑损伤常用的基本方法中，下列说法错误的是：()
- A. 头部降温 B. 应用大量激素
C. 脱水疗法 D. 给予能量合剂
E. 机械通气，吸100%氧
125. 低钾性碱中毒常出现于：()
- A. 尿毒症 B. 胃肠减压

- C. 术后少尿 D. 挤压创伤
E. 输血过量
- 126.经尿道前列腺电切除术时冲洗液的适宜压力(高度)为: ()
A.
- 127.下面关于胰岛细胞瘤描述不正确的是: ()
A. 来源于胰岛 B 细胞 B. 阵发性低血糖昏迷
C. 发作时血糖低于 2.8mmol/LD. 口服葡萄糖后不能缓解
- 128.肝外胆管结石主要是: ()
A. 胆固醇结石 B. 胆色素结石
C. 混合性结石 D. 胆色素结石或混合性结石
- 129.高位带蒂直肠息肉采取何种方法处理: ()
A. 在内镜下电灼 B. 在内镜下用圈套电灼切除
C. 经肛门直视下结扎切除 D. 开腹切开肠管, 直视下切除
- 130.食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可供能量(kcal)分别为: ()
A. 4, 4, 9 B. 9, 4, 4
C. 4, 9, 4 D. 4, 9, 9
E. 9, 9, 4
- 131.男性, 45 岁, 腹胀、呕吐已半年, 多于午后发作, 吐出隔夜食物, 吐量较大, 吐后舒服。由于长期呕吐除脱水外还会造成: ()
A. 低氯、高钾性碱中毒 B. 低氯、低钾性碱中毒
C. 低氯、高钾性酸中毒 D. 低氯、低钾性酸中毒
E. 低钾性酸中毒
- 132.下列有关外科感染疾病中, 表述错误的是: ()
A. 疖是毛囊与邻近皮脂腺的化脓性感染 B. 痈是多数散在的疖
C. 丹毒是皮肤网状淋巴管的炎性病变 D. 急性蜂窝织炎是皮下结缔组织的感染
E. 脓肿是急性感染后局限性脓液积聚
- 133.服用保列治后可使 PSA 值下降: ()
A. 20% B. 30%
C. 40% D. 50%
E. 60%
- 134.下列选项中, 符合低渗性脱水的是: ()
A. 又称急性脱水 B. 水和钠同时缺失, 失水多于失钠
C. 一般无口渴感 D. 尿比重常大于 1.010
E. 细胞内液移向细胞外间隙
- 135.心跳复苏后, 最容易出现的继发性病理改变是: ()
A. 心肌缺氧性损伤 B. 肺水肿
C. 脑缺氧性损伤 D. 肝小叶中心坏死
E. 肾小管坏死
- 136.缺血再灌注损伤最常见于: ()
A. 心 B. 脑
C. 肺 D. 肾
- 137.男性, 因交通事故致脾破裂, 入院时血压为 80/60mmHg, 脉搏 120 次/分, 神志尚清, 口渴, 肤色苍白, 尿少。估计失血量为: ()
A. 100~300ml B. 400~600ml

- C. 800~1600ml D. 1800~2000ml
E. 2000ml 以上
- 138.缝线拆除时间一般为：()
A. 头、面、颈部4~5天 B. 腹部、会阴部7天
C. 背、臀部9天 D. 四肢：10~12天，减张缝合14天
E. 以上都对
- 139.膀胱造口术后首次更换导管的适宜时间是：()
A. 术后2周 B. 术后3周
C. 术后4周 D. 术后5周
E. 术后8周
- 140.衡量胸外心脏按摩有效的标志中，下列说法错误的是：()
A. 摸到颈或股动脉搏动 B. 口唇发绀逐渐减轻
C. 收缩压在80mmHg以上 D. 散大的瞳孔开始缩小
E. 偶尔出现自主呼吸动作
- 141.食管癌最常发生在食管的：()
A. 颈部 B. 腹部
C. 胸上段 D. 胸中段
- 142.45岁女性，严重骨盆骨折，24h尿量200ml，血钾5.9mmol/L。二氧化碳结合力13mmol/L，血尿素氮27mmol/L。下列治疗措施中不正确的是：()
A. 10%葡萄糖酸钙溶液20ml，缓慢静脉注射 B. 11.2%乳酸钠溶液60ml，缓慢静脉注射
C. 口服钠型树脂10g，每日3次 D. 血液透析
E. 输同型库存血200ml
- 143.血库保存血液的最适宜温度是：()
A. -4~-6℃ B. 0℃
C. 4~6℃ D. 1~3℃
E. -1~-3℃
- 144.所谓无尿是指(成人)：()
A. 每日尿量为零 B. 每日尿量少于20ml
C. 每日尿量少于50ml D. 每日尿量少于80ml
E. 每日尿量少于100ml
- 145.不是诱发结直肠癌高发因素的是：()
A. 高脂饮食 B. 结直肠腺瘤
C. 结肠血吸虫肉芽肿 D. 高纤维素饮食
- 146.下列症状中，不是低钾血症的临床表现的是：()
A. 肌无力，腱反射减弱 B. 恶心，呕吐，腹胀，肠蠕动消失
C. ECG示T波低平，ST段降低，QT延长，出现U波 D. 呼吸性碱中毒
E. 房室传导阻滞
- 147.Pancoast瘤是指：()
A. 癌肿位于肺门处 B. 癌肿侵犯喉返神经
C. 癌肿产生某些内分泌物质 D. 癌肿引起肌无力
E. 癌肿位于上叶顶部胸廓入口处
- 148.下列哪项不是截肢术的近期并发症：()
A. 出血和血肿形成 B. 感染
C. 坏死 D. 残端痛

- 149.口对口人工呼吸的操作中，下列说法错误的是：()
- A. 头后仰，托起下颌 B. 吹气时要看到胸廓抬起
C. 吹气次数不少于 20 次/分 D. 吹气时可向后压环状软骨
E. 吹气时捏闭鼻孔
- 150.除手术外，上段食管癌最有效的治疗方法是：()
- A. 化疗 B. 放疗
C. 免疫治疗 D. 放置食管支架
- 151.股骨颈的轴心线与股骨干的纵轴线形成一个颈干角。正常范围平均为：()
- A. 100° B. 127°
C. 150° D. 180°
- 152.胸外电除颤时，电极板安置的位置应在：()
- A. 心尖区，后胸壁 B. 左第二肋间前胸壁，心尖区
C. 左第二肋间前胸壁，心尖区后胸壁 D. 右第二肋间前胸壁，心尖区
E. 以上都可以
- 153.颅内巨大动脉瘤的瘤径为：()
- A. 直径 15mm D. 直径>25mm
- 154.开放性胸外伤的诊断依据是：()
- A. 仅胸壁有创口 B. 支气管断裂
C. 多发性肋骨骨折 D. 胸壁有创口并伴有呼吸困难、紫绀及休克
- 155.化脓性阑尾炎行阑尾切除术，术后 3 天切口红肿，有脓性分泌物，10 天后清创缝合而愈合。切口愈合类型应记录为：()
- A. II/乙 B. II/丙
C. III/甲 D. III/乙
E. III/丙
- 156.房间隔缺损的血流动力学改变下列哪项是错误的：()
- A. 右心室容量负荷增加 B. 右心室阻力负荷增加
C. 左心室容量负荷增加 D. 可产生肺动脉高压
- 157.单纯睾丸精原细胞瘤，以下哪项是正确的：()
- A. HCG50%增高 B. AFP80%增高
C. HCG 及 AFP5%~10%增高 D. LDH 明显增高
E. 尿 β_2 微球蛋白减少
- 158.心尖区闻及隆隆样舒张期杂音，考虑为：()
- A. 二尖瓣关闭不全 B. 主动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣狭窄 D. 肺动脉瓣狭窄
- 159.关于无菌术的概念，下列表述正确的是：()
- A. 无菌术是针对各种感染源而采取的一种防止感染的措施 B. 无菌术包括灭菌法、抗菌法和无菌操作规则
C. 灭菌法是指预先用物理方法来消灭细菌的方法 D. 抗菌法(消毒法)是指用化学方法来消灭细菌的方法
E. 以上都对
- 160.预防术后肺不张的措施中，下列说法错误的是：()
- A. 手术前锻炼深呼吸 B. 术前控制呼吸道感染，手术前禁烟 1~2 周
C. 防止手术中、手术后呕吐及误吸 D. 咳嗽伤口疼痛，随时用镇咳剂
E. 鼓励病人咳嗽，协助病人排出支气管分泌物

- 161.治疗等渗性脱水理想的液体是：()
- A. 5%碳酸氢钠 B. 等渗盐水
C. 平衡盐溶液 D. 5%葡萄糖
E. 小分子右旋糖酐
- 162.决定冠状动脉搭桥术，依赖下列哪项检查：()
- A. 冠状动脉造影 B. 心脏CT
C. 心脏超声 D. 心电图
- 163.中央型肺癌长大阻塞支气管管腔时，X线胸片即可表现为：()
- A. 纵隔增宽 B. 气管明显移位
C. 气管分叉角度增大 D. 阻塞性肺炎或肺不张
- 164.主动脉瓣中度狭窄时瓣口面积为：()
- A. $<0.75\text{cm}^2$ B. $0.75 \sim 1.0\text{cm}^2$
C. $1.1 \sim 1.75\text{cm}^2$ D. $1.76 \sim 2.0\text{cm}^2$
- 165.心脏触及震颤多由于：()
- A. 心脏瓣膜轻度关闭不全 B. 心脏瓣膜狭窄
C. 心房颤动 D. 心室颤动
- 166.迅速出血后出现休克症状，表明至少已丢失全身总血量的：()
- A. 10% B. 15%
C. 20% D. 25%
E. 30%
- 167.急性阑尾炎时闭孔内肌试验阳性，提示：()
- A. 阑尾位置较深 B. 阑尾在盲肠后位
C. 阑尾位置较低 D. 阑尾在盲肠内侧位
- 168.破伤风典型症状中，通常最先受影响的肌群是：()
- A. 膈肌 B. 咀嚼肌
C. 背腹肌 D. 面部表情肌
- 169.所谓少尿是指(成人)：()
- A. 每日尿量少于200ml B. 每日尿量少于300ml
C. 每日尿量少于400ml D. 每日尿量少于500ml
E. 每日尿量少于600ml
- 170.引起脓胸常见的细菌是：()
- A. 大肠杆菌 B. 肺炎双球菌
C. 链球菌 D. 结核菌
- 171.甲亢行双叶甲状腺次全切除后，产生危象的原因是：()
- A. 切除腺体不足 B. 术后出血过多
C. 精神过度紧张 D. 术前甲亢症状未控制
- 172.下列哪项不是异体骨移植的主要用途是：()
- A. 骨折治疗 B. 充填大块骨缺损
C. 骨肿瘤植骨 D. 人工关节翻修术时充填骨缺损
- 173.肠内营养并发症中，与输入速度及溶液浓度有关的是：()
- A. 误吸 B. 腹胀、腹泻
C. 肠炎 D. 肠道细菌移位
E. 胆囊结石
- 174.细胞外液中主要的阳离子是：()

- A. K^+ B. Na^+
- C. Ca^{2+} D. Mg^{2+}
- E. Fe^{2+}

175.败血症做血培养,何时抽血培养阳性率最高:()

- A. 发热开始 B. 寒战以后
- C. 发热达高峰时 D. 寒战、发热以后
- E. 寒战、发热之前

176.关于胰腺假性囊肿正确的是:()

- A. 多由于外伤引起 B. 形成纤维包膜和上皮细胞
- C. 多位于体尾部 D. 宜早期手术治疗

177.骨肉瘤的主要血清学化验是:()

- A. 酸性磷酸酶活性降低 B. 酸性磷酸酶活性增高
- C. 碱性磷酸酶活性降低 D. 碱性磷酸酶活性增高

178.气胸时放置胸腔闭式引流管常见的部位是:()

- A. 锁骨中线第2肋间 B. 锁骨中线第1肋间
- C. 腋中后线第7、8肋间 D. 肩胛下角线第8肋间

179.机体处于应激如创伤、手术、感染等情况下,能量代谢的变化中错误的是:()

- A. 机体出现高代谢和分解代谢 B. 脂肪动员加速
- C. 蛋白质分解加速 D. 处理葡萄糖能力增强
- E. 机体处于负氮平衡

180.前列腺活检的PSA基础参考值是:()

- A. $>2ng/ml$ B. $>3ng/ml$
- C. $>4ng/ml$ D. $>5ng/ml$
- E. $>10ng/ml$

181.Ⅲ°烧伤的组织学划分是指:()

- A. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层 B. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层
- C. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层+真皮乳头层 D. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层+真皮乳头层+真皮乳头层以下的真皮
- E. 表皮角质层+透明层+颗粒层+棘细胞层+生发层+真皮乳头层+真皮乳头层以下的真皮+真皮网状层

182.心脏复跳后开始施行脱水疗法的最佳时期是:()

- A. 复跳后立即开始 B. 复跳后12h内开始
- C. 与低温疗法同时开始 D. 待血压平稳后开始
- E. 尿量

183.脊柱结核并发截瘫多见于:()

- A. 颈椎 B. 腰椎
- C. 胸椎 D. 骶椎

184.类风湿性关节炎实验室检查可出现:()

- A. 类风湿因子阳性 B. 抗“O”增高
- C. 血尿酸增高 D. AKP增高

185.长期肠外营养支持者,应选择的穿刺血管是:()

- A. 颈内静脉 B. 大隐静脉
- C. 颈外静脉 D. 足背静脉

E. 头静脉

186.以下哪种物质是睾丸癌的特异瘤标: ()

A. 癌胚抗原(CEA) B. 乳酸脱氢酶(LDH)

C. 甲胎蛋白(AFP) D. 端粒酶

E. β_2 微球蛋白

187.幽门梗阻病人可发生: ()

A. 呼吸性酸中毒 B. 代谢性酸中毒

C. 呼吸性碱中毒 D. 代谢性碱中毒

E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

188.左主支气管的叙述何者正确: ()

A. 比右主支气管短 B. 在奇静脉的下方通过

C. 位于食管胸部之后 D. 在左肺动脉之下方到达肺

189.甲状腺手术后一侧喉返神经损伤时会出现: ()

A. 吞咽困难 B. 音调降低

C. 饮水呛咳 D. 声音嘶哑

190.治疗代谢性酸中毒的首选药物是: ()

A. 乳酸钠 B. 碳酸氢二钠

C. 枸橼酸钠 D. 碳酸氢钠

191.心跳停止的时间是指: ()

A. 循环停止到重建人工循环的时间 B. 循环停止到心脏复跳的时间

C. 发现心跳停止到重建人工循环的时间 D. 发现心跳停止到心脏复跳的时间

E. 以上都不是

192.最常见的颅内肿瘤为: ()

A. 脑膜瘤 B. 听神经瘤

C. 垂体腺瘤 D. 神经胶质瘤

193.食管癌最多见的病理组织类型是: ()

A. 腺癌 B. 鳞癌

C. 类癌 D. 腺鳞癌

194.重度主动脉瓣反流时心尖部可存在: ()

A. Graham-Steell 杂音 B. Austin-Flint 杂音

C. Durozier 征 D. Traube 征

195.女性, 20 岁, 因十二指肠溃疡所致幽门梗阻引起反复呕吐 15 天入院。测得血钾值为 3mmol/L, 动脉血 pH7.5。首选补液种类应为: ()

A. 乳酸钠溶液 B. 氯化钾溶液

C. 等渗盐水 D. 葡萄糖盐水

E. 等渗盐水、氯化钾溶液

196.下列哪项不属于原发性脑损伤: ()

A. 脑震荡 B. 脑挫裂伤

C. 脑内血肿 D. 弥散性轴索损伤

197.女, 28 岁, 门诊诊断右甲状腺瘤, 住院择期手术, 术中行右叶全切, 冰冻切片报告是乳头状腺癌。对患者应如何处理: ()

A. 术后终身服用甲状腺素片 B. 手术继续继续, 对侧全叶切除

C. 手术继续继续, 对侧次全叶切除 D. 术后放射性外照射治疗

198.周围型肺癌最常见的 X 线表现是: ()

- A. 薄壁空洞 B. 肺野周围孤立性圆形块影
C. 肺叶不张 D. 肺野周围小片轮廓模糊影
- 199.周围神经损伤一期未处理者，二期修复的时间为：()
A. 伤口愈合后 1 周 B. 伤口愈合后 2 周
C. 伤口愈合后 3~4 周 D. 伤口愈合后 5 周
- 200.鉴别甲状腺结节是良性还是恶性的最可靠的依据是：()
A. 同位素扫描 B. 病理切片
C. 颈部摄片 D. 颈部检查扪及肿块的性质
- 201.胸骨左缘第二肋间触及连续性震颤，常见病变为：()
A. 动脉导管未闭 B. 肺动脉瓣狭窄
C. 房间隔缺损 D. 室间隔缺损
- 202.张力性气胸的现场急救措施是：()
A. 呼吸机辅助呼吸 B. 高流量吸氧
C. 紧急剖胸手术 D. 用输液管在锁骨中线穿刺排气
- 203.正常的最大尿流率是：()
A. 20~25ml/s B. 10~15ml/s
C. 5~15ml/s D. >10ml/s
E. >15ml/s
- 204.风湿性心脏病二尖瓣狭窄最具诊断价值的检查是：()
A. 心电图检查 B. 心脏 B 超
C. 血沉检查 D. 抗 O 检查
- 205.胃泌素瘤的特点是：()
A. 75%多发 B. 胃为多发部位
C. 消化性溃疡多见 D. 胃酸低分泌
- 206.在闭合性气胸时，当肺压缩小于多少时，如无症状，可暂予观察。()
A. 40% B. 20%
C. 30% D. 15%
- 207.以下哪种说法是正确的：()
A. PSA 水平可以确定疾病的种类 B. PSA 水平增高可以确诊前列腺癌
C. PSA 是组织相关性物质 D. PSA 只在前列腺中分泌
E. PSA 是特异性瘤标
- 208.心跳骤停紧急处理原则中，下列哪项是错误的：()
A. 迅速开始人工呼吸 B. 待心电图确诊后开始心脏按摩
C. 立即开放静脉输液通路 D. 准备好电除颤
E. 开始进行胸外心脏按摩
- 209.一旦确诊为心跳骤停，必须争取在几分钟内重建呼吸和循环：()
A. 4~6min B. 6~8min
C. 8~10min D. 10~12min
E. 12~14min
- 210.关于肠梗阻下列哪项不正确：()
A. 绞窄性肠梗阻必然是完全性肠梗阻 B. 不完全梗阻多为单纯性梗阻
C. 梗阻肠段有血运障碍即为绞窄性梗阻 D. 回肠梗阻属于高位梗阻
- 211.前列腺特异性抗原(PSA)是由前列腺的什么组织分泌的：()
A. 前列腺基质 B. 前列腺间质

- C. 前列腺平滑肌 D. 前列腺腺体
E. 前列腺腺上皮细胞
212. 手术前禁食的最主要目的是: ()
A. 避免胃肠道膨胀而妨碍手术 B. 防止手术中、手术后的呕吐及误吸
C. 防止术后腹胀 D. 防止术后肠麻痹
E. 防止术后便秘
213. 休克病人中心静脉压为 $5\text{cmH}_2\text{O}$, 血压 $80/65\text{mmHg}$ 。处理原则为: ()
A. 适当补液 B. 使用强心药物
C. 使用扩血管药 D. 补液试验
E. 充分补液扩容
214. 身体哪些部位损伤易发生挤压综合征: ()
A. 头部 B. 面、颈
C. 胸部 D. 上肢
E. 下肢和臀部
215. 下列哪种疾病易恶变: ()
A. 肛瘘 B. 慢性肛裂
C. 肛乳头肥大 D. 直肠息肉
216. 女性, 30岁, 脐周阵发性腹痛3天伴呕吐, 肠鸣音亢进, 有气过水声, 诊断为急性肠梗阻。其原因应除外: ()
A. 肠粘连 B. 肠扭转
C. 肠套叠 D. 肠麻痹
217. 急性脓胸最多继发于: ()
A. 开胸手术后 B. 开放性胸外伤
C. 膈下脓肿 D. 肺部炎症
218. 急性脓性心包炎的治疗, 错误的是: ()
A. 心包部分切除术 B. 全身应用抗生素
C. 穿刺抽脓 D. 心包切开排脓术
219. 术前准备的最根本目的是: ()
A. 促进切口愈合良好 B. 防止手术后感染
C. 使病人尽可能接近生理状态, 提高对手术的耐受力 D. 防止术中各种并发症
E. 促进术后早日康复
220. 补钾速度一般每小时不宜超过: ()
A. 10mmol B. 20mmol
C. 30mmol D. 40mmol
E. 50mmol
221. 急性肾衰竭时, 少尿的发病机制是: ()
A. 肾小球滤过率降低 B. 肾小管逆向性弥散
C. 肾间质水肿 D. 肾小管机械性堵塞
E. 以上都是
222. 缩窄性心包炎最好的治疗方法是: ()
A. 抗生素治疗 B. 利尿药物治疗
C. 强心药物治疗 D. 手术治疗
223. 拟有膀胱破裂, 临床首选的诊断方法是: ()
A. 膀胱造影 B. 膀胱镜检查

- C. 膀胱内注水试验 D. 腹部平片
E. B超
- 224.在门诊判断甲状腺功能亢进的病情程度，最简便而主要的指标是：()
A. 甲状腺肿大程度 B. 突眼的程度
C. 脉率和脉压 D. 体重减轻的程度
- 225.前列腺的主要血供来自：()
A. 阴部内动脉 B. 直肠中动脉
C. 直肠下动脉 D. 膀胱下动脉
E. 髂外动脉
- 226.颅高压所致颅神经麻痹常见于：()
A. 动眼神经 B. 滑车神经
C. 外展神经 D. 面神经
- 227.内痔诊断的主要根据是：()
A. 便后滴血 B. 肛门外看到有皮垂
C. 便时有肛门脱垂 D. 肛门镜中看到增大的痔核
- 228.下列哪项手术方案不适用于急性脑损伤的治疗：()
A. 开颅血肿清除术 B. 脑室外引流术
C. 去骨瓣减压术 D. 分流术
- 229.库血保存时间不超过：()
A. 1周 B. 2周
C. 3周 D. 4周
E. 以上都不是
- 230.关于急性脓胸的治疗方法，下列哪一项是错误的？()
A. 消炎疗法 B. 开放引流
C. 支持疗法 D. 闭式引流
- 231.下列关于烧伤清创的观点，错误的是：()
A. 各种类型的烧伤均须及时清创 B. 对大出血、开放性气胸、骨折等应先施行相应的急救处理
C. 严重呼吸道烧伤需及早行气管切开 D. 并发休克者须首先抗休克治疗，待休克好转后方可施行清创
E. 烧伤清创时应当严格遵守无菌操作规范，彻底清除创面异物及水疱表皮
- 232.关节“休息痛”多见于：()
A. 风湿性关节炎 B. 类风湿性关节炎
C. 关节结核 D. 骨关节炎
- 233.为将每日代谢所产生的大约 600mmol/L 的溶质(废物)完全溶解排出，需要的尿量至少是：()
A. 400ml B. 500ml
C. 600ml D. 800ml
E. 1000ml
- 234.骨折特有体征是：()
A. 畸形 B. 反常活动
C. 骨擦音 D. 畸形、反常活动、骨擦音
- 235.第二心音固定分裂，常见于：()
A. 二尖瓣关闭不全 B. 主动脉瓣关闭不全

- C. 肺动脉瓣关闭不全 D. 房间隔缺损
236. 脊柱结核与脊柱肿瘤 X 线片的鉴别要点是：()
- A. 椎间隙变窄 B. 椎体破坏
C. 椎体高度变低 D. 椎体后壁破坏
237. 下列哪项检查诊断肋骨骨折是不可靠的：()
- A. 局部压痛 B. 间接压痛
C. 胸壁反常呼吸运动 D. 骨擦音
238. 女性，45 岁，幽门梗阻行持续胃肠减压半月余，每日补 10% 葡萄糖液 2500ml，5% 葡萄糖盐水 1000ml，10~30ml。2 天前开始出现全腹膨胀，无压痛及反跳痛，肠鸣音消失，每日尿量 1500ml 左右。最可能的原因是：()
- A. 低钾血症 B. 低钠血症
C. 高钾血症 D. 高钠血症
E. 低钙血症
239. 再灌注损伤是指：()
- A. 缺血后恢复血流灌注引起的后果 B. 缺血后恢复血流引起的组织损伤
C. 无钙后再用含钙溶液灌注引起钙超载 D. 缺氧后再用富含氧溶液灌注引起的组织损伤
240. 诊断颅底骨折最确切的依据是：()
- A. 头面部外伤史 B. 脑脊液鼻漏
C. 头颅 X 线摄片示额骨线形骨折 D. 鼻出血
241. 骨筋膜室综合征一经确诊应：()
- A. 立即切开筋膜减压 B. 抬高患肢继续观察
C. 立即静脉用甘露醇脱水 D. 使用激素
242. 颈部肿块在下列哪个部位应考虑甲状腺腺瘤：()
- A. 颈侧部 B. 颌下区
C. 颈前正中区随吞咽上下活动 D. 颈前正中区随伸舌活动
243. 急性全脓胸闭式引流的最佳部位是：()
- A. 锁骨中线第二肋间 B. 肩胛线第七肋间
C. 腋前线第六肋间 D. 腋中后线第七或八肋间
244. 恶性肿瘤颅内转移最多见的途径为：()
- A. 经脑脊液 B. 经血流
C. 经淋巴系统 D. 直接侵入
245. 开放性气胸产生纵隔摆动主要是由于：()
- A. 伤侧胸膜腔负压消失 B. 呼气与吸气时两侧胸膜腔压力差不同
C. 健侧胸膜腔负压增加 D. 健侧肺萎陷
246. 椎管内肿瘤出现病变脊髓节段以下同侧肢体痛、温觉丧失，伴触觉减退及对侧肢体运动功能障碍，其最可能的分期为：()
- A. 瘫痪期 B. 神经根刺激期
C. 脊髓部分受压期 D. 脊髓完全受压期
247. 最常见的颅内血肿是：()
- A. 急性硬膜外血肿 B. 急性硬膜下血肿
C. 慢性硬膜下血肿 D. 脑内血肿
248. 最可能导致急性肾衰竭的损伤是：()
- A. 脊柱骨折伴截瘫 B. 广泛 I 度烧伤
C. 挤压综合征 D. 急性腰肌劳损

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937146061051006040>