

# 危重孕产妇救治操作技能考试试题

## 一、单项选择题

1. 下列哪项处理正确：孕妇入院后20小时经硫酸镁解痉，心痛定降压等处理，胎动减少，NST 为无反应型，胎儿生物物理评分为5分() [单选题]\*
- A. 立即剖宫产结束妊娠 ✓
  - B. 次日复查 NST
  - C. 测血 E3、尿 E/C 比值
  - D. 吸氧观察
  - E. 立即行 OCT 检查
  - F. 立即行羊膜腔穿刺术
2. 应用硫酸镁治疗，最早出现的毒性反应是() [单选题]\*
- A. 心率减慢
  - B. 呼吸变慢
  - C. 尿量减少
  - D. 血压下降
  - E. 膝反射迟钝或消失 ✓
3. 出现镁酸中毒，首选的解毒剂是() [单选题]\*
- A. 咖啡因
  - B. 氯化钙
  - C. 硫代硫酸钠

D. 葡萄糖酸钙 ✓

E. 咯贝林

4. 关于产后出血的定义，下列哪项是正确的() [单选题]\*

A. 分娩过程中、出血量>500ml

B. 胎盘娩出后，阴道出血>500ml

C. 胎儿娩出后，24小时阴道流血>400ml

D. 胎儿娩出后，24小时之内阴道流血>500ml ✓

E. 产后24小时后产后42天，阴道流血>500ml

F. 剖宫产后2小时阴道出血>400ml

5. 与双胎妊娠不相关的() [单选题]\*

A. 国家地区、人种之间的差异

B. 家族史

C. 胎次多 ✓

D. 年龄史

E. 孕妇饮食过多

F. 易发生贫血

6. 双胎妊娠孕期的并发症不会出现() [单选题]\*

A. 早孕反应较重

B. 子宫增大速度快

C. 易并发妊娠高血压疾病

D. 不会出现胎盘早剥，前置胎盘 ✓

7. 26岁足月妊娠合并风湿性心脏病，心功能II级，胎头吸引助产，产后2小时阴道出血300mL， 心率

110次/分，双肺呼吸音清，宫底脐下2指。对该患者正确的治疗是() [单选题]\*

- A. 即刻开放静脉快速补液
- B. 即刻肌肉注射麦角新碱0.2mg
- C. 西地兰0.2mg+25%葡萄糖20mL 静脉推注
- D. 即刻肌肉注射催产素10u ✓
- E. 无感染者产后不加用抗生素

8. 促使心脏病孕妇死亡的主要原因() [单选题]\*

- A. 心脏病病程长
- B. 产程用力过度致心衰
- C. 年龄大
- D. 心衰与感染 ✓
- E. 产后哺乳致心衰

9. 妊娠合并心脏病恰当的是() [单选题]\*

- A. 总血容量于妊娠36~38周增加达高峰
- B. 行剖宫产或宫口开全后尽快协助经阴道分娩 ✓
- C. 心功能Ⅱ级易发生心力衰竭，不宜妊娠
- D. 发生产后出血，应快速输血
- E. 产时未发生心衰，产后通常不再发生心衰

10. 38岁，妊娠35周，从事家务劳动后胸闷、气喘、心悸，同时伴有夜间阵发性呼吸困难。查体：心率118次/分，呼吸22次/分，心界向左扩大，心尖部可闻及Ⅲ级收缩期杂音，粗糙，肺底有湿啰音，下肢水肿(+)，处理应是() [单选题]\*

- A. 限制食盐的摄入

- B. 加强产前检查
- C. 应控制心衰后剖宫产终止妊娠 ✓
- D. 应控制心衰后立即引产
- E. 内科处理控制心衰

11. 妊娠早期心脏病患者，决定是否连续妊娠的主要依据是() [单选题]\*

- A. 心脏病种类 ✓
- B. 孕妇的体重
- C. 胎儿大小
- D. 病变发生部位
- E. 患者年龄

12. 心脏病孕妇妊娠期间，最危险的时期是() [单选题]\*

- A. 妊娠35~36周
- B. 妊娠32-34周 ✓
- C. 妊娠24~27周
- D. 妊娠28-31周
- E. 产褥期7天

13. 28岁，初产妇，34周妊娠首次产前检查。下列哪项提示心脏病() [单选题]\*

- A. 心浊音界轻微扩大
- B. 妊娠晚期轻度憋气
- C. 双下肢水肿，休息后消退
- D. 心尖区柔和的收缩期杂音
- E. 一般劳动后心跳加快且感心悸 ✓

14. 一风湿性心脏病孕妇，26岁，病情稳定，心功能Ⅱ级，产妇临产入待产室，医生应考虑以下处理除

外() [单选题]\*

- A. 临产即用抗生素，至少维持至产后1周
- B. 可适当应用镇静剂
- C. 若非病情需要，不主张常规使用洋地黄预防心衰
- D. 产程进展慢，估计头盆不称可能时，早做剖宫产
- E. 产后出血较多时，尽量避免输血 ✓

15. 33岁初孕妇，现妊娠8周，近数日感心悸，夜间常因胸闷需要起床。休息时检查心率118次/分，呼吸23次/分，心界向左扩大，心尖部闻及舒张期杂音。肺底部有湿啰音，双下肢水肿。本例恰当处置应是() [单选题]\*

- A. 加强围生期监护直至产后
- B. 积极治疗控制病情，继续妊娠
- C. 立即终止妊娠
- D. 控制心衰后观察妊娠经过
- E. 控制心衰后终止妊娠 ✓

16. 孕早期合并心脏病患者，决定是否能继续妊娠的重要依据是() [单选题]\*

- A. 心脏病种类
- B. 心脏病变部位
- C. 心功能分级 ✓
- D. 症状严重程度
- E. 以往有否生育史

17. 国务院印发《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》的时间()。 [单选题]\*

A. 2021 年9月8日 ✓

B. 2021年 10月 1 日

C. 2021 年 8 月 8 日

D. 2021 年 8 月 26 日

18. 孕妇年龄( ), 为高危妊娠。[单选题]\*

A、 小于20岁或大于35岁

B、 小于19岁或大于40岁

C、 小于18岁或大于33岁

D、 小于18岁或大于35岁 ✓

19. 下列哪项高危因素属于橙色标识( )。[单选题]\*

A. 心率失常

B. 先兆早产

C. 再生障碍性贫血

D.哮喘 ✓

20. 下列哪一项不属于孕产妇妊娠风险筛查表阳性内容( )。[单选题]\*

A. RH 血型阴性

B. 生育间隔小于18个月

C. 血清铁蛋白小于30ng/L ✓

D. 血红蛋白小于110g/L

21. 卡前列素氨丁三醇24小时总量应小于( )。[单选题]\*

A.0.5mg

B.1.0mg

C.1.5mg

D.2.0mg ✓

E.2.5mg

22. 肺动脉高压的诊断标准：海平面状态下，静息时，右心导管检查肺动脉平均压(mPAP) 大于( )。

[单选题]\*

A.15mmHg

B.20mmHg

c.25mmHg ✓

D.30mmHg

E.35mmHg

23. 妊娠期高血压疾病，孕妇未并发器官功能损伤，酌情将血压应控制在( ) mmHg。 [单选题]

A.120-130/70-80

B.130-140/80-90

C.140-150/90-100✓

D.135-155/80-105

E.140-155/90-105

24. 冬眠合剂组成( ) [单选题]\*

A. 氯丙嗪25mg+ 哌替啶100mg+ 异丙嗪100mg

B. 氯丙嗪50mg+ 哌替啶50mg+ 异丙嗪50mg

C. 氯丙嗪50mg+ 哌替啶100mg+ 异丙嗪25mg

D. 氯丙嗪50mg+ 哌替啶50mg+ 异丙嗪100mg

E. 氯丙嗪50mg+ 哌替啶100mg+ 异丙嗪50mg ✓

25. 低钙摄入人群指：（ ）[单选题]\*

- A. 小于400mg/d
- B. 小于500mg/d
- C. 小于600mg/d ✓
- D. 小于700mg/d
- E. 小于800mg/d

26. （ ）是控制子痫和预防复发的首选药物。[单选题]\*

- A. 地西洋
- B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥钠
- D. 硫酸镁 ✓
- E. 冬眠合剂

27. 枕左前位胎头进入骨盆入口的衔接经线是：（ ）[单选题]\*

- A. 双颞径
- B. 双顶径
- C. 枕下前凶径
- D. 枕额径 ✓
- E. 枕颞径

28. 妊娠36周末子宫底高度：（ ）[单选题]\*

- A. 脐耻之间
- B. 脐上1指
- C. 脐上3指

D. 脐与剑突之间

E. 剑突下2横指 ✓

29. 最先进入母体骨盆的胎儿部分为：（ ）[单选题]\*

A. 胎方位

B. 胎先露 ✓

C. 胎产式

D. 骨盆轴

E. 产道

30. 前置胎盘最主要的症状：（ ）[单选题]\*

A. 妊娠晚期无痛性反复阴道出血 ✓

B. 多在妊娠早期出现阴道出血

C. 完全性前置胎盘通常出血量不多

D. 出血量与前置胎盘类型无关

E. 常易造成胎膜早破

31. 过期妊娠产妇需迅速终止妊娠的是：（ ）[单选题]\*

A. B超检查显示羊水平段4cm

B. 12小时胎动12次

C. 缩宫素激惹试验阴性

D. 无应激试验阴性

E. 尿雌三醇值为6mg/24h ✓

32. 关于胎膜早破的处理，正确的是：（ ）[单选题]\*

A. 期待疗法适用于孕28-35周不伴感染、羊水深度 $\geq 2$ cm者

- B. 一旦破膜应立即预防性使用抗生素
- C. 孕期达35周以上分娩发动，可令其自然分娩 ✓
- D. 胎膜早破均应选择剖宫产终止妊娠
- E. 妊娠小于37周者常规使用地塞米松促胎肺成熟

33. 胎儿血液循环系统哪条血管流动着静脉混合血( ) [单选题]\*

- A. 静脉导管
- B. 脐动脉
- C. 下腔静脉 ✓
- D. 主动脉
- E. 门脉

34. 关于骨盆内测量哪项是正确的( ) [单选题]\*

- A. 坐骨棘间径正常值 $<10\text{cm}$
- B. 对角径(DC) 正常值 $12.5\text{--}13\text{cm}$  ✓
- C. 坐骨切迹宽度约 $5.0\text{--}6.0\text{cm}$
- D. 真结合径正常值为 $10\text{cm}$
- E. 孕妇取仰卧位

35. 左枕头前位分娩，当胎肩径进入骨盆入口横径或左斜径时，胎头的动作是( ) [单选题]\*

- A. 拔露
- B. 仰伸 ✓
- C. 外旋转
- D. 内旋转
- E. 复位

36. 以下哪项不是重度子痫前期终止妊娠的指征；（ ）[单选题]\*

- A. 重度高血压不可控制
- B. 大量蛋白尿 ✓
- C. 心功能衰竭、肺水肿
- D. 完全性和部分性 HELLP 综合征
- E. 胎儿生长受限

37. 正常妊娠羊水最大量值位于妊娠哪周 （ ）[单选题]\*

- A. 28-32 周
- B. 32-34 周
- C. 34-36 周
- D. 36-38 周 ✓
- E. 36-37周

38. 妊娠合并再障孕妇死亡的主要疾病哪项应除外：（ ）[单选题]\*

- A. 颅内出血
- B. 充血性心力衰竭 ✓
- C. 败血症
- D. 严重的泌尿道感染
- E. 严重的呼吸道感染

39. 妊娠合并畸形阑尾炎在哪个时期多见：（ ）[单选题]\*

- A. 妊娠前6个月 ✓
- B. 妊娠8个月后
- C. 产褥期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/94613112012010050>