

---

## 医学三基（神经内科、精神科、康复科）-2021 年神经内科三基三严护士试题

1、以下不符合药物保管原则的是（）。

- A. 药应放在光线充足，但不宜阳光直射
- B. 各种药品分类保管
- C. 麻醉药及剧毒药应加锁，并进行交接班
- D. 内服药标签为红色边、外用药标签为蓝色边
- E. 药物保管、领取由专人负责，定期检查

2、备药时，须将药物研碎、溶解后再给予的是（）。

- A. 呕吐患者
- B. 发热患者
- C. 鼻饲患者
- D. 鼻出血患者
- E. 腹泻患者

3、自安瓿内吸取药液的方法错误的是（）。

- A. 将安瓿尖端药液弹至体部
- B. 用酒精棉签消毒安瓿颈部及砂轮
- C. 将砂轮在安瓿颈部划一锯痕，折断安瓿
- D. 将注射器针头斜面向下，放在安瓿内液面下
- E. 抽动活塞，进行吸药

4、臀大肌注射时患者侧卧的正确姿势是（）。

- A. 下腿伸直，上腿稍弯曲
- B. 两腿弯曲
- C. 上腿伸直，下腿稍弯曲
- D. 双膝向腹部弯曲
- E. 两腿伸直

5、为患者做皮内试验，最重要的准备工作是（）。

- A. 环境要清洁、宽阔
- B. 询问患者有无过敏史
- C. 备好 70%酒精及无菌棉签
- D. 选择合适的注射部位

E. 药量要准确

6、下列注射进针的角度错误的是（）。

A. 皮内：呈  $5^{\circ}$  角

B. 静脉：呈  $40^{\circ}$  角

C. 皮下：呈  $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$  角

D. 股静脉：呈  $45^{\circ}$  角

E. 肌内：呈  $90^{\circ}$  角

7、上臂肌肉注射的部位是（）。

A. 三角肌下缘 2~3 横指

B. 上臂外侧肩峰下 2~3 横指

C. 三角肌上缘 2~3 横指

D. 肱二头肌下缘

E. 上臂内侧肩峰下 2~3 横指

8、亚急性细菌性心内膜炎作血培养时，采血标本最适宜的时间应在

（）。

- A. 发热时，抗生素应用前
- B. 发热前，抗生素应用后
- C. 发热后，抗生素应用后
- D. 任何时间
- E. 发热时，抗生素应用后

9、对接受青霉素治疗的患者，如果停药（）以上，必须重新做过敏试验。

- A. 1 天
- B. 2 天
- C. 3 天
- D. 4 天
- E. 5 天

10、破伤风抗毒素脱敏注射方法，正确的是（）。

- A. 分 3 次注射，剂量逐渐递减
- B. 分 3 次注射，剂量逐渐递增
- C. 分 4 次注射，剂量逐渐递减

D. 分 4 次注射，剂量逐渐递增

E. 分 5 次注射，剂量逐渐递减

11、青霉素过敏试验可疑阳性患者作对照试验，选择（）。

A. 利多卡因

B. 5%葡萄糖溶液

C. 注射用水

D. 5%葡萄糖盐水

E. 0.9%氯化钠溶液

12、皮内碘过敏试验引起的阳性反应，其表现是（）。

A. 面色苍白，口唇发绀

B. 口腔粘膜充血水肿

C. 胸闷、呼吸困难

D. 脉搏细弱、呼吸困难

E. 局部红肿、硬结，直径大于 1cm

13、护士对需长期注射胰岛素的患者进行健康教育，下列说法不妥的

是（）。

- A. 不可在发炎、有疤痕、硬结处注射
- B. 在上臂三角肌处注射
- C. 行皮下注射，进针角度  $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$  角
- D. 注射区皮肤要消毒
- E. 进针后抽吸无回血，推药

14、以下不是静脉注射操作的是（）。

- A. 止血带扎在穿刺点上方 6cm 处
- B. 进针前左手固定皮肤，右手持针穿刺
- C. 见回血，立即松拳，松止血带，松调节器
- D. 固定针头，缓慢注药
- E. 拔针时，干棉签按压

15、输液引起静脉炎时局部湿热敷宜用（）。

- A. 70%乙醇
- B. 25%硫酸镁
- C. 50%硫酸镁

D. 生理盐水

E. 20%乙醇

16、总输液余量为 600ml，须维持 6h 再进行第二日治疗，滴度系数

15gtt/ml，应调节滴速为（）。

A. 15gtt/s

B. 20gtt/s

C. 25gtt/s

D. 30gtt/s

E. 40gtt/s

17、空气栓塞致死的原因是气栓阻塞（）。

A. 肺静脉入口

B. 下腔静脉入口

C. 主动脉入口

D. 肺动脉入口

E. 颈动脉入口

18、因输液不慎，空气进入静脉，此时应立即采取（）。

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 仰卧中凹位
- D. 头高足低位
- E. 头低足高位

19、能降低血液粘稠度，改善微循环的溶液是（）。

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 0.9%氯化钠
- C. 中分子右旋糖酐
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 5%葡萄糖氯化钠溶液

20、一般成人每小时输液量以（）为宜。

- A. 80~160ml
- B. 160~240ml
- C. 240~320ml



D. 320~400ml

E. 400~500ml

21、上午 8:30 开始输液 1500ml, 滴数为 50 滴/分, 滴度系数 15gtt/ml,

输完时间为 ( )。

A. 下午 3: 00

B. 下午 3: 30

C. 下午 4: 00

D. 下午 4: 30

E. 下午 5: 00

22、急性肺水肿患者给氧的要求是 ( )。

A. 1~2L/min 给氧

B. 2~3L/min 给氧

C. 4~5L/min 给氧

D. 6~8L/min 给氧

E. 8~10L/min 给氧

23、输血 2000ml，应 10%补葡萄糖酸钙（）。

A. 5ml

B. 10ml

C. 15ml

D. 20ml

E. 25ml

24、输血时患者出现腰背剧痛，尿呈酱油色，应立即（）。

A. 减慢点滴速度

B. 取端坐位

C. 停止输血

D. 加压给氧

E. 以上都不对

25、给药的目的有（）。

A. 治疗疾病

B. 预防疾病

C. 协助诊断

D. 减轻症状

E. 维持正常生理功能

26、下列有关注射的外文缩写正确的是（）。

A. IM——肌内注射

B. ID——皮下注射

C. H——皮内注射

D. IV——静脉注射

E. IVgtt——静脉滴注

27、倒取药液方法，哪些正确（）。

A. 药片用药匙取药，溶液用量杯量取

B. 不足 1ml 药液用滴管

C. 倒药液入量杯，视线高于拇指所指量杯刻度

D. 二种药液可同置一药杯内

E. 先配水剂及油剂，后摆固体药物

28、注射器及针头的哪些部分手不可接触（）。

A. 针尖

B. 针梗

C. 乳头

D. 针栓

E. 活塞

29、肌肉注射部位，错误的是（）。

A. 臀大肌

B. 臀中肌

C. 臀小肌

D. 腹外侧肌

E. 上臂三角肌下缘

30、肘部的常用静脉有（）。

A. 贵要静脉

B. 正中静脉

C. 头静脉

D. 手背静脉

E. 颈外静脉

31、不属于医嘱内容的是（）。

A. 给药途径

B. 护理级别

C. 药物剂量

D. 生理盐水

E. 测量生命体征的方法

32、应抄写在临时医嘱栏内的医嘱是（）。

A. 流质

B. 一级护理

C. 安定 5mgHs

D. 测 Bp qd × 3 天

E. 半坐卧位

33、医疗文件书写要求不正确的是（）。

A. 记录及时，准确

B. 内容简明扼要

C. 医学术语运用确切

D. 眉栏、页码必须填写完整

E. 有错误应用红笔写“注销”二字，并签名

34、床头交接班的主要内容是（）。

A. 对所有患者进行护理查房

B. 交接患者出入院的情况

C. 检查病房卫生情况

D. 交待危重患者病情

E. 征求患者和家属的意见

35、重整医嘱错误的是（）。

A. 长期医嘱单超过 3 页

B. 在原医嘱最后一栏用红笔划一横线

C. 书写字迹清楚，准确

D. 按原医嘱日期、时间顺序抄录

E. 手术转科需重整医嘱

36、临时备用医嘱的有效期是（）。

- A. 6h
- B. 8h
- C. 10h
- D. 12h
- E. 24h

37、病区交班报告记录的顺序，首先是（）。

- A. 危重患者
- B. 手术患者
- C. 死亡患者
- D. 新入院患者
- E. 离开病区的患者

38、最有利于患者的护理工作交班方法是（）。

- A. 简要书面交班
- B. 详细书面交班

C. 床边交班

D. 口头交班

E. 无重病员可不交班

39、体温单 40~42℃之间填写的内容，不正确的是（）。

A. 入院时间

B. 患病时间

C. 手术时间

D. 转科时间

E. 死亡时间

40、执行医嘱正确的是（）。

A. 一般情况下可执行口头医嘱

B. 医嘱须经医生签字方为有效

C. 医嘱须隔日仔细核对一次

D. 需下一班执行的医嘱书面注明即可

E. 以上都不对



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958051036140006033>