
2020年青海省《肿瘤内科学》模拟卷

考试须知：

- 1、考试时间：180 分钟。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的地方填写您的答案。
- 4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。
- 5、答案与解析在最后。

姓名：_____

考号：_____

得分	评卷人

一、A1(共 30 题)

1. 下列属于良性肿瘤的是()。
 - A. 脂肪母细胞瘤
 - B. 视网膜母细胞瘤
 - C. 肾母细胞瘤
 - D. 髓母细胞瘤
 - E. 神经母细胞瘤
2. 下列不属于早期食管癌临床表现的是()。
 - A. 食管内异物感
 - B. 食物停滞感
 - C. 进食时胸骨后烧灼感
 - D. 进食时胸骨后不适或疼痛
 - E. 进行性吞咽困难
3. 下列癌细胞的生物学特性中,恶性肿瘤的重要标志是()。

-
- A. 自主性
- B. 侵袭性和转移性
- C. 自愈性
- D. 去分化或异常分化
- E. 可移植性
4. 下列关于肾细胞癌影像学检查的描述中正确的是()。
- A. 腹部X线平片见肾影增大,可见钙化影
- B. 静脉肾盂造影的结果有助于与肾囊肿的鉴别
- C. B超对肾癌的诊断准确性接近CT
- D. B超、CT、MRI的检查结果有助于与肾血管平滑肌脂肪瘤鉴别
- E. 在静脉肾盂造影中,肾盏受压,变形或移位
5. 不属于非甾体类抗炎镇痛药的是()。
- A. 对乙酰氨基酚
- B. 布洛芬
- C. 舒尔芬
- D. 塞来昔布
- E. 双氯芬酸钠
6. 儿童早期霍奇金病的治疗方案为()
- A. 单独病变区放疗
- B. 单独化疗
- C. 全淋巴结照射
- D. 次全淋巴结照射
- E. 足量化疗+病变区放疗
7. I期精原细胞瘤的治愈率可达()。
- A. 85%

B. 98%

C. 90%

D. 95%

E. 93%

8. 放疗联合同步化疗相对于单纯放疗, 主要优点是()。

A. 提高治疗强度

B. 明显降低远转率

C. 提高肿瘤局部区域控制率

D. 明显降低治疗毒性

E. 明显降低放疗剂量

9. 直肠癌最简单、而又能获得诊断重要诊断信息的诊断方法为

A. 钡剂灌肠X线检查

B. 直肠指诊

C. 纤维结肠镜检查

D. CEA测定

E. 磁共振检查

10. 下列关于抑癌基因的叙述, 错误的是()。

A. 可诱导细胞凋亡

B. 能抑制细胞过度生长

C. 突变后可导致肿瘤形成

D. 能抑制细胞的分化

E. 最早发现的是Rb基因

11. 晚期非小细胞肺癌患者接受克唑替尼治疗的疗效预测因素有()。

A. EGFR突变

B. ALK基因重排

-
- C. Her-2过表达
- D. K-ras突变
- E. CD20阳性
12. 下列关于肝癌叙述错误的是()。
- A. AFP阴性能够除外原发性肝癌的诊断
- B. 肝肿大是最常见的体征
- C. 多以肝区疼痛为首发症状
- D. 早期施行手术仍是最有效的疗法
- E. AFP定量 $>400\text{ng/ml}$ 并有影像学证据能够确诊
13. ()来源的非霍奇金淋巴瘤最常见。
- A. T细胞
- B. 组织细胞
- C. NK细胞
- D. B细胞
- E. Langerhans细胞
14. Rituximab可用于治疗()
- A. 淋巴母细胞淋巴瘤
- B. HD
- C. 外周T细胞淋巴瘤
- D. 低度恶性B细胞NHL
- E. 小无裂细胞型淋巴瘤
15. 脑转移瘤好发部位是()。
- A. 皮髓交界部位
- B. 皮质部位
- C. 脑室周围

-
- D. 髓质部位
- E. 以上都不对
16. 食管癌, 距门齿18Cm, 左锁骨上可能有一枚直径1.5Cm质硬淋巴结, 其分期应属于()。
- A. I期
- B. IIb期
- C. IIa期
- D. III期
- E. IV期
17. Her-2/neu过度表达的乳腺癌占有所有乳腺癌的()。
- A. 10%
- B. 10%~20%
- C. 20%~30%
- D. 30%~50%
- E. 60%以上
18. 肝癌的临床表现中, 提示属于晚期的表现是()。
- A. 腹胀、乏力
- B. 肝区疼痛
- C. 肝区肿块
- D. 食欲不振
- E. 体重下降
19. ()又称为肿瘤患病率。
- A. 一定时间内, 某特定人群中某种恶性肿瘤新发病例出现的频率
- B. 特定人群中某种肿瘤新旧病例数所占的比例
- C. 一定时间内, 特定人群中某种肿瘤新旧病例数所占的比例
- D. 某特定人群中某种恶性肿瘤新发病例出现的频率

-
- E. 以上均不是
20. 慢性粒细胞白血病和类白血病反应的鉴别最有意义的是()。
- A. PH染色体阳性
 - B. 周围血中出现幼红
 - C. 周围血中血小板减少
 - D. 嗜酸粒细胞增多
 - E. 中性粒细胞碱性磷酸酶积分减少
21. ()对鳞癌的治疗效果较好。
- A. 噻替哌
 - B. 氟尿嘧啶
 - C. 环磷酰胺
 - D. 博来霉素
 - E. 丝裂霉素
22. 下列骨肿瘤青少年罕见的是()。
- A. 软骨母细胞瘤
 - B. 骨样骨瘤
 - C. 软骨肉瘤
 - D. 尤文肉瘤
 - E. 骨肉瘤
23. 下列属于大肠癌化疗的标准方案的是()。
- A. FP
 - B. LV/5-FU
 - C. A0
 - C. CHOP
 - E. FOLFOX

24. 进展期胃癌按照Bormann分型中BorrmanIII型又称()。

- A. 结节型
- B. 溃疡浸润型
- C. 溃疡局限型
- D. 弥漫浸润型
- E. 溃疡型

25. 骨软骨瘤好发好发部位在()。

- A. 扁平骨
- B. 不规则骨
- C. 长骨干骺端
- D. 指骨干骺端
- E. 长骨骨干

26. 下列关于异位激素肿瘤的描述不正确的是()。

- A. 肺癌可产生异位激素
- B. 胰腺癌可产生异位激素
- C. 肾癌不产生异位激素
- D. 肉瘤可产生异位激素
- E. 肝癌可产生异位激素

27. ()是作用于M期的周期特异性抗肿瘤药。

- A. 氟尿嘧啶
- B. 丝裂霉素
- C. 塞替派
- D. 环磷酰胺
- E. 长春新碱

28. 下列关于骨软骨瘤的治疗错误的是()。

-
- A. 肿瘤生长过快可切除
 - B. 一般均需手术
 - C. 肿瘤影响功能可切除
 - D. 肿瘤恶变应尽早手术
 - E. 肿瘤过大可切除

29. 对恶性肿瘤采取综合治疗最主要的理由是()。

- A. 恶性肿瘤是一种全身性疾病
- B. 有多种抗肿瘤方法可供选用
- C. 肿瘤细胞动力学需要
- D. 根据患者要求
- E. 综合治疗主要用于晚期恶性肿瘤

30. ()可以较准确的检查腹腔和盆腔的淋巴瘤。

- A. B超
- B. X线片
- C. 剖腹探查
- D. 淋巴造影
- E. CT

二、A2(共 20 题)

31. 患儿,男,2岁,发热:腿疼痛。CT示:右上腹可见不规则肿物影,少许钙化。X线片示:骨盆多发虫蛀样破坏区。最可能诊断为()。

- A. 恶性畸胎瘤
- B. 内胚窦瘤
- C. 神经母细胞瘤
- D. 淋巴瘤
- E. 肝母细胞瘤

32. 患者, 女性, 72岁, 被临床医生作为判断胰腺癌术后复发, 下面列出的()肿瘤标志物是最容易的参考。

A. CA-125

B. CA-242

C. CA-50

D. CA-153

E. CA19-9

33. 患者, 女性, 42岁, 下腹触及肿块5个月, 并有月经不规则。近3年来, 经常感觉胃区不适。妇科查体: 子宫正常大小, 活动, 无压痛, 双附件均触及实性包块, 呈肾形, 约孕2个月子宫大小, 活动, 其诊断可能是()。

A. 卵巢颗粒细胞瘤

B. 胚胎性瘤

C. 库肯勃瘤

D. 黄素囊肿

E. 卵巢囊腺瘤

34. 患者, 男性, 72岁, 无痛性肉眼血尿3个月, 膀胱镜检查提示膀胱三角区右3Cm团块, 双合诊检查: 肿物坚硬, 诊断为膀胱浸润性癌。患者一般情况良好, 最佳的治疗方案是

A. 膀胱全部切除及回肠膀胱术

B. 回肠膀胱术

C. 膀胱全部切除及输尿管皮肤造口术

D. 膀胱部分切除术

E. 放射治疗后行膀胱全部切除及回肠膀胱术

35. 患者, 女性, 35岁, 诊断为绒毛膜细胞癌, 拟行化疗, 下列不是一线化疗药物的是()。

A. MTX

B. ACt-D

C. ADM

D. CTX

E. KSM

36. 患者, 女性, 34岁, 临床诊断为脑转移瘤, 最有可能的原发灶部位是()。

A. 肺癌

B. 结直肠癌

C. 黑色素瘤

D. 乳腺癌

E. 甲状腺癌

37. 患者, 女性, 60岁, C扫描显示右下肺叶一直径2Cm的结节, 密度较淡伴胸膜皱缩和毛刺, 肺门上纵隔淋巴结肿大, 直径2Cm, 同侧胸腔积液多次胸穿为血性, 细胞学检查(-)性, 按UCC分期为()。

A. T₁N₀M₀

B. T₃N₃M₀

C. T₁N₀M₀

D. T₃N₀M₀

E. T₄N₁M₁

38. 患者, 女性, 36岁, 因“鼻塞伴头痛1年”就诊, 鼻咽镜检查发现右侧鼻咽部黏膜隆起明显, 行活检明确为鼻咽腺样囊性癌, 下面说法正确的是()。

A. 鼻咽腺样囊性癌倾向于局部浸润生长, 较鼻咽低分化鳞癌更容易出现局部淋巴结转移

B. 该患者应该进一步行相关检查(如CT/MR)明确分期, 如局部病变范围广, 放疗仍然是主要的治疗手段

C. 该类型鼻咽癌多数对放疗不敏感, 所以该患者应该以手术+化疗的模式治疗

D. 由于该类型放疗所需总剂量高, 一般要达到80Gy左右, 因此选择IMRT治疗更有利于保护重要组织器官, 同时在射野上尽量避开脑神经及其走行部位

E. 腺样囊性癌预后极差, 绝大部分患者在确诊后1年死亡

39. 患者, 男性, 74岁, 无痛性肉眼血尿2个月, 膀胱镜检查见膀胱右侧壁有一个3.0Cm×2.5Cm×2.0Cm大小乳头状新生物, 膀胱部分切除术后发现病变已侵犯膀胱壁浅肌层这

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968041053010006037>