

## 军队文职人员招聘护理学(习题卷2)

第1部分：单项选择题，共238题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题] 关节受损的类型不包括：

- A) 单关节发病
- B) 少关节发病
- C) 对称关节发病
- D) 有时也可以累及无滑膜的关节

答案:D

解析:

2. [单选题] 对类风湿结节描述错误的是：

- A) 类风湿结节是RA的一个最具特征的关节外病理损害
- B) 最常见于前臂受压的伸面
- C) 几乎所有伴有类风湿结节的RA病人均为RF阳性
- D) 类风湿结节形成初期的组织形态不具有肉芽组织的特征

答案:D

解析:

3. [单选题] 空气 物体表面 医护人员手cfu/m<sup>3</sup> cfu/cm<sup>2</sup> cfu/cm<sup>2</sup> A. - ≤15 ≤15

- A) ≤500 ≤10 ≤10
- B) ≤10 ≤5 ≤5
- C) ≤200 ≤5 ≤5
- D) 儿科病房( )

答案:B

解析:

4. [单选题] 病人肠外营养10天后出现皮肤干燥、脱发、伤口愈合缓慢，应考虑：

- A) 液体补充不足
- B) 脂肪酸缺乏
- C) 微量元素缺乏
- D) 水电解质紊乱

答案:B

解析:

5. [单选题] A. 急性喉炎

- A) 中耳炎
- B) 两者均是
- C) 两者均否
- D) 喉头梗阻的常见原因有( )

答案:A

解析:

6. [单选题] A. 血清中酯型胆红素增多

- A) 血清中非酯型胆红素增多
- B) 两者均有
- C) 两者均无

D)阻塞性黄疸病人早期( )

答案:A

解析:

7.[单选题]在大部分慢性肾脏疾病肾功能不全时,高血压的主要原因是:

A)血浆肾素活性增高

B)钠水潴留

C)前列腺素分泌减少

D)儿茶酚胺分泌过多

E)血管舒缓素分泌减少

答案:B

解析:

8.[单选题]男性,20岁,因阑尾炎穿孔行阑尾切除术后1周,体温仍在38~39℃,腹胀腹痛,尿频,大便次数多。首先考虑

A)膈下脓肿

B)肠间脓肿

C)盆腔脓肿

D)脾破裂

E)胃十二指肠穿孔

答案:C

解析:

9.[单选题]对支气管哮喘患者作保健指导,下列哪项是错误的

A)避免进食可能致敏的食物(如鱼、虾、蛋)

B)避免刺激性气体吸入

C)居室应美化,适当放置花、草、地毯

D)避免过度劳累或情绪激动等诱发因素

E)气候变化时注意保暖,避免呼吸道感染

答案:C

解析:

10.[单选题]关于肾血流动力学异常在缺血所致急性肾小管坏死的发病机制中,下列哪项是最主要的机制:

A)肾皮质血流量减少,肾髓质充血

B)肾血浆流量下降,肾内血流重新分布

C)血管收缩因子(内皮素)产生过多,舒张因子(NO)产生相对过少

D)肾内肾素-血管紧张素系统兴奋

E)肾内舒张血管性前列腺素合成减少,缩血管性前列腺素产生过多

答案:C

解析:

11.[单选题]患者女,36岁。颈前弥漫性肿大,疑为甲亢。下列检查对诊断意义不大的是

A)基础代谢率

B)甲状腺摄

**131**

I 率测定

C)声带检查

D)颈部X线

E)测血肌酐

答案:E

解析：基础代谢率测定是诊断甲亢的一种辅助检查：正常值为±10%，+20%~+30%为轻度甲亢，+20%~+60%为中度甲亢，+60%以上为重度甲亢，故不选A。甲状腺摄

131

I 率测定也是甲亢诊断的辅助检查，若摄

131

I 率增高，24小时内超过总量的50%，且吸收

131

I 高峰较早出现，可提示有甲亢，故不选B。甲亢可引起喉返神经损伤，会发生两侧声带麻痹，引起失音或呼吸困难，甚至窒息。声带检查是可以诊断甲亢术后是否并发喉返神经损伤的辅助检查，故不选C。颈部X线可显示甲状腺肿大是否使气管受压变形或移位，故不选D。临床上检测血肌酐是常用的了解肾功能主要的方法之一，对甲亢没有诊断意义，故选E。解题关键：甲状腺功能亢进的辅助检查：基础代谢率测定、血清T

3

、T

4

测定、甲状腺摄

131

I 率测定、B超、X线、核素扫描、声带检查等。

12. [单选题]A. 口苦、咽痛、恶心

A) 暂时性呼吸抑制

B) 室性期前收缩、室颤或传导阻滞

C) 面色潮红、搏动性头痛

D) 昏迷和尿潴留

E) 碘解磷定注射速度过快可出现

答案:B

解析：出现瞳孔扩大、神志模糊、烦躁不安、抽搐、昏迷和尿潴留等，提示阿托品中毒，应停用阿托品。碘解磷定剂量过大时可出现口苦、咽痛、恶心；碘解磷定注射速度过快可出现暂时性呼吸抑制；双复磷用量过大可引起室性期前收缩、室颤或传导阻滞。

13. [单选题]指导患者服药时，下列哪种说法不恰当

A) 健胃药应在饭前服用

B) 服用强心苷类药物前应测呼吸

C) 服用磺胺类药物后宜多饮水

D) 服用铁剂禁忌饮茶

E) 服用止咳糖浆后不宜饮水

答案:B

解析：服用强心苷类药物前测脉率及节律。

14. [单选题]类风湿关节炎缓解期护理最重要的是

A) 预防感染

B) 避免疲劳

C) 避免精神刺激

D) 避免寒冷、潮湿

E) 指导医疗体育锻炼

答案:E

解析：【考点】类风湿关节炎的护理【精析】类风湿关节炎急性期后应预防关节失用：为保持关节功能，防止关节畸形和肌肉萎缩，护士应指导患者锻炼，在症状基本控制后，鼓励患者及早下床活动，指导患者及家属正确使用辅助性器材

，避免长时间不活动。【避错】本题部分考生易选B，认为类风湿关节炎缓解期仍应以休息为主，应避免疲劳，由于类风湿关节炎急性期后应预防关节失用，因此，缓解期应以功能锻炼为主。因此，本题选E。

15. [单选题]采集传染性非典型肺炎患者急性期血样，最迟不晚于发病后( )

- A) 2天
- B) 12天
- C) 7天
- D) 10天
- E) 4天

答案:C

解析:

16. [单选题]A. 瞳孔无变化

- A) 瞳孔扩大
- B) 眼前黑幕感
- C) 视物变形
- D) 瞳孔变形，缩小
- E) 急性虹膜睫状体炎的临床特点之一( )

答案:E

解析:

17. [单选题]患者男，64岁。反复咳嗽、咳痰10余年，近两年来劳累后心悸、气促。入院时发绀明显，呼吸困难，应取

- A) 仰卧位
- B) 侧卧位
- C) 头高足低位
- D) 端坐位
- E) 膝胸位

答案:D

解析:该患者反复咳嗽、咳痰10余年，入院时发绀明显，呼吸困难，应采取端坐位。由于重力作用，部分血液滞留于下肢和盆腔，使回心血量减少，从而减轻肺淤血和心脏负担；同时可使膈肌位置下降，胸腔容量扩大，减轻腹腔内脏器对心肺的压力，肺活量增加，有利于气体交换，使呼吸困难的症状得到改善。故答案为D。

18. [单选题]十二指肠溃疡压痛点位于

- A) 在心尖区
- B) 剑突右侧或下方
- C) 右肋下
- D) 左季肋下
- E) 剑突右侧

答案:B

解析:

19. [单选题]血红蛋白尿呈

- A) 洗肉水样
- B) 酱油色
- C) 深黄色
- D) 白色
- E) 鲜黄色

答案:B

解析:大量红细胞在血管内被破坏，形成血红蛋白尿，呈酱油色或浓茶色，见于溶血反应，恶性疟疾和阵发性睡眠性血红蛋白尿。

20. [单选题]下述甲状腺疾病中，哪项必须手术

- A) 结节性甲状腺肿，继发性甲亢
- B) 轻度原发性甲状腺机能亢进
- C) 青春期甲状腺肿
- D) 妊娠早期甲状腺肿
- E) 青少年甲亢

答案:A

解析:

21. [单选题]下列情况中，允许在医疗机构从事规范护理活动的人员是

- A) 护理学硕士研究生毕业未取得护士执业证书的护士
- B) 工作5年，因故吊销执业证书的护士
- C) 中断护理执业活动1年的护士
- D) 护士执业注册有效期满未继续注册的护士
- E) 取得执业证书3年，后出国留学1年再次返回原医院的护士

答案:E

解析:

22. [单选题]护士为患急性乳腺炎的产妇讲解该病的主要病因是

- A) 营养不良
- B) 乳汁淤积
- C) 乳头过小或内陷
- D) 哺乳经验不足
- E) 乳汁分泌障碍

答案:B

解析:淤积的乳汁为细菌的生长繁殖提供了有利条件。

23. [单选题]患者男性，28岁，自述突然心悸、胸闷，听诊心率200次/分，心律齐，血压正常，用心电示波监护该患者时，荧光屏上突然出现完全不规则的大波浪状曲线，且QRS波与T波消失，你考虑该患者为下列哪种情况

- A) 心力衰竭
- B) 二尖瓣狭窄
- C) 心室颤动
- D) 心房颤动
- E) 窦性心动过速

答案:C

解析:【考点】心室颤动临床表现、辅助检查机诊断【精析】不规则大波浪曲线，QRS波与T波消失，为室颤心电图表现。心电图检查一般不用于心力衰竭的诊断，此时常用超声心动图。二尖瓣狭窄心电图表现可有“二尖瓣型P波”，P波宽度 $>0.12$ 秒，伴切迹，Pv1终末负性向量增大。QRS波群示电轴右偏和右心室肥厚表现，所以也不是正确答案。房颤心电图表现主要是P波消失，代之以小而规则的基线波动，形态与振幅均变化不定，称为f波。故本题应选C。【避错】本题考生根据题干中心率200次/分和QRS-T波群的特点，就应该在C和D项中选，心室颤动的频率在150~500次/分，QRS-T波群完全消失。心房颤动，心室频率通常可在100~160次/分，QRS-T波形态正常。

24. [单选题]上运动神经元性瘫痪和下运动神经元性瘫痪的临床表现的差别，不包括

- A) 有无肌萎缩
- B) 肌张力的改变
- C) 腱反射的改变
- D) 有无病理反射
- E) 是否合并意识障碍

答案:E

解析:1) 上运动神经元瘫痪特点 由于皮质运动区及下行的锥体束较集中地支配肌群，故病损常导致整个肢体瘫痪，一侧肢体瘫痪；双侧病变可引起双下肢瘫痪或四肢瘫，患肢肌张力增高，腱反射亢进，浅反射减弱或消失，出现病理反射

，无肌萎缩和肌束震颤，但长期瘫痪后可见失用性肌萎缩，肌电图显示神经传导速度正常，无失神经电位。2) 下运动神经元瘫痪特点 瘫痪肌肉的肌张力降低，腱反射减弱或消失（下运动神经元损伤使单突触牵张反射中断），肌萎缩早期（约数周）出现（前角细胞的肌营养作用障碍），可见肌束震颤，无病理反射，肌电图显示神经传导速度减低和失神经电位故不包括是否合并意识障碍。

25. [单选题]当个人难以对付压力时，可考虑

- A) 自我评估
- B) 正确对待情感
- C) 承认现实
- D) 对抗压力的生理影响
- E) 利用可能的支持力量

答案:E

解析:

26. [单选题]吸入麻醉药的主要排出途径

- A) 肾
- B) 肝
- C) 皮肤
- D) 呼吸道
- E) 胆汁

答案:D

解析:

27. [单选题]老年患者外伤致右Colles骨折。骨折对位对线良好，并有嵌插，该患者应选择哪项治疗:

- A) 牵引治疗
- B) 对症治疗
- C) 手术治疗
- D) 消肿治疗
- E) 夹板固定或石膏固定

答案:E

解析:

28. [单选题]患者男性，52岁。左肺根治性手术后当日胸管引流50ml血性液，次日胸管内突然引流出暗红色液100ml，患者心率血压无明显改变，以下说法正确的是

- A) 活动性出血
- B) 陈旧性出血
- C) 切口裂开
- D) 切口渗血
- E) 缝线脱落

答案:B

解析:胸腔手术后，胸管内每小时血性引流液持续超过100ml才提示有活动性出血，根据该患者引流出液体颜色及患者生命体征无明显改变，可知出血为陈旧性。

29. [单选题]患者男性，31岁。空腹或夜间上腹部烧灼感10年，2小时前进食后突感上腹部剧烈刀割样疼痛，很快遍及全腹，伴恶心、呕吐。查体：腹式呼吸消失，板状腹，全腹压痛、反跳痛，肝浊音界消失，移动性浊音(+)，肠鸣音消失。该患者应立即采取的最佳措施是

- A) 禁食、禁饮、持续胃肠减压、洗胃
- B) 给予镇痛镇静剂
- C) 给予抗生素治疗
- D) 急诊手术
- E) 输液

答案:D

解析:分析题干信息:①患者有胃十二指肠溃疡病史;②于某一时间点突感明确的刀割样剧烈疼痛;③继而出现弥漫性腹膜炎的症状,初步推知患者发生了溃疡急性穿孔。而对于年轻、溃疡病史较短,症状和体征较轻的空腹穿孔病人,可采用胃肠减压、输液及抗生素等保守治疗,对于症状和体征较重的患者应立即行急诊手术治疗,该患者症状和体征重,已不适宜非手术治疗,必须急诊手术。

30. [单选题]男性,36岁,工作中突然出现右上腹疼痛,12小时后出现上腹疼痛,腹胀,向腰背部放散,豆油色尿,最可能的诊断是

- A) 急性胆囊炎
- B) 急性胰腺炎(胆源性)
- C) 肾绞痛
- D) 高位阑尾穿孔
- E) 肠系膜血管栓塞

答案:E

解析:

31. [单选题]中心性肺癌与肺门淋巴结结核鉴别,最好的手段是

- A) 支气管造影
- B) 有无浅表淋巴结肿大
- C) 结核菌素试验
- D) X线胸片
- E) 纤维支气管镜检查

答案:E

解析:

32. [单选题]A. 三腔两囊管压迫

- A) 肝固有动脉结扎及胆总管引流术
- B) 胃大部切除术
- C) 肝叶切除术
- D) 肝固有动脉结扎术
- E) 肝癌自发性破裂出血,无法切除时可采用

答案:E

解析:肝癌自发性破裂出血,无法切除时可行肝固有动脉结扎术或动脉栓塞术,故第1题选E。肝左外叶严重撕裂伤直接行肝叶切除术,第2题选D。三腔两囊管压迫适用于门脉高压症的止血,胃大部切除术用于治疗胃溃疡,肝固有动脉结扎及胆总管引流术适合肝内胆管出血、肝动脉有震颤或多处出血难定位者。解题关键:手术方案的选择需要综合评定患者的病情,如对于癌症患者的肝血管出血可行姑息手术,单纯肝叶损伤可行肝叶切除术等。

33. [单选题]女性,17岁,反复中上腹部饥饿痛、返酸1年余,再发4周、排柏油样黑便4次。体检:中度贫血外观,中上腹部压痛,肠鸣音活跃。为明确诊断,首选的检查手段是:A. X线钡餐检查B. 胃镜检查

- A) 血常规
- B) 腹部
- C) 超检查
- D) 粪O
- E) 检查

答案:B

解析:

34. [单选题]患者,男,39岁,因车祸导致头部外伤,入院后经抢救无效死亡。护士为其作尸体护理,以下操作哪项不妥

- A) 在大病房内应用屏风遮挡
- B) 劝慰家属离开病房



C) 撤去被褥枕头，放平尸体。

D) 用棉球填塞各个孔道

E) 伤口更换清洁敷料

答案:C

解析:尸体护理时将床支架放平.使尸体仰卧,头下置一软枕,防止面部淤血变色。若撤去被褥枕头,放平尸体,有可能导致淤血变色,影响外观。故本题选C。

35. [单选题]男性,34岁,计算机工程师,近期感觉久坐后下肢沉重酸胀,容易疲劳。护士指导其在工作期间定时活动下肢,以促进下肢血液循环,其原因是利用

A) 小腿肌泵收缩功能

B) 胸腔吸气期负压

C) 心脏舒张期负压

D) 静脉瓣膜向心单向开放

E) 地心对血柱的吸引力

答案:A

解析:下肢静脉血液单向流入深静脉主要由于三方面的作用:一是在大、小隐静脉和交通静脉中均有静脉瓣膜向深静脉方向开放;二是心脏和胸腔产生的负压;三为下肢肌群收缩的挤压作用,此常被称为小腿肌泵功能。护士让病人活动下肢主要是指导其利用小腿肌泵功能促进静脉回流。故答案为A。

36. [单选题]下肢交通支瓣膜功能不全

A) Pratt试验 (+)

B) Perthes试验 (+)

C) Buerger试验 (+)

D) Trendelenberg试验 (+)

E) 指压试验 (+)

答案:A

解析:

37. [单选题]下列哪项不是扩张型心肌病的特征

A) 一侧或双侧心腔扩大

B) 充血性心力衰竭

C) 常伴有心律失常

D) 病死率较高

E) 女性多于男性

答案:E

解析:

38. [单选题]主要用于检查内痔、脱肛和直肠息肉等体位:

A) 肘膝位

B) 左侧卧位

C) 截石位

D) 蹲位

E) 弯腰前俯位

答案:D

解析:

39. [单选题]A.  $\leq 5\text{cfu/cm}$

2

A)  $\leq 10\text{cfu/cm}$

2



B)  $\leq 100\text{cfu} / \text{cm}$

2

C)  $\leq 200\text{cfu} / \text{cm}$

2

D)  $\leq 500\text{cfu} / \text{cm}$

2

E) 层流洁净手术室的空气菌落数应达到的标准是

答案:B

解析:医院感染环境污染监测的卫生学指标 I 类的空气  $\leq 10\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; II 类空气  $\leq 200\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; III 类空气  $\leq 500\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 10\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; IV 类物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 15\text{CFU}/\text{cm}^2$ 。故产房的物品表面菌落数应达到的标准是  $\leq 5\text{cfu} / \text{cm}$

2

医院感染环境污染监测的卫生学指标 I 类的空气  $\leq 10\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; II 类空气  $\leq 200\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; III 类空气  $\leq 500\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 10\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; IV 类物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 15\text{CFU}/\text{cm}^2$ 。故层流洁净手术室的空气菌落数应达到的标准是  $\leq 10\text{cfu} / \text{cm}$

2

医院感染环境污染监测的卫生学指标 I 类的空气  $\leq 10\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; II 类空气  $\leq 200\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; III 类空气  $\leq 500\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 10\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; IV 类物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 15\text{CFU}/\text{cm}^2$ 。故普通手术室的空气菌落数应达到的标准是  $\leq 200\text{cfu} / \text{cm}$

2

医院感染环境污染监测的卫生学指标 I 类的空气  $\leq 10\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; II 类空气  $\leq 200\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 5\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; III 类空气  $\leq 500\text{CFU}/\text{m}^3$ 、物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 10\text{CFU}/\text{cm}^2$ ; IV 类物体表面及医务人员手菌落数  $\leq 15\text{CFU}/\text{cm}^2$ 。故普通病房医务人员手的菌落数应达到的标准是  $\leq 10\text{cfu} / \text{cm}$

2

40. [单选题] 医疗护理实践中, 取得病人“知情同意”, 其实质是

- A) 尊重患者自主
- B) 不伤害患者自尊
- C) 保护患者隐私
- D) 医患双方平等
- E) 人权高于一切

答案:A

解析:

41. [单选题] 类风湿性关节炎的基本病理改变是:

- A) 滑膜炎
- B) T淋巴细胞大量增殖
- C) 炎症细胞浸润
- D) 免疫复合物沉积
- E) 关节骨性增生

答案:A

解析:

42. [单选题]宫颈癌的临床分期是根据：

- A) 有无淋巴转移
- B) 手术后所见修定分期
- C) 病理分期
- D) 病灶侵犯范围
- E) 临床症状的严重程度

答案:B

解析:@##

43. [单选题]与病人交谈时，可促进有效沟通的行为是

- A) 不随意打断病人的谈话
- B) 在人员嘈杂的环境与病人交谈
- C) 严格按自己拟订的提纲进行谈话
- D) 在交谈过程中始终保持沉默
- E) 当病人出现错误时及时纠正

答案:A

解析:

44. [单选题]下列关于取药，不正确的一项是

- A) 胶囊须用药匙取用
- B) 药液不足1ml时须用滴管计量
- C) 油剂用量杯计量后直接倒入药杯
- D) 同时服用几种液体药物时，应分别放置
- E) 先配固体药，再配水剂

答案:C

解析:C答案错在油剂应该倒入装有温水的药杯中不加的话油剂会站在杯子上面的，加了温水之后 因为油不溶于水的话油会漂浮在上面 使得吸收量是最大。

45. [单选题]关于皮肤用药的说法，下列哪项是正确的

- A) 软膏可用于急性皮炎伴渗出的情况
- B) 溶液不宜用于急性皮炎伴大量渗出的情况
- C) 粉剂主要用于急性或亚急性皮炎而无渗液的创面
- D) 糊剂不宜用于亚急性皮炎伴轻度糜烂者
- E) 乙醇搽剂可用于口腔及黏膜部位

答案:C

解析:

46. [单选题]Osler结见于：

- A) 急性风湿热
- B) 系统性红斑狼疮
- C) 急性病毒性心肌炎
- D) 亚急性细菌性心内膜炎
- E) 结核性胸腺炎

答案:D

解析:

47. [单选题]闭合性肋骨骨折时，下列哪项说明肺或气管肯定有损伤

- A) 伤侧胸膜腔积液
- B) 伤侧胸内疼痛
- C) 伤侧肺有啰音
- D) 伤侧肺呼吸音减低

E) 伤侧皮下气肿

答案:E

解析:

48. [单选题]A. 胎龄37~42周

A) 胎龄>42周

B) 胎龄38~43周

C) 胎龄<36周

D) 胎龄<37周

E) 足月儿( )

答案:A

解析:

49. [单选题]关于淡漠型Graves病的叙述, 下列哪项是错误的

A) A. 多见于老年

B) B. 可伴有胫前黏液性水肿

C) C. 可出现极度消瘦和恶液质

D) D. 甲状腺功能亢进严重, 但突眼和甲状腺肿轻微

E) E. 以上都不是

答案:E

解析:

50. [单选题]有关高渗性脱水, 下列说法错误的是

A) 血清钠>145mmol / L

B) 口渴为最早症状

C) 水分摄入不足

D) 水分排出过多

E) 多以失盐为主

答案:E

解析:

51. [单选题]在系统性红斑狼疮的多系统损害中, 以哪项发生率最高

A) 皮肤

B) 关节

C) 肾脏

D) 心血管

E) 肺和脑膜

答案:C

解析:几乎所有病人肾脏受累, 表现为肾炎或肾病综合征。患者可有不同程度的蛋白尿、血尿、浮肿、高血压。尿毒症是SLE常见的死亡原因。

52. [单选题]关于纽曼健康系统模式的说法, 下列哪项是错误的

A) 是以开放性系统为基础的护理概念框架

B) 作护理诊断时需对个体的基本结构、各防线和压力源进行评估

C) 由人、环境、压力源和预防四部分组成

D) 实践中遵循护理诊断、护理目标和护理结果的工作步骤

E) 强调用预防原则来规划和组织护理活动

答案:C

解析:

53. [单选题]进入传染性非典型肺炎病区, 应戴棉纱口罩的层数为( )

- A) 4层
- B) 12层
- C) 10层
- D) 2层
- E) 6层

答案:B

解析:

54. [单选题]患者男性, 45岁, 半天来呕血5次, 量约1200ml, 黑便2次, 伴头晕、心悸。入院查体: BP60 / 45mmHg, 心率180次 / 分, 巩膜黄染, 腹部膨隆, 移动性浊音阳性。诊断为肝硬化食管静脉曲张破裂出血。此患者目前最主要的护理诊断为

- A) 恐惧
- B) 营养失调
- C) 有感染的危险
- D) 组织灌注量不足
- E) 活动无耐力

答案:D

解析:肝硬化食管静脉曲张破裂出血出现失血性休克表现, 应积极抗休克治疗, 改善组织灌注不足情况。治疗护理中, 宜输新鲜血, 因库存血含氨量高, 易诱发肝性脑病。

55. [单选题]男, 52岁, 反复中上腹部闷痛18年, 餐后明显。近半年来腹痛无规律性, 食欲减退, 体重减轻12斤。粪OB阳性。可能的诊断是:

- A) 溃疡型胃癌
- B) 十二指肠溃疡癌变
- C) 胃溃疡癌变
- D) 十二指肠溃疡并出血
- E) 胃溃疡并出血

答案:C

解析:

56. [单选题]男性, 45岁, 以反复心悸、气促就诊。查体: HR 78次/分, 律不齐。心电图示: 频发室性期前收缩、短阵室性心动过速。超声心动图: 左室舒张期内径75mm, EF 40%。最佳的治疗是:

- A) 应用洋地黄
- B) 胺碘酮
- C) 心律平
- D) 慢心律
- E) 埋藏式心脏自动复律除颤器

答案:E

解析:

57. [单选题]抗菌药治疗萎缩性胃炎是针对哪种细菌

- A) 大肠埃希菌
- B) 结核分枝杆菌
- C) 幽门螺杆菌
- D) 葡萄球菌
- E) 肺炎链球菌

答案:C

解析:幽门螺杆菌(HP)感染: 幽门螺杆菌的感染程度与胃黏膜炎症程度呈正相关, 故选C。解题关键: 幽门螺杆菌的感染程度与胃黏膜炎症程度呈正相关。

58. [单选题]鉴别良恶性溃疡的最重要方法是

- A) 溃疡大小
- B) 大便潜血
- C) 胃液分析
- D) 胃粘膜组织病理学检查
- E) Hp检查

答案:D

解析:

59. [单选题]与重型胎盘早剥症状不相符的是: ( )

- A) 有妊娠高血压疾病病史
- B) 突然剧烈腹痛
- C) 阴道出血与休克症状成正比
- D) 子宫呈板状, 胎心音消失
- E) 仰卧时间过长

答案:C

解析:

60. [单选题] 张某家中安装了煤气热水器, 2h前在洗澡时晕倒在浴室内, 送至医院时病人处于昏迷状态, 尿失禁, 瞳孔收缩, 对光反射消失, 角膜反射迟钝, 呼吸浅快, 每分钟32次, 心率102次/min, 血压92/56mmH, 皮肤湿冷, 口唇樱红, 拟诊"急性一氧化碳中毒"下列哪项措施可使病人症状得到最迅速的缓解

- A) 给予大剂量呼吸兴奋剂
- B) 甘露醇快速静脉点滴
- C) 移人通风处用风扇吹
- D) 面罩高流量给氧
- E) 进入高压氧舱

答案:E

解析:

61. [单选题]A. 了解胆囊浓缩和收缩功能

- A) 了解胆囊切除术后胆道情况
- B) 明确梗阻性黄疸的原因和部位
- C) 明确肝内病变的范围和性质
- D) 可同时显示胆道和胰管情况
- E) ERCP

答案:E

解析:ERCP: 十二指肠镜逆行性胰胆管造影术, 可同时显示胆道和胰管情况。经内镜逆行胰胆管造影是将纤维十二指肠镜插至十二指肠降部, 找到十二指肠大乳头, 由活检管道内插入塑料导管至乳头开口部, 注入造影剂后x线摄片, 以显示胰胆管。故答案为E。口服法胆囊造影是测定胆囊浓缩功能的方法, 可利用本法诊断胆囊疾病, 特别是诊断胆囊炎的理论根据: (1) 既可观察胆囊的形态及胆囊病变, 又可判断胆囊功能。(2) 疑有胆石症而胆囊区平片无阳性发现者。故答案为A。经皮肝穿刺胆道造影的适应证: 主要用于梗阻性黄疸病人, 以了解胆道梗阻部位、范围和原因。故答案为C。

62. [单选题]系统性红斑狼疮

- A) 滑膜炎
- B) 附着点炎
- C) 小血管炎
- D) 泪腺炎
- E) 肌炎

答案:C

解析:

63. [单选题]应隔离治疗的皮肤病是( )

- A) 带状疱疹
- B) 药物性皮炎
- C) 盘状红斑狼疮
- D) 疥疮
- E) 丘疹样荨麻疹

答案:D

解析:

64. [单选题]新生儿的室内温度是()

- A) 16~18℃
- B) 18~20℃
- C) 20~22℃
- D) 22~24℃
- E) 24~26℃

答案:D

解析:新生儿房间温度应保持于22~24℃,湿度55%~65%,空气清新,通风良好。冬季环境温度过低时可引起新生儿(特别是低体重儿)体温不升,影响代谢和血液循环,应注意保暖。另经临床验证,新生儿病室内温度保持在22~24℃时最适宜。

65. [单选题]胸腹手术的体位是

- A) 仰卧位
- B) 截石位
- C) 俯卧位
- D) 侧卧位
- E) 膝胸位

答案:A

解析:【考点】手术卧位的选择【精析】侧卧位常见于需要做灌肠的患者,或需要做肛门及腹部手术检查的患者,故第7题选D。截石位主要是做会阴部检查、阴道灌洗(如膀胱镜、妇产科检查、阴道灌洗等)及产妇分娩时使用,故8题选B。去枕平卧位常见于椎管内麻醉术后胸腹部手术患者,故9题选A。俯卧位腰背部检查或配合胰,胆管造影检查时或脊椎手术后的患者,故10题选C。【避错】本题几项体位适应证易混淆,考生应详细记忆,准确区分各体位的应用范围。

66. [单选题]开放性脑外伤的含意是( )

- A) 头皮裂伤,颅骨直接与外界相通
- B) 头皮裂伤,颅骨骨折,硬脑膜与外界相通
- C) 颅骨凹陷性骨折,骨折片刺破硬脑膜
- D) 头皮裂伤,颅骨骨折,硬脑膜破裂,脑组织直接与外界相通
- E) 颅骨骨折,骨折片刺破头皮暴露于空气中

答案:D

解析:

67. [单选题]患者女,50岁。近半年来常于劳累或者精神紧张后感头痛、头晕及颈项不适感,休息后好转,未予治疗。最近体检发现血压升高。3次不同时间测血压分别为140/90mmHg、150/100mmHg、155/95mmHg。对其诊断与处理最重要的是

- A) 继续在不同时间内测血压,以确定是否为高血压
- B) 做头部CT、超声、肾功能检查
- C) 确定是原发还是继发性高血压
- D) 试用利尿剂治疗,观察用药反应
- E) 暂不处理,3个月后复查血压

答案:C

解析:高血压分原发性和继发性。高血压是常见的心血管疾病,以体循环动脉血压持续性增高为主要表现。继发性是继



发于肾、内分泌和神经系统疾病的高血压，多为暂时的，在原发的疾病治疗好了以后，高血压就会慢慢消失。一旦诊断高血压，必须鉴别是原发性还是继发性。原发性高血压患者需做有关实验室检查，评估靶器官损害和相关危险因素。故选C。解题关键：一旦诊断高血压，必须鉴别是原发性还是继发性。

68. [单选题]患者女，63岁。心绞痛病史2年。一天前骑车上桥时又出现胸骨后压榨样疼痛，即原地休息，含服硝酸甘油3片无效，出冷汗，路人将患者送到急诊室。经心电图检查，诊断为急性前壁心肌梗死，转入CCU进行链激酶治疗。患者问护士链激酶治疗的作用是什么，护士正确的回答是

- A) 解除疼痛
- B) 扩张冠状动脉
- C) 抑制血小板的聚集
- D) 防止冠脉内血栓形成
- E) 溶解冠脉内血栓

答案:E

解析：(1) 链激酶具有促进体内纤维蛋白溶解系统活性的作用，能使纤维蛋白溶酶原激活因子前体物转变为激活因子，后者再使纤维蛋白原转变为有活性的纤维蛋白溶酶，使血栓溶解。用于治疗血栓栓塞性疾病。故选E。解题关键：链激酶可使血栓溶解，用于治疗血栓栓塞性疾病。(2) 心肌梗死的患者不应用力排便的原因有：①用力大便时可使血压升高，心率增快，心肌耗氧量增加。②用力排便时，由于过度屏气而使右心室压力增高，增加心脏负荷，加重心肌缺血，使梗死范围扩展，可导致心力衰竭、严重心律失常，甚至猝死。故选D。解题关键：心肌梗死的患者保持1~2天排便1次，必要时可用缓泻剂。(3) 心肌梗死患者第1周给予流质或半流质饮食，1周后给半流质或软食，少量多餐、不宜过饱。进食易消化，低脂肪，低钠产气少的食物，保持足够营养，故选C。解题关键：心肌梗死患者应吃低脂肪易消化的清淡饮食，限制含有大量胆固醇的食品。

69. [单选题]女性，15岁，胸背痛1年，发病以来始终有低热，夜间盗汗，体重下降5kg。查体：脊椎轻度后凸畸形，胸部棘突压痛，X线片示胸椎溶骨性破坏，椎间盘受累，被诊为胸椎结核。术后护理措施中正确的是

- A) 术后早期应轴线翻身
- B) 全身制动至骨组织完全愈合
- C) 继续服用抗结核药物1~2周
- D) 若发生气胸则仅给予吸氧即可
- E) 若出现石膏综合征应立即完全拆除石膏

答案:A

解析：对于确实需要手术的病人，术前必须先行正规抗结核药物治疗至少2-4周。术中术后需要继续抗结核治疗并完成规定疗程。故答案为B。绝对卧硬板床休息，可以减轻椎体压力，防止脊柱受压或截瘫加重，使病灶局限，减少机体消耗。故答案为C。1. 胸椎手术后病人宜早期应轴线翻身，预防脊椎再损伤及关节脱位，同时也可以预防压疮发生（A对、B错）。2. 术前必须先行正规抗结核药物治疗至少2-4周。术中术后需要继续抗结核治疗并完成规定疗程（C错）。3. 若发生气胸给予吸氧并予排气疗法使萎缩肺尽早复张（D错）。若出现石膏综合征先胃肠减压，温盐水洗胃，改变仰卧位，补充血容量，必要时应拆除石膏或暂时解除牵引术，或减少矫正角度（E错）。故答案为A。

70. [单选题]细菌性肝脓肿的主要感染途径是

- A) 胆管
- B) 肝动脉
- C) 门静脉
- D) 淋巴管
- E) 肝破损裂口

答案:A

解析：

71. [单选题]丁先生，35岁。右手臂严重损伤，急诊入院。医嘱为破伤风抗毒素注射，护士注射前询问患者是否用过破伤风抗毒素。患者曾用过破伤风抗毒素，超过多少天，需重做过敏试验。

- A) 3天
- B) 5天
- C) 7天



D) 10天

E) 12天

答案:C

解析:

72. [单选题] 女性, 50岁, 结肠癌根治术后6小时, 从腹腔引流管引出血性液体, 平均每小时超过200ml, 持续4小时, 无减少趋势, 应采取

A) 止血药物

B) 输血

C) 大量输液体

D) 夹毕腹腔引流管

E) 手术止血

答案:E

解析: 根据题干, 患者肠癌根治术后6小时, 腹腔引流管引出血性液体, 平均每小时超过200ml, 持续4小时, 无减少趋势, 可判断为术野有活动性出血, 有发生休克的危险, 故此时应开腹进行手术止血。故答案为E。

73. [单选题] 患者女, 60岁。由于工作不如意, 服下半瓶敌敌畏, 洗胃时每次灌入的溶液量为

A) 100~200ml

B) 200~300ml

C) 300~500ml

D) 400~600ml

E) 500~700ml

答案:C

解析: 洗胃严格掌握每次的灌洗量, 即300~500ml。灌入量过多则胃容积增大, 胃内压明显大于十二指肠内压, 促使胃内容物进入十二指肠, 加速毒物吸收, 同时, 过多可引起液体反流, 导致呛咳、误吸或窒息; 过少则洗胃液无法与胃内容物充分混合, 不利于彻底洗胃, 延长了洗胃时间, 故选C。解题关键: 洗胃每次的灌洗量是300~500ml。

74. [单选题] 张女士, 60岁。10年前乙肝抗原阳性, 肝硬化病史6年, 主诉“腹胀、少尿”入院, B超显示腹水。该病人肝硬化最有可能的病因为

A) 酒精中毒

B) 药物

C) 病毒性肝炎

D) 营养失调

E) 遗传因素

答案:C

解析: 病毒性肝炎是肝硬化主要病因。

75. [单选题] A. 食管静脉曲张

A) 幽门梗阻

B) 急性胃扩张

C) 肠梗阻

D) 胃癌

E) 采用洗胃治疗的病人是

答案:B

解析:

76. [单选题] 糖尿病病人口服格列苯脲后出现强烈饥饿感、心悸、手颤、出汗, 最可能是由于

A) 合并胃溃疡

B) 糖尿病加重

C) 合并高血压

D) 出现低血糖

E) 合并甲亢

答案:D

解析:格列苯脲是第二代磺脲类降糖药物,主要作用是刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,即促进胰岛素分泌的药物,该药降糖作用较强,价格低廉;主要副作用为容易引起低血糖,老年人及肝肾心脑血管功能不好的患者慎用。根据患者的症状故选D答案。

77. [单选题]二十岁男性,长跑后冲凉水浴,当晚突发寒战、高热,右胸痛就诊。查面色潮红、呼吸急促、痛苦呻吟,体温39℃以上,可降至正常范围内,以肺炎收住院病人的热型为

A) 回归热

B) 间歇热

C) 稽留热

D) 反复热

E) 弛张热

答案:E

解析:

78. [单选题]男性,50岁,间歇性便血10余年,近1个月持续便血,量多,常呈喷射状,感头晕,肛诊齿状线上粘膜呈较大的串珠形隆起,应诊断

A) 外痔

B) 内痔

C) 混合痔

D) 直肠癌

E) 直肠息肉

答案:B

解析:

79. [单选题]下列哪一项对诊断尿路感染最有意义:

A) 尿频、尿急、尿痛

B) 畏寒、发热、头痛

C) 清洁中段尿培养细菌计数 $\geq 10^5 / \text{ml}$

D) 清洁中段尿白细胞 $> 5 / \text{HP}$

E) 血白细胞总数升高

答案:C

解析:

80. [单选题]患者高某,男性,40岁,痔疮手术后,遵医嘱行热水坐浴,操作不当的是

A) 备无菌坐浴盆

B) 坐浴前排空膀胱

C) 水温调至60~70℃

D) 坐浴时间15~20分钟

E) 坐浴后按无菌原则更换敷料

答案:C

解析:水温:40~45℃。

81. [单选题]韩先生,27岁。因失恋服用药物中毒,有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、呼吸困难的症状,检查发现呼吸有蒜味,瞳孔缩小。最可能的诊断为

A) 一氧化碳中毒

B) 吗啡中毒

C) 氰化物中毒

D) 有机磷中毒

E) 乙醇中毒

答案:D

解析:

82. [单选题]较大儿童苯丙酮尿症初筛

- A) Guthrie细菌生长抑制试验
- B) 尿三氯化铁试验
- C) 血浆氨基酸分析
- D) 尿喋呤分析
- E) DNA分析

答案:B

解析:

83. [单选题]做保留灌肠时，下列哪项说法是错误的

- A) 根据病变部位选取适当体位
- B) 灌肠前嘱病人先排便
- C) 肛管要细，插入要深
- D) 注入速度要慢
- E) 嘱病人保留灌肠液30分钟再排便

答案:E

解析:

84. [单选题]给予肝性脑病患者新霉素口服的目的是

- A) 防治胃肠道感染
- B) 预防肝胆系统感染
- C) 抑制肠道对氨的吸收
- D) 防止腹水感染
- E) 抑制肠道细菌而减少毒性物质产生和吸收

答案:E

解析:药物治疗1. 减少肠内氨的生成和吸收 (1) 乳果糖: 减少肠内氨的生成和吸收。(2) 乳梨醇: 疗效与乳果糖相似。(3) 口服抗生素: 可抑制肠道产尿素酶的细菌, 减少氨的生成。常用的抗生素有新霉素、甲硝唑、利福昔明等。2. 促进有毒物质的代谢清除 (1) 谷氨酸钾或谷氨酸钠: (2) 精氨酸: (3) L-鸟氨酸-L-门冬氨酸: 能促进体内尿素循环而降低血氨。(4) 鸟氨酸- $\alpha$ -酮戊二酸: (5) 苯甲酸钠: 3. 支链氨基酸 可纠正氨基酸代谢不平衡, 抑制大脑中假性神经递质的形成。(三) 其他对症治疗1. 纠正水、电解质和酸碱失调。2. 防治脑水肿, 可静滴高渗葡萄糖、甘露醇等脱水剂。3. 防止出血与休克, 有出血倾向者, 可输血或静滴维生素K1。

85. [单选题]毛果芸香碱临床上常用于治疗()

- A) 心动过缓
- B) 青光眼
- C) 重症肌无力
- D) 尿潴留
- E) 腹气胀

答案:B

解析:毛果芸香碱为M胆碱受体激动药, 能直接作用于副交感神经节后纤维支配的效应器官的M胆碱受体, 尤其对眼和腺体作用较明显。临床主要用于青光眼和虹膜炎的治疗。

86. [单选题]氯磷定切忌与碳酸氢钠混合静脉滴注, 是由于可引起

- A) 药液沉淀
- B) 药液变色
- C) 氯磷定失效
- D) 碳酸氢钠失效
- E) 氰化物形成

答案:E

解析:有机磷农药中毒患者在抢救时,氯磷定切忌与碳酸氢钠合用,因为氯磷定在碱性溶液中易水解为氰化物,会引起氰化物中毒。故本题应选E。解题关键:氯磷定与碳酸氢钠合用会引起氰化物中毒。

87. [单选题]SLE药物治疗首选

- A) 青霉素
- B) 泼尼松
- C) 布洛芬
- D) 硫唑嘌呤
- E) 环磷酰胺

答案:B

解析:糖皮质激素目前是治疗SLE的主要药物,具有强有力的抗炎作用和免疫抑制作用,能缓解急性期症状,逆转病情。

88. [单选题]风湿性心脏瓣膜病,下列哪项描述是正确的

- A) 慢性期不需要用青霉素治疗
- B) 瓣膜有赘生物时一定要手术治疗
- C) 首先左心功能不全
- D) 三尖瓣关闭不全不需要手术治疗
- E) 以上都不正确

答案:B

解析:

89. [单选题]女,33岁,反复右下腹痛3年,伴腹泻,便质糊状,无脓血,无里急后重。间有发热。体检发现右下腹包块。结肠镜见回肠末端病变呈节段性分布,纵行溃疡,活检示非干酪性肉芽肿。[假设信息]上述患者经用泼尼松60mg/d治疗后症状无明显缓解,应如何改变治疗方案

- A) 加大泼尼松用量
- B) 换用氨基水杨酸制剂
- C) 加用抗生素
- D) 手术治疗
- E) 加用硫唑嘌呤

答案:E

解析:

90. [单选题]贫血是外周血单位体积中

- A) 红细胞数低于正常
- B) 红细胞压积低于正常
- C) 红细胞数及血红蛋白量低于正常
- D) 红细胞数、血红蛋白量和红细胞压积低于正常
- E) 循环血量较正常减少

答案:D

解析:

91. [单选题]泌尿系统结石最有效的预防方法是

- A) 控制感染
- B) 调整饮食
- C) 调节尿液pH
- D) 大量饮水
- E) 中医中药

答案:D

解析:

92. [单选题]1999年世界卫生组织规定血压分级标准，其中1级高血压标准为

- A) 收缩压140~159mmHg，舒张压90~99mmHg
- B) 收缩压 $\geq$ 180mmHg，舒张压 $\geq$ 110mmHg
- C) 绝大多数病人高血压病因不明
- D) 血压升高是某些疾病的表现之一
- E) 收缩压160~179mmHg，舒张压100~110mmHg

答案:A

解析:高血压的诊断标准为: <120/80mmHg为最佳血压; <130/85mmHg为正常血压; 130~139/85~89mmHg为正常最高值; >140/90mmHg界定为高血压, 分1、2、3级, 140~159/90~99mmHg为1级高血压, 160~179/100~109mmHg为2级高血压, >180/110mmHg为3级高血压。故选A。解题关键: 高血压的诊断标准是收缩压>140mmHg和(或)舒张压>90mmHg。

93. [单选题]以下有关输液的叙述不正确的是

- A) 需长期输液者, 一般从远端静脉开始
- B) 需大量输液时, 一般选用较大静脉
- C) 连续24小时输液时, 应每12小时更换输液管
- D) 输入多巴胺应调节较慢的速度
- E) 颈外静脉穿刺拔管后在穿刺点加压数分钟, 避免空气进入

答案:C

解析:【考点】输液的注意事项【精析】为保护和合理使用静脉, 需长期输液则由远端末梢小静脉开始选择使用, A正确, 故不选。一般注射量大、输液时间短者可选用大静脉, 减轻疼痛, 故不选B。需24小时连续输液者, 应每天更换输液器, 故本题选C。输多巴胺时速度宜慢, 故不选D。颈外静脉穿刺拔管后在穿刺点覆盖纱布, 加压数分钟, 避免空气进入, 严防造成空气栓塞, 故不选E。【避错】对于本题, 部分考生易误选E。颈外静脉属于颈部最大的浅静脉, 因此在拔管后必须加压数分钟, 以防空气栓塞。

94. [单选题]男性, 30岁。确诊哮喘入院治疗3周, 经正规治疗病情缓解, 仅偶有胸闷, 出院时医生嘱咐为巩固疗效, 建议患者继续应用哪种药物控制气道炎症

- A) 丙酸倍氯米松气雾剂
- B) 溴化异丙托品气雾剂
- C) 特布他林气雾剂
- D) 酮替酚
- E) 氨茶碱

答案:A

解析:

95. [单选题]甲醛进行气化消毒需加的氧化剂是

- A) 高锰酸钾
- B) 氰化钾
- C) 氯化钾
- D) 乳酸钾
- E) 氢氧化钾

答案:A

解析:

96. [单选题]A. 建立信任关系

- A) 明确疾病诊断
- B) 为患者解决问题
- C) 护患双方互相评价
- D) 护患之间进一步熟悉
- E) 护患关系初始期的主要任务是

答案:A

解析:此期主要任务是建立信任感和确认患者的需要。护士在查阅患者资料、询问有关人员, 了解患者信息的情况下

，以真诚的态度，向患者介绍、解释自己所负责的护理工作，建立一个有助于增进患者自尊的环境，以取得患者的信任。护士还须收集患者的健康资料，准确找出患者的健康问题（未满足的需要），并鼓励患者积极参与互动。此期主要任务是在彼此信任的基础上，帮助患者解决已确认的健康问题，满足其需要。护士通过制定护理计划，实施护理措施来达到既定的护理目标。在此过程中，护士应尽可能与患者商讨，鼓励他们积极参与，以增进自主性，减少对护理的依赖。此期主要任务是成功地结束关系。在此期到来前，护士应预计可能出现的问题，拟订解决方案，并征求患者的意见，以便今后改进工作。护士还应了解患者对结束彼此关系的感受，回顾双方所做的努力和达到的预期目标，以减轻失落感。

97. [单选题]肝硬化者选用

- A) 高热量、高蛋白、高维生素、易消化饮食
- B) 低动物脂肪、低胆固醇、少糖少盐饮食
- C) 高热量、高维生素、高效价低蛋白饮食
- D) 低盐、高维生素、低蛋白质饮食
- E) 高热量、低脂肪、低盐、忌蛋白质饮食

答案:A

解析：【考点】肝性脑病患者的护理措施【精析】肝硬化患者给予高热量、高蛋白、高维生素、易消化的食物，应禁酒及避免食入粗糙、尖锐或刺激性食物。同时应根据病情变化及时更改饮食，如血氨偏高者应限制或禁食蛋白质，待病情好转后再逐渐增加蛋白质摄入量；有腹腔积液时应给予低盐或无盐饮食，故37题选A。肝性脑病患者忌食蛋白质，因为蛋白质可在肠内细菌和消化酶作用下产生氨，被肠道吸收后加重昏迷。故38题选E。【避错】第37题考生易选择E，由于肝硬化的饮食护理与肝性脑病的饮食护理混淆，认为肝硬化应忌蛋白质饮食，这是不对的，肝硬化患者不需忌蛋白质，应给予高热量、高维生素、高蛋白饮食。第38题部分考生易选C，认为肝性脑病可以进食少量高效价低蛋白饮食，这是不对的，因为蛋白质在肠道细菌作用下可以产生氨进入血液循环而加重肝性脑病，所以，本题应选E。高热量、低脂肪、低盐、忌蛋白质饮食。

98. [单选题]王女士，48岁。既往肝门静脉高压征病史，此次因发生急性大出血应用三腔二囊管压迫止血，护士为该患者采取的护理措施应除外

- A) 对三腔二囊管充分固定
- B) 每隔24小时气囊放空10分钟
- C) 气囊压迫一般为3~4天
- D) 加强巡视，防止发生吸收
- E) 加强心理护理，防止紧张和情绪激动

答案:B

解析：

99. [单选题]光照消毒法的原理是

- A) 光照干扰细菌酶的活性
- B) 破坏细菌膜的结构
- C) 抑制细菌代谢和生长
- D) 使菌体蛋白发生光解变性
- E) 使微生物的蛋白质及酶变性凝固

答案:D

解析：光照消毒法主要是利用紫外线照射，使菌体蛋白发生光解、变性导致细菌死亡。对杆菌杀菌力强，对生长期细菌敏感，对芽胞敏感性差。

100. [单选题]男性，28岁。右髌部疼痛，伴午后低热、盗汗、食欲缺乏及体重减轻一年。查：右髌关节呈屈曲畸形，外观无明显肿胀，屈曲活动受限，Thomas征阳性，ESR56mm/h。X线示：右髌关节间隙变窄，关节面有虫噬样骨质破坏，右髌臼有2.5cm大小空洞，内见死骨。最可能的诊断是：

- A) 化脓性关节炎
- B) 髌关节滑膜炎
- C) 髌关节结核
- D) 全髌关节结核



E) 全风湿性髌关节炎

答案:D

解析:

101. [单选题] 去甲肾上腺素激活  $\alpha$  受体后引起舒张效应的部位是()

A) 冠状血管

B) 皮肤黏膜血管

C) 脑血管

D) 小肠平滑肌

E) 竖毛肌

答案:D

解析: 去甲肾上腺素激活  $\alpha$  受体后引起舒张效应的部位是小肠平滑肌。

102. [单选题] 患儿, 男, 10岁。因右胫骨上端干骺端骨肉瘤入院治疗, 手术过程中医生误将左下肢截肢。遵照《医疗事故处理条例》的规定, 该情况属于

A) 四级医疗事故

B) 二级医疗事故

C) 三级医疗事故

D) 一级医疗事故

E) 不属于医疗事故

答案:B

解析:

103. [单选题] 孙女士, 40岁。诊断Graves病, 病人主诉畏光、视力减退; 检查可见充血, 突眼度19mm。应考虑为

A) 眼部伴有感染

B) 视网膜病变

C) 非浸润性突眼

D) 浸润性突眼

E) 近视眼

答案:D

解析:

104. [单选题] 护理管理者在人力资源管理上, 应遵循某项原则使得在保证优质、高效的基础上减少人力成本的投入, 该项原则是

A) 经济效能原则

B) 合理组合原则

C) 合理分配原则

D) 病人优先原则

E) 动态调整原则

答案:A

解析:

105. [单选题] 咽食管憩室多为

A) 食管全层膨出的憩室即真性憩室

B) 食管只有黏膜膨出的憩室即假性憩室

C) 食管全层膨出的憩室即假性憩室

D) 食管只有黏膜膨出的憩室即真性憩室

E) 食管黏膜不膨出。

答案:B

解析:



106. [单选题]胃十二指肠溃疡并发瘢痕性幽门梗阻的描述，不正确的是

- A) 腹痛与反复呕吐为主要表现
- B) 呕吐物含大量宿食
- C) 上腹可闻及振水音
- D) 易发生低钾低氯性碱中毒
- E) 一般非手术疗法可愈

答案:E

解析:瘢痕性幽门梗阻必须经过手术治疗方能解除梗阻。

107. [单选题]患者，近一周来感乏力、食欲不振、巩膜黄染，医嘱要求查碱性磷酸酶，应何时取血

- A) 饭前
- B) 饭后两小时
- C) 即刻
- D) 睡前
- E) 晨起空腹时

答案:E

解析:不同的血液化验项目，对其标本的采集时间要求不同。如平时检查红细胞、血红蛋白、白细胞以及血小板等随时都可以查。但是，如查肝功能、肾功能、生化检查、血糖检查及葡萄糖耐量试验、血液血清学检查等，则要求病人在第二天清晨空腹时抽血送检。空腹时机体处于基础代谢相对稳定状态，能排除饮食、运动、精神等因素对血液中各种化学成分浓度的影响。故选E。解题关键：肝功能、肾功能、血糖检查需要空腹。

108. [单选题]消化性溃疡X线诊断的可靠依据是

- A) 局部激惹
- B) 局部压痛
- C) 局部变形
- D) 龛影在胃腔轮廓之外
- E) 龛影在胃腔轮廓之内

答案:E

解析:@##

109. [单选题]A. 苯妥英

- A) 乙琥胺
- B) 促肾上腺皮质激素或泼尼松
- C) 卡马西平
- D) 丙戊酸钠
- E) 失神发作，首选

答案:B

解析:

110. [单选题]在我国引起急性胰腺炎最常见的原因是

- A) 胆总管末端梗阻和胆汁逆流
- B) 饮酒
- C) 流行性腮腺炎
- D) 穿透性消化性溃疡
- E) 胰腺外伤

答案:A

解析:急性胰腺炎的发病与下列因素有关：①胆道疾病；②胰管阻塞；③十二指肠乳头邻近部病变；④酗酒和暴饮暴食；⑤手术与损伤；⑥其他，如高钙血症与甲状旁腺功能亢进、药物，某些传染性疾病如流行性腮腺炎、病毒性肝炎等可伴有胰腺炎。其中我国最常见病因为胆道疾病，西方国家为酗酒和暴饮暴食。B、C、D、E均不是常见病因。

111. [单选题]某孕妇妊娠38周，为判断其胎盘功能，应

- A) 测定血中hCG值
- B) 测定血或尿中雌三醇值
- C) 测定羊水中肌酐值
- D) 测定羊水中卵磷脂 / 鞘磷脂比值
- E) 测定羊水中脂肪细胞值

答案:B

解析: 选项中只有选项B能检出胎盘功能, 雌三醇值降低提示胎盘功能低下。

112. [单选题] 甲状腺功能亢进

- A) 内分泌功能亢进
- B) 内分泌功能减退
- C) 内分泌功能正常
- D) 激素受体不敏感
- E) 下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈抑制所致功能减退

答案:A

解析:

113. [单选题] A. 盐酸哌替啶

- A) 奥美拉唑
- B) 西咪替丁
- C) 吗啡
- D) 硫酸镁
- E) 急性胰腺炎禁止使用的药物是

答案:D

解析:

114. [单选题] A. 生后1~2个月

- A) 生后3~4个月
- B) 生后6~10个月
- C) 1岁左右
- D) 3岁以后
- E) 出现佝偻病初期症状多发生在()

答案:B

解析:

115. [单选题] 不符合脑死亡的判断标准的是

- A) 对刺激无感受性及反应性
- B) 运动、无呼吸
- C) 无反射
- D) 脑电波平坦
- E) 心跳停止

答案:E

解析: 脑死亡的诊断标准: ①自主呼吸完全停止(停止呼吸机后5分钟无任何自主呼吸反应); ②自主性肌肉活动完全停止; ③对外界声、光、温、机械性刺激无反应; ④脑干反射完全消失; ⑤脑电图呈持续平坦波形(3小时内多次记录)。故选E。解题关键: 脑死亡是包括脑干在内的全脑功能丧失的不可逆转的状态。

116. [单选题] 护士在护理服用洋地黄药物的病人时, 下列哪项不妥

- A) 询问病人不适主诉
- B) 给药前先数心率
- C) 观察洋地黄药物浓度
- D) 心率 $<60$ 次/min, 不能给药

E) 嘱病人如果一次漏服，下次要加量补服

答案:E

解析:

117. [单选题]慢性肺心病可致

- A) 心包炎
- B) 左心室衰竭
- C) 左心房衰竭
- D) 心肌炎
- E) 右心衰竭

答案:E

解析:

118. [单选题]消化道器官不包括

- A) 食管
- B) 肝胆
- C) 胃及胰
- D) 十二指肠
- E) 肛门

答案:E

解析:

119. [单选题]3岁男孩，诊断肾病综合征，长期忌盐，因“低热、咳嗽、双下肢及眼睑水肿5天”入院，外院曾给予呋塞米治疗，血压75 / 40mmHg，咽红，心肺无异常，此患儿最可能的是

- A) 低钙血症
- B) 低镁血症
- C) 低血糖症
- D) 低钾血症
- E) 低钠血症

答案:E

解析:

120. [单选题]患者，男性，60岁，无明显诱因于晨起突感胸骨后闷痛，持续2h不缓解，伴胸闷气短，医院查体血压130 / 80mmHg，双肺底有细小湿啰音。心电图示ST段弓背向上抬高T波倒置。该患者心功能是

- A) NYHA分级III
- B) NYHA分级IV
- C) Killip分级II
- D) Killip分级III
- E) Killip分级IV

答案:C

解析:

121. [单选题]关于社区的说法，下列哪项是正确的

- A) 社区的人口数大约在5万~30万之间，面积在5000~50000km<sup>2</sup>
- B) 社区服务是社区为满足其成员物质生活需要而进行的社会性福利活动
- C) 不同的社区条件下，社区服务的具体内容和项目应相同
- D) 社区卫生服务以个体健康为中心，以个体为单位，以社区为范围
- E) 社区卫生服务以妇女、儿童、老年人、慢性病人和残疾人为重点

答案:E

解析:社区的人口数大约在10万~30万之间，面积在5000~50000km<sup>2</sup>；在不同的社区条件下，社区服务的具体内容和项目可各不相同；社区卫生服务以人群健康为中心，以家庭为单位。

122. [单选题]属于脂溶性维生素的是

- A) 维生素K
- B) 维生素C
- C) 维生素B1
- D) 维生素PP
- E) 维生素B

答案:A

解析:脂溶性维生素:溶于有机溶剂而不溶于水的一类维生素。包括维生素A、维生素D、维生素E及维生素K, A正确。维生素C、维生素B1、维生素B6是水溶性维生素,排除B、C、E。维生素PP:烟酸学名吡啶3-羧酸,可由烟碱[1-甲基2-(3-吡啶基)吡咯烷]氧化而制得的一种B族维生素,与烟酰胺一起合称为维生素PP, D不正确。解题关键:脂溶性维生素包括维生素A、D、E及K。维生素B1、B2、B6、B12及维生素C为水溶性维生素。

123. [单选题]下列哪项是颌下急性蜂窝织炎尽早切开的目的

- A) 防止中毒
- B) 防止高热
- C) 防止菌血症
- D) 防止窒息
- E) 防止淋巴结炎

答案:D

解析:口底、颌下、颈部等处的急性蜂窝织炎,可发生喉头水肿而压迫气管,引起呼吸困难甚至窒息。

124. [单选题]在急性胰腺炎的发病因素中,哪项最常见

- A) 感染
- B) 腹部外伤
- C) 胰管梗阻
- D) 胆石症和胆道疾病
- E) 暴饮暴食

答案:D

解析:急性胰腺炎是指多种病因造成胰酶激活后所致的胰腺组织的局部炎症反应。其发病原因包括:①胆道疾病:胆囊炎、胆石症等;②酗酒和暴饮暴食;③十二指肠乳头病变,十二指肠溃疡或炎症;④其他因素:流行性腮腺炎,病毒性肝炎,腹腔手术,腹部外伤,某些药物也可引起胰腺炎发作。我国急性胰腺炎50%以上为胆道疾病所致,西方胆道疾病和酗酒分别占40%和35%。故选D。

125. [单选题]在缺乏促甲状腺激素的情况下,甲状腺本身可适应碘的供应变化调节甲状腺激素的合成、释放。这种调节方式称为()

- A) 神经调节
- B) 体液调节
- C) 自身调节
- D) 前馈调节
- E) 反馈调节

答案:C

解析:

126. [单选题]合并有重症肌无力的纵隔肿瘤,是

- A) 胸腺瘤
- B) 畸胎瘤
- C) 心包囊肿
- D) 神经源性肿瘤
- E) 淋巴源性肿瘤

答案:A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/996131140002010102>